

BARRAGEM PEDREIRA



PARTE VI – PROGRAMAS DO MEIO BIÓTICO (II)

Fevereiro/2023

Período: Setembro a Dezembro 2022



www.daepedreiraeduaspontes.com.br



PEDREIRA E CAMPINAS – SÃO PAULO

BARRAGEM PEDREIRA



ANEXO XII - Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna

Fevereiro/2023

Período: Setembro a Dezembro 2022



www.daepedreiraeduaspontes.com.br



PEDREIRA E CAMPINAS – SÃO PAULO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS BARRAGEM PEDREIRA

12º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna

0322-01-AS-RQS-0012-R00-PMCF

Contrato: N° 2018/11/00032.2

**Setembro a dezembro
2022**

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	11
2.1	EQUIPE TÉCNICA.....	14
3.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA	15
3.1	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PROGRAMA.....	15
3.1.1	Atendimento aos Objetivos	15
3.1.2	Atendimento às Metas	17
3.1.3	Indicadores.....	18
3.2	RESUMO DAS ATIVIDADES ANTERIORES – HISTÓRICO	19
3.3	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO	20
3.3.1	Subprograma de Monitoramento de Fauna.....	20
3.3.2	Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.....	25
3.3.2.1	Treinamentos	26
3.3.2.2	Vistoria	28
3.3.2.3	Afugentamento e Resgates de Fauna Silvestre	31
3.3.2.4	Realocação de Abelhas e Demais Espécies de Hymenoptera	40
3.3.3	Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino dos Animais Silvestres.....	41
3.3.3.1	Recepção e Triagem dos Animais	41
3.3.3.2	Avaliação Clínica.....	41
3.3.3.3	Destinação dos Animais.....	41
3.3.4	Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamentos da Fauna.....	42
3.3.4.1	Caracterização da Área Percorrida.....	42
3.3.4.2	Monitoramento do Atropelamento.....	44
3.3.4.3	Ações Educativas.....	49
3.3.5	Planejamento das Próximas Atividades.....	49
4.	CRONOGRAMA – PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA	50
5.	ANEXOS	56

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Equipe de Coordenação Técnica e Gestão Operacional.....	14
Quadro 2 – Atendimento aos objetivos.	16
Quadro 3 – Atendimento às metas.....	17
Quadro 4 – Indicadores.....	18
Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.....	20
Quadro 6 – Treinamentos ministrados no quadrimestre.....	26
Quadro 7 – Relação das espécies identificadas durante as atividades de resgate de fauna – Acumulado (desde janeiro de 2019).....	35
Quadro 8 – Cronograma – ano 1.	51
Quadro 9 – Cronograma – ano 2.	52
Quadro 10 – Cronograma – ano 3.	53
Quadro 11 – Cronograma – ano 4.	54
Quadro 12 – Cronograma – ano 5.	55

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 – Treinamento acidentes com animais peçonhentos. (Data 14/09/2022)	26
Foto 2 – Treinamento acidentes com animais peçonhentos (Data 14/09/2022).	26
Foto 3 – Treinamento acidentes com animais invertebrados peçonhentos (Data 27/10/2022).	27
Foto 4 – Treinamento acidentes com animais invertebrados peçonhentos (Data 27/10/2022).	27
Foto 5 – Treinamento identificação de corais verdadeira (07/11/2022)	27
Foto 6 – Treinamento identificação de corais verdadeira (07/11/2022)	27
Foto 7 – Treinamento Crimes ambientais e proteção de fauna silvestre (Data 02/12/2022).	27
Foto 8 - Manejo e captura de serpentes (09/12/2022)	27
Foto 9 – Treinamento de animais peçonhentos (19/12/2022)	28
Foto 10 - Manejo e captura de invertebrados peçonhentos (20/12/2022)	28
Foto 11 – <i>Crotalus durissus</i> (10/09/2022)	38
Foto 12 – <i>Oxyrhopus guibei</i> (14/09/2022)	38
Foto 13 – <i>Dipsas mikanii</i> (06/10/2022)	38
Foto 14 – <i>Micrurus frontalis</i> (07/11/2022).	38
Foto 15 <i>Erythrolamprus poecilogyrus</i> (12/11/2022)	38
Foto 16 – <i>Micrurus frontalis</i> (21/11/2022).	38
Foto 17 – <i>Amphisbaena alba</i> (28/11/2022)	39
Foto 18 – <i>Crotalus durissus</i> (29/11/2022)	39
Foto 19 – <i>Elicops sp</i> (30/11/2022).	39
Foto 20 – <i>Leptotila sp</i> (05/12/2022).	39
Foto 21 – <i>Leptotila sp</i> (05/12/2022).	39
Foto 22 – Percurso (Data: 03/09/2022)	44
Foto 23 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 03/09/2022)	44
Foto 24 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 17/09/2022)	45
Foto 25 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 17/09/2022)	45
Foto 26 – Percurso (Data: 08/10/2022)	45
Foto 27 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 08/10/2022)	45
Foto 28 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 22/10/2022)	46
Foto 29 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 22/10/2022)	46
Foto 30 – Percurso (Data: 12/11/2022)	46
Foto 31 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 12/11/2022)	46
Foto 32 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 19/11/2022)	47
Foto 33 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 19/11/2022)	47
Foto 34 – Percurso (Data: 03/12/2022)	47
Foto 35 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 03/12/2022)	47
Foto 36 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 17/12/2022)	48
Foto 37 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 17/12/2022)	48
Foto 38 – Placas de sinalização (Data: 17/09/2022).	49

Foto 39 – Instalação placas de sinalização 2 (Data: 19/11/2022).49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Área Supressão Vegetal – Eixo e Áreas de Apoio.	29
Figura 2 – Área Supressão Vegetal – Acesso MD01 e MD02.	30
Figura 3 – Pontos de afugentamento, resgate de fauna, realocações, e presença de ninhos de abelhas nativas sem ferrão.	36
Figura 4 – Locais de encontro com espécies na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (Decreto 63.853/2018).	37
Figura 5 – Representação da área objeto das vistorias de monitoramento de atropelamento de fauna silvestre.....	43

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 –Registros por grupo de fauna – Acumulado	32
Gráfico 2 – Registros do número de exemplares resgatados, por espécie.	33
Gráfico 3 –Registros por grupo de fauna com o número de espécies categorizadas pelo Decreto nº 63.853/2018 – Acumulado (desde de janeiro de 2019).	34

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADA – Área Diretamente Afetada
AID – Área de Influência Direta
ANA – Agência Nacional de Águas
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
CA – Certificado de Aprovação
CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONSORCIO BP – Consórcio BP OAS–CETENCO
CTF/APP – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
CR – Certificado de Regularidade
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EPI – Equipamento de Proteção Individual
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia
NR – Norma Regulamentadora
PBA – Plano Básico Ambiental
PGA – Programa de Gestão Ambiental
PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
PSV – Programa de Supressão de Vegetação
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
SMA – Secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

APRESENTAÇÃO

O Consórcio BP OAS-CETENCO apresenta o produto correspondente ao **12º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ANDAMENTO AMBIENTAL** do Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna referente ao contrato de implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiá – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas, conforme o Contrato firmado N° 2018/11/00032.2.

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa atender à exigência ambiental do Contrato: N° 2018/11/00032.2, cujo objetivo é a implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiá – PCJ, nos municípios Pedreira e Campinas com eficácia e qualidade requeridas.

O escopo deste **Relatório Ambiental do Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna** que está baseado nas atividades realizadas no período de **01 de setembro a 31 de dezembro de 2022**.

O principal objetivo deste Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna é garantir a conservação da diversidade faunística das áreas compreendidas pela implantação da barragem de Pedreira. A necessidade dele se baseia nas especificidades relativas a cada uma das ações impactantes sobre a fauna terrestre, bem como as condicionantes estabelecidas na Licença Prévia – LI e Pareceres Técnicos específicos emitidos pela SMA/DeFau.

O programa é composto pelos seguintes subprogramas:

- Subprograma de monitoramento de fauna;
- Subprograma de resgate da fauna silvestre;
- Subprograma de monitoramento dos eventos de atropelamento de fauna;
- Subprograma de recepção, atendimento e destino dos animais silvestre.

Para execução deste Programa foi obtida Autorização de Manejo in situ nº 99161/2018 e nº 100523/2018 e suas atualizações, referente às atividades de resgate da fauna terrestre e de monitoramento de atropelamento de fauna da Barragem Pedreira.

2. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A seguir apresenta-se o detalhamento das condicionantes preconizadas na LI nº2557, referente ao programa e acompanhamento ambiental da Barragem Pedreira.

Item 2.24 - *Apresentar, antes das atividades de supressão de vegetação, os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Fauna, contemplando, no mínimo: metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada, registros fotográficos das atividades, avaliação crítica dos resultados obtidos, equipe técnica responsável com respectivas ARTs, cronograma para o próximo período etc. Demonstrar a revisão da malha amostral do Subprograma, de modo a contemplar pontos na área da futura APP a ser revegetada, em ambas as margens do futuro reservatório e nos fragmentos que serão utilizados na translocação da fauna, além de fragmentos expressivos de vegetação nativa a serem suprimidos, conforme diretrizes do Parecer Técnico 468/18/IE.*

Atendido.

Item 2.25 - *Apresentar, antes das atividades de supressão de vegetação, o levantamento da capacidade de suporte das potenciais áreas de soltura da fauna, com base nos dados obtidos na primeira campanha de monitoramento de fauna e considerando os estudos florísticos e fitossociológicos realizados na área. Deverá ainda ser apresentada a comprovação da dominialidade das áreas de soltura e/ou as anuências dos proprietários.*

Atendido.

Item 2.26 - *Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e durante a supressão de vegetação; monitoramentos realizados; metodologias empregadas; localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas; equipe técnica responsável com respectivas ARTs; e cronograma para o próximo período. Tais relatórios deverão incluir os registros de eventuais atropelamentos da fauna, os quais deverão subsidiar a indicação das vias de circulação a serem sinalizadas na área sob influência do empreendimento.*

Em atendimento, conforme relatório em tela.

Item 3.11 – *Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e respectivos Subprogramas (de Monitoramento da Fauna, de Resgate de Fauna, de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna e Recepção, e de Atendimento e Destino da Fauna), no mínimo, as atividades desenvolvidas para a salvaguarda da fauna, monitoramentos realizados, os métodos empregados, as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos, com quantitativos dos procedimentos (resgate, soltura, afugentamento, eventuais óbitos), registros de recebimento de animais e análise crítica dos resultados.*

Este item será atendido antes da solicitação da LO.

- **Autorização DeFau**

Resgate de Fauna Silvestre

Nº99161/2018 – Emitida em: 12/11/2018 Validade: 17/04/2019 (substituída em 17/04/2019 pela próxima);

Nº29434/2019 – Emitida em: 17/04/2019 Validade: 13/11/2019 (substituída em 17/09/2019 pela próxima);

Nº75726/2019 – Emitida em: 17/09/2019 Validade: 13/11/2019 (substituída em 28/01/2019 pela próxima);

Nº93346/2019 – Emitida em: 14/11/2019 Validade: 14/03/2020 (substituída em 28/01/2019 pela próxima); e

Nº20699/2020 – Emitida em: 26/03/2010 Validade: 07/01/2021 (substituída em 27/01/2021 pela próxima); e.

Nº 4256/2021 – Emitida em 27/01/2021 Validade 25/09/2021 (substituída em 27/01/2021 pela próxima)

Nº 043665/2022 – Emitida em 01/07/2022 Validade 07/02/2023.

Atropelamento de Fauna

Nº 100523/2018 – Emitida em: 14/11/2018 Validade: 31/08/2021 (substituída em 01/06/2020 pela próxima);

Nº 30429/2020 – Emitida em: 01/06/2020 Validade: 07/01/2021 (substituída em 16/12/2020 pela próxima); e

Nº 64258/2020 – Emitida em: 16/12/2020 Validade: 25/09/2021 (Substituída em 04/07/2022).

Nº 43768/2022 – Emitida em: 04/07/2022 Validade: 07/02/2023 (Atual)

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2.1 Equipe Técnica

Nome	Função Exercida	Formação	Registro
Denis Dorighello Tomás	Responsável de Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Geógrafo	CREA 0601944001
Maria Elena Basílio	Coordenadora dos Programas Ambientais	Engenheira Agrônoma	CREA 5061242441
Luis Alberto de Oliveira	Coordenador do Meio Biótico	Engenheiro Florestal	CREA 5063209653
Fernando Mendonça d'Horta	Monitoramento de Fauna / ASV	Engenheiro Florestal	CREA 5060444216
Matteus Campo Rocha	Responsável de Meio Ambiente	Biólogo	CRBIO 109094/01D
Noel Eduardo de Oliveira Cintra	Coordenador Especialista em fauna silvestre	Médico Veterinário	CRMV/SP 42786

Quadro 1 – Equipe de Coordenação Técnica e Gestão Operacional.

3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA

3.1 Atendimento aos Objetivos, Metas e Indicadores do Programa

O atendimento aos objetivos, metas e indicadores está sintetizado nos **Quadros 2, 3 e 4**, a seguir.

3.1.1 Atendimento aos Objetivos

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA		
Subprograma de Monitoramento da Fauna		
Objetivos	Status	Justificativa
Conhecer e avaliar os reais impactos sobre a fauna decorrentes das atividades de implantação e operação do empreendimento	Em atendimento	A partir das campanhas de monitoramento de fauna, realizadas com periodicidade quadrimestral, esse objetivo é atendido.
Avaliar a efetividade das ações propostas no Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal.	Em atendimento	Projeto de reflorestamento encontra-se em andamento
Indicar as medidas corretivas que venham a ser necessárias.	Em atendimento	Até o momento não foram necessárias medidas corretivas
Evitar as ocorrências de morte ou ferimento de animais silvestres, decorrentes das atividades de implantação do empreendimento.	Em atendimento	Para garantir a integridade dos espécimes, além de seguir as ações, o empreendimento contratou equipe especializada, elaborou e vem seguindo o plano de trabalho com as devidas autorizações já emitidas. Também implantou o posto de atendimento e firmou parceria com o CRAS da Mata Ciliar
Resgatar espécimes da fauna silvestre durante as atividades de implantação do empreendimento.	Em atendimento	Os espécimes com baixa mobilidade estão sendo resgatados.
Avaliar áreas contíguas bem preservadas e suas populações naturais visando adensamentos pontuais experimentais e não-pontuais para a relocação de fauna durante a implantação do canteiro, supressão da vegetação e resgate.	Em atendimento	A partir das campanhas de monitoramento de fauna, realizadas com periodicidade quadrimestral, esse objetivo é atendido
Realizar os procedimentos necessários para garantir a integridade dos espécimes resgatados.	Em atendimento	Para garantir a integridade dos espécimes, além de seguir as ações, o empreendimento contratou equipe especializada, elaborou e vem seguindo o plano de trabalho com as devidas autorizações já emitidas. Também implantou o posto de atendimento e firmou parceria com o CRAS da Mata Ciliar

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA		
Subprograma de Monitoramento da Fauna		
Realizar inventário, registrar e catalogar todos os espécimes resgatados, assim como seus dados biológicos, ecológicos, sanitários, de captura e seu destino final, como forma de complementação do inventário faunístico.	Em atendimento	Os dados detalhados dos espécimes resgatados são registrados em planilha apresentada no decorrer deste relatório.
Desenvolver ações de aproveitamento científico, processando e destinando o material coletado que se encontrar bem preservado (vítimas de acidentes que vierem a óbito) para instituições de pesquisas (ex. museus, universidades).	Em atendimento	O empreendimento firmou parceria com a UNIFAJ
Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre		
Promover o afugentamento e a retirada de animais das áreas diretamente afetadas pelas interferências da barragem.	Em atendimento	Antes do início das atividades de supressão o Consórcio Construtor realiza o afugentamento prévio dos animais silvestres, sempre em direção à área mais preservada.
Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna		
Mitigar os impactos por perda de indivíduos da fauna por atropelamento durante as atividades de implantação das infraestruturas de apoio às obras.	Em atendimento	O Consórcio Construtor vem realizando palestras de conscientização com os funcionários do empreendimento, além de instalar placas de sinalização e redutores de velocidade ao longo das vias.
Subprograma de Recepção, Atendimento e Destinação de Animais Silvestres		
Realizar o tratamento médico veterinário em animais eventualmente feridos na fuga ou resgate, de modo a permitir posteriormente a soltura em áreas pré-estabelecidas.	Em atendimento	Os animais que apresentam algum ferimento são tratados na base de apoio de animais silvestres por médico veterinário antes de serem reintroduzidos nas áreas de soltura ou enviados ao CRAS

Quadro 2 – Atendimento aos objetivos.

3.1.2 Atendimento às Metas

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA		
Subprograma de Monitoramento da Fauna		
Metas	Status	Justificativa
Gerar dados sobre os efeitos da implantação e operação do empreendimento sobre a fauna	Em atendimento	A partir das campanhas de monitoramento de fauna, realizadas com periodicidade quadrimestral, os dados sobre os efeitos da implantação sobre a fauna estão sendo gerados.
Gerar dados sobre os efeitos das medidas compensatórias sobre a fauna	Em atendimento	A partir das campanhas de monitoramento de fauna, realizadas com periodicidade quadrimestral, os dados sobre os efeitos das medidas compensatórias sobre a fauna estão sendo gerados.
Minimizar a ocorrência do número de acidentes com a fauna silvestre, durante a fase de implantação	Em atendimento	Redutores de velocidade e treinamentos específicos estão sendo realizados.
Realizar o salvamento da fauna nas áreas de implantação do empreendimento, durante as atividades de supressão de cobertura vegetal e de enchimento do reservatório	Em atendimento	É mantida equipe de fauna durante as atividades de supressão.
Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre		
Identificar e evitar ações antropogênicas que possam comprometer a fauna.	Em atendimento	São ministradas regularmente palestras aos funcionários, além de realizar atividades de educação ambiental com a população local
Garantir a segurança da fauna silvestre durante o enchimento do reservatório	Não iniciado	Previsto para o período de enchimento
Manter um programa de controle das ações de soltura/relocação da fauna silvestre, evitando adensamentos pontuais a exacerbar competição espacial e alimentar.	Em atendimento	As solturas estão sendo realizadas nas áreas pré-determinadas
Manter um banco de dados da fauna silvestre aberto a outras ações ambientais, especialmente àquelas que se utilizam dados faunísticos secundários para a sua execução	Em atendimento	Os dados gerados são apresentados nos relatórios quadrimestrais
Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna		
Ações de disseminação de práticas de condução responsável	Em atendimento	São feitos treinamentos com os colaboradores
Capacitação do responsável pelo monitoramento dos atropelamentos e vistoria das áreas	Em atendimento	Responsável pelo monitoramento é capacitado

Quadro 3 – Atendimento às metas.

3.1.3 Indicadores

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA		
Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre		
Indicador	Status Acumulado	Status do período
	Indivíduo / Espécie	Indivíduo / Espécie
Afugentamento - número aproximado refere aos que foram visualizadas durante a atividade	218	0
Número de animais resgatados (Indivíduo/espécie)	309/54	5/5
Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino dos Animais Silvestres		
Destinação – Realocados (soltura). Soma de animais recebidos na base e animais sem passagem na base.	277	07/07
Destinação – Encaminhamentos ao CRAS Mata Ciliar	10	2
Destinação – Em Quarentena (aguardando destinação)	41	1
Destinação – Óbitos/Universidade	52	0
Recepção e atendimento de animais na Base de Fauna	249	05/05
Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna		
Número de espécies identificados	32	4/4
Número de indivíduos registrados (Destinados à Universidade)	59	4
Número de registros por km percorrido	1,96	0,13

Quadro 4 – Indicadores.

3.2 Resumo das Atividades Anteriores – Histórico

- Elaboração do Plano de Trabalho – Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna – Julho 2018;
- Autorizações de Manejo in situ nº 99161/2018 e nº 100523/2018, referentes, respectivamente às atividades de resgate da fauna terrestre e de monitoramento de atropelamento de fauna da Barragem Pedreira;
- Carta de aceite do Laboratório de Ecologia Estrutural e Funcional da Universidade Paulista – Campus Sorocaba, manifestando interesse em receber exemplares de fauna silvestre, dos grupos de Mastofauna, Avifauna e Herpetofauna, que venham a ser coletados durante Resgate da Fauna Silvestre das Barragens;
- Carta de aceite do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS da Associação Mata Ciliar, manifestando interesse em receber exemplares de fauna silvestre, dos grupos de Mastofauna, Avifauna e Herpetofauna, que venham a ser resgatadas ou se acidentarem, no período de instalação, execução das obras e/ou enchimento do reservatório da Barragem Pedreira;
- Atendimento ao Item 2.25 da LI de Pedreira, com Relatório encaminhado em 28/01/19, – Processo CETESB.004766/2019–50;
- Atendimento ao Item 2.24 da LI de Pedreira, Relatório Preliminar encaminhado em 28/01/19 Processo CETESB.004766/2019–50. Relatório Complementar encaminhado 14/02/19 – Processo CETESB 008917/2019–49;

O **Quadro 5**, apresenta os relatórios quadrimestrais emitidos até o momento.

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
Julho - 2019	Emissão do 1º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2019	Emissão do 2º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Março - 2020	Emissão do 3º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2020	Emissão do 4º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
	Ambiental do empreendimento
Setembro - 2020	Emissão do 5º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2021	Emissão do 6º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2021	Emissão do 7º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2021	Emissão do 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro- 2022	Emissão do 9º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2022	Emissão do 10º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2022	Emissão do 11º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.

3.3 Atividades Desenvolvidas no Período

3.3.1 Subprograma de Monitoramento de Fauna

As dez primeiras campanhas do Subprograma de Monitoramento de Fauna da Barragem Pedreira foram realizadas com sucesso, mantendo-se a periodicidade quadrimestral, exceto pelo maior período que separa a terceira e a quarta campanha devido ao problema de saúde pública causado pela pandemia de coronavírus, quando os trabalhos de campo foram suspensos.

Durante cada campanha foram realizados 10 dias efetivos de amostragem das áreas monitoradas. Assim, foram gerados cerca de 172.800 minutos de gravações por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP); 36.000 câmeras.hora, por meio de cameras-trap; 14.400 parcelas.hora, por meio de parcelas de areia (ou camas de pegada); e aproximadamente 48.000 minutos por meio de procura ativa.

Destaca-se a contribuição do MAP na geração de dados para a caracterização da comunidade animal. Por meio desse método foi possível gerar uma quantidade de informações muito superior ao gerado pelos métodos tradicionais. Por outro lado, as informações geradas por meio do MAP permitiram a realização de análises integrativas, gerando informações sobre padrões espaciais (comparações entre remanescentes e entre distâncias monitoradas) e temporais (entre campanhas) de toda a comunidade animal presente na área sob influência do empreendimento.

De uma maneira geral, os resultados obtidos durante as dez campanhas de monitoramento de fauna confirmam e reforçam o diagnóstico apresentado no EIA deste empreendimento, assim como nos estudos que sucederam o EIA (ex. levantamentos realizados na área para a elaboração do Laudo de Fauna que instruiu a solicitação da ASV). A comunidade animal (aves, mamíferos de médio/grande porte, répteis e anfíbios) presente na área de estudo é característica de ambientes perturbados do interior do Estado de São Paulo. São espécies típicas de fragmentos da Floresta Estacional Semidecidual e de ambientes sob maior pressão antrópica, que se caracterizam pela maior resiliência e capacidade de dispersão por ambientes antrópicos.

Ressalta-se que, durante as dez primeiras campanhas de amostragem, foram obtidos registros de espécies que ainda não haviam sido registradas na área. Entre as espécies registradas merecem destaque o registro: (1) da juriri-vermelha (*Geotrygon violacea* - considerada "em perigo" no Estado de São Paulo), do chocão-barrado (*Hypoedaleus guttatus*) e do matracão (*Batara cinerea*) aves que ocorrem em baixa abundância e apresenta comportamento discreto, tendo sido registradas apenas por meio do MAP; e (2) do gato-domato (*Leopardus guttulus*), espécie de felino de pequeno porte, que também se apresenta em baixa abundância, considerada ameaçada no Estado de São Paulo e vulnerável em âmbito nacional, registrada apenas por meio da camera-trap.

As análises de suficiência amostral indicam que a base de dados gerada até o momento é representativa da comunidade animal das áreas sob influência da Barragem Pedreira. Entre os grupos amostrados, as aves parecem ser aquele cujas curvas de suficiência amostral estão mais próximas da assíntota. Tal fato deve-se, principalmente, à grande quantidade de dados geradas por meio do MAP. De qualquer modo, para todos os grupos ainda é esperado o registro de novas espécies. Os resultados obtidos durante as dez primeiras campanhas de monitoramento revelam, não apenas padrões espaciais de

variação na comunidade, mas também padrões temporais, e permitem fazer algumas considerações em relação às hipóteses propostas para teste:

- Hipótese 1 - A supressão de vegetação resultará em mudanças negativas na composição e estrutura da comunidade animal

Verificou-se, por meio das análises de paisagens sonoras e da avifauna, sinais dos impactos da supressão de cobertura vegetal ocorrida para a implantação do Eixo da Barragem Pedreira.

Embora nas análises de percentual de uso do espaço acústico não tenham sido registradas diferenças significativas entre os dois remanescentes estudados (próximo ao eixo, que sofreu supressão; e da cabeceira do futuro reservatório, que não sofreu supressão) nas análises de composição dos soundscapes a diferença foi significativa.

Em relação ao percentual de uso foram registrados importantes diferenças entre as campanhas de amostragem. Os padrões de variação entre campanhas observados nos dois remanescentes, entretanto, são bem distintos. No remanescente próximo ao eixo (que sofreu supressão) verifica-se um maior distanciamento da primeira para a segunda campanha, do que desta última para a terceira. Diferentemente, no remanescente localizado na cabeceira do futuro reservatório registrou-se um distanciamento maior da terceira e quarta campanhas em relação às duas primeiras, enquanto entre estas a diferença é relativamente pequena. Na quinta campanha o percentual de uso do espaço acústico no remanescente próximo da cabeceira do futuro reservatório se destaca dos demais. O resultado obtido para esse remanescente parece responder mais às variações climáticas entre campanhas. Na sexta campanha, como consequência do início da estação seca (menor umidade e temperatura) verificou-se uma queda acentuada da atividade acústica em ambos os remanescentes estudados, voltando a crescer na sétima e oitava campanha. Na nona campanha os valores voltam a cair, tendendo a subir, novamente, na décima campanha.

As diferenças entre os padrões de variação da atividade acústica (entre campanhas) observadas entre os dois remanescentes monitorados podem estar relacionados à atividade de supressão de vegetação. A partir da segunda campanha, realizada durante a atividade de supressão de vegetação, verifica-se um salto no percentual de uso do espaço acústico no remanescente impactado. Isso pode estar ligado ao efeito do afugentamento de espécies, que aumenta, provisoriamente, a abundância das espécies

(crowding effect). É importante notar que as duas primeiras campanhas foram realizadas entre o final do período chuvoso e o período seco, quando não é esperada grande variação na atividade sonora, como observado no remanescente que não sofreu supressão. Entretanto, para a terceira e quarta campanhas, realizadas no final do período de seca, era esperado um incremento muito maior na atividade acústica, em razão deste ser o período pré-reprodutivo para muitas das espécies animais. Isso é verificado no fragmento que não sofreu supressão, com o percentual de uso do espaço acústico saltando de 4-6% para 17-19%. Por outro lado, o incremento do uso no remanescente onde houve supressão é bem menos expressivo (apesar de significativo), ou seja, de 7-11% para 11-14%.

Em síntese, as diferenças observadas entre os dois remanescentes ao longo das dez campanhas de monitoramento (tanto em relação ao percentual de uso do espaço acústico, como em relação à composição da paisagem sonora e da comunidade de aves) são consistentes com os efeitos esperados da supressão de cobertura vegetal nativa. Nesse sentido, as predições relacionadas à Hipótese H1 são corroboradas.

- Hipótese 2: A soltura de espécimes capturados nas áreas objeto de supressão resultará em mudanças negativas na composição e estrutura da comunidade animal das áreas de soltura.

Até o momento não foi possível identificar impactos decorrentes da soltura dos espécimes animais resgatados durante as atividades de supressão de vegetação. A soltura é realizada tanto em remanescentes que já sofreram o impacto da supressão de vegetação como em remanescentes que ainda não foram impactados. A falta de sinais perceptíveis da soltura deve-se principalmente a dois fatores: (1) o número relativamente pequeno de espécimes capturados e soltos; e (2) o forte efeito da sazonalidade e, principalmente, da supressão de vegetação sobre essas comunidades; tornando difícil isolar os eventuais efeitos da soltura.

- Hipótese 3: A restauração florestal que está sendo implementada resultará em mudanças positivas na composição e estrutura da comunidade animal.

Os resultados obtidos por meio do monitoramento das APPs do futuro reservatório, que estão sendo objeto de restauração florestal, ainda não indicam mudanças na fauna dessas áreas. Apenas com o desenvolvimento dos plantios e consequente mudança na diversidade e estrutura da vegetação, incremento na oferta de recursos e mudanças nas

condições microclimáticas se estabelecerá o processo de mudança da comunidade animal. Assim, espera-se que os efeitos da melhoria nas condições ambientais dessas áreas possam ser capturados com a continuidade do monitoramento.

Cabe ressaltar que embora os levantamentos da comunidade de mamíferos, de répteis e anfíbios tenham contribuído de forma significativa para o melhor conhecimento das áreas estudadas, ainda contribuem de pouco para o teste das hipóteses. Entretanto, com o avanço do monitoramento este cenário deve ser alterado. **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.01-PMCF.**

3.3.2 Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre

As atividades relacionadas no Subprograma são compostas pelas Etapas de Pré-supressão e Fase de Supressão, as quais serão melhores detalhadas ao longo deste documento.

As fases de pré-supressão vegetal e as atividades de supressão são executadas de acordo com a evolução dos trabalhos, com foco nos seguintes pontos:

- 1) Identificação das áreas de intervenção:
 - Novas vistorias “*in loco*” das áreas previstas para supressão vegetal, e acompanhamento da remoção de material lenhoso em áreas já suprimidas;
 - Aberturas de trilhas e Rotas de fuga para fauna (sub-bosque);
 - Início da supressão vegetal nas áreas vistoriadas;
- 2) Realização de treinamento e simulado:
- 3) Indicação das áreas de corte para a equipe de supressão;
 - Acompanhamento e identificação das áreas destinadas ao corte de acordo com a liberação e programação.
- 4) Afugentamento e Resgate da fauna.
 - Realização de vistoria prévia das áreas antes do início das atividades de supressão, realizando o Afugentamento e Resgate de fauna.

3.3.2.1 Treinamentos

Ao longo do período abrangido por este relatório foram realizados treinamentos relacionados a fauna local (silvestre e doméstica). As listas de presença seguem no **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.02-PMCF**. No **Quadro 6** é possível verificar o resumo dos treinamentos realizados no período.

Tema	Data	Duração	Público alvo	Local
Treinamento acidentes com animais peçonhentos	14/09/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Treinamento acidentes com animais peçonhentos	14/09/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Treinamento acidentes com animais invertebrados peçonhentos	27/10/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Treinamento identificação de corais verdadeira	07/11/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Crimes ambientais e proteção de fauna silvestre	02/12/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Manejo e captura de serpentes	09/12/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Animais peçonhentos	19/12/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP
Manejo e captura de invertebrados peçonhentos	20/12/2022	0,5 hora	Colaboradores	Consórcio BP

Quadro 6 – Treinamentos ministrados no quadrimestre.

A seguir são apresentados os registros fotográficos dos treinamentos realizados no período do decimo quadrimestre.



Foto 1 – Treinamento acidentes com animais peçonhentos. (Data 14/09/2022)



Foto 2 – Treinamento acidentes com animais peçonhentos (Data 14/09/2022).



Foto 3 – Treinamento acidentes com animais invertebrados peçonhentos (Data 27/10/2022).



Foto 4 – Treinamento acidentes com animais invertebrados peçonhentos (Data 27/10/2022).



Foto 5 – Treinamento identificação de corais verdadeira (07/11/2022)



Foto 6 – Treinamento identificação de corais verdadeira (07/11/2022)



Foto 7 – Treinamento Crimes ambientais e proteção de fauna silvestre (Data 02/12/2022).



Foto 8 - Manejo e captura de serpentes (09/12/2022)



Foto 9 – Treinamento de animais peçonhentos (19/12/2022)



Foto 10 - Manejo e captura de invertebrados peçonhentos (20/12/2022)

A equipe de técnicos de meio ambiente e segurança, além da equipe de resgate de fauna, dissemina informações sobre o tema e transmite orientações sobre possível presença de animais silvestres/peçonhentos e da importância da utilização de EPI's visto os riscos de acidentes aos colaboradores que atuam diretamente ou não com atividades de supressão.

3.3.2.2 Vistoria

As áreas destinadas à supressão vegetal devem ser vistoriadas antes do início de qualquer atividade no local, com o objetivo de identificar ninhos, tocas, abrigos, rotas de fuga, corpos hídricos e outros elementos relativos à presença de fauna, bem como em áreas de limpeza e estoque de materiais. Não houve atividade de supressão no período.

As **Figuras 1 e 2** identificam as áreas de supressão vegetal, cuja as autorizações foram emitidas.




Figura 1 – Área Supressão Vegetal – Eixo e Áreas de Apoio.




Figura 2 – Área Supressão Vegetal – Acesso MD01 e MD02.

3.3.2.3 Afugentamento e Resgates de Fauna Silvestre

O afugentamento indireto é realizado pelo trânsito de automóveis e maquinários pesados nas frentes de obra, promovendo ondas vibratórias no solo e ruídos, auxiliando na dispersão de animais como aves, répteis e mamíferos, que se encontram em áreas próximas à obra.

Ao contrário dos demais animais, a avifauna é um grupo que permanece nas áreas de supressão de forma ativa e seu afugentamento muitas vezes é espontâneo devido à sua capacidade de voo, portanto, sem necessidade de intervenção direta. No período, não foram identificados indivíduos da avifauna que se encontrem na lista estadual de espécies em risco de extinção (Decreto 63.853/2018). Ressalta-se que embora algumas aves tenham sido avistadas, estas não foram contabilizadas no afugentamento por tratar-se de afugentamento indireto sem identificação da espécie.

Conforme solicitado pelo Defau/CMFS, caso a equipe de fauna identifique primatas mortos ou debilitados, deverá ser notificado de imediato o Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, seguindo os procedimentos contidos no Parecer Técnico nº 176/2019. No presente período não foram avistados ou registrados primatas em óbito ou debilitados.

Vale informar que a equipe técnica de fauna, também, realiza eventuais coletas e solturas de aracnídeos e escorpiões (artrópodes) nas frentes de serviço e escritórios, que possam causar risco aos colaboradores. Contudo, estes indivíduos não são contabilizados por não se tratar de grupo de interesse do programa.

O número de espécimes afugentados se refere aos que foram visualizados durante a atividade de afugentamento, ou seja, espécimes afugentados diretamente.

Todas as espécies resgatadas foram realocadas em área pré-determinada e aprovada no processo de licenciamento.

Todos os exemplares encontrados já mortos ou que vieram a óbito no período que abrange o presente relatório, permanecem devidamente acondicionados na Base de Apoio de Animais Silvestres aguardando destinação para aproveitamento científico.

No **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.03-PMCF** são apresentados os resultados com as informações gerais obtidas desde o início das atividades do Programa de Resgate de Fauna Silvestre até o presente quadrimestre.

O **Gráfico 1** indica as espécies registradas durante as atividades separadas por grupo, entre os quais destaca-se o resgate de espécies do grupo herpetofauna e o afugentamento do grupo de avifauna. Cumpre salientar que indivíduos ou espécies afugentadas se referem àquelas que foram afugentados diretamente.




Gráfico 1 –Registros por grupo de fauna – Acumulado

O **Gráfico 2** apresenta o registro por espécie, dos exemplares resgatados de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, no qual é possível verificar que registros de indivíduos da espécie.



Gráfico 2 – Registros do número de exemplares resgatados, por espécie.

No **Gráfico 3** é apresentado o número acumulado de espécies afugentadas ou avistadas (de mastofauna, herpetofauna e avifauna) durante o período de obras, identificadas como espécies que aparecem na lista do Decreto nº 63.853/2018, o qual classifica as categorias de ameaça da fauna silvestre no Estado de São Paulo, sendo categorizadas em regionalmente extinta, criticamente em perigo, em perigo, vulnerável, quase ameaçada e dados insuficientes. Ressalta-se que, no quadrimestre em tela, não foram identificadas espécies enquadradas nessa lista.




Gráfico 3 –Registros por grupo de fauna com o número de espécies categorizadas pelo Decreto nº 63.853/2018 – Acumulado (desde de janeiro de 2019).

O **Quadro 7** apresenta as espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018, avistadas/afugentadas desde o início das atividades.

Data	Identificação do Local	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	Nome científico	Nome popular	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018
-	-	1	MASTOFAUNA	<i>Puma concolor</i>	Onça Parda	Vulnerável
03/04/2019	A4	1	MASTOFAUNA	<i>Puma yagouaroundi</i>	Gato-mourisco	Quase Ameaçada
08/04/2019	A4	1	MASTOFAUNA	<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	Vulnerável
27/04/2019	A9	2	AVIFAUNA	<i>Ara ararauna</i>	Arara-canindé	Vulnerável
18/05/2019	A3	2	MASTOFAUNA	<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	Vulnerável
16/07/2019	A3	1	AVIFAUNA	<i>Urubitinga coronata</i>	águia-cinzenta	Criticamente em Perigo
16/07/2019	A3	1	AVIFAUNA	<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Quase Ameaçada
28/08/2019	Canteiro industrial	1	AVIFAUNA	<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Quase Ameaçada
31/08/2019	A8	1	AVIFAUNA	<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Quase Ameaçada
14/11/2019	Acesso MD01	1	AVIFAUNA	<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Quase Ameaçada

Data	Identificação do Local	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	Nome científico	Nome popular	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018
19/11/2019	Área eucaliptos	1	AVIFAUNA	<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Quase Ameaçada

Quadro 7 – Relação das espécies identificadas durante as atividades de resgate de fauna – Acumulado (desde janeiro de 2019).

A **Figura 3** apresenta os locais e as etapas de supressão vegetal, pontos de afugentamento, resgate de fauna, realocações, avistamento, presença de ninhos e colmeias de abelhas nativas (abelhas sem ferrão – ASF). Na sequência, a **Figura 4** apresenta os locais onde foram identificadas espécies indicadas na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (Decreto 63.853/2018), desde o início das atividades.




Figura 3 – Pontos de afugentamento, resgate de fauna, realocações, e presença de ninhos de abelhas nativas sem ferrão.




Figura 4 – Locais de encontro com espécies na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (Decreto 63.853/2018).

A seguir são apresentados os registros fotográficos das atividades de afugentamento e resgate de fauna durante o período.



Foto 11 – *Crotalus durissus* (10/09/2022).



Foto 12 – *Oxyrhopus guibei* (14/09/2022).



Foto 13 – *Dipsas mikanii* (06/10/2022).



Foto 14 – *Micrurus frontalis* (07/11/2022).



Foto 15 *Erythrolamprus poecilogyrus* (12/11/2022).



Foto 16 – *Micrurus frontalis* (21/11/2022).



Foto 17 – *Amphisbaena alba* (28/11/2022).



Foto 18 – *Crotalus durissus* (29/11/2022).



Foto 19 – *Elicops sp* (30/11/2022).



Foto 20 – *Leptotila sp* (05/12/2022).



Foto 21 – *Leptotila sp* (05/12/2022).

Realocação de Abelhas e Demais Espécies de Hymenoptera

A equipe de fauna vem realizando as identificações de ninhos de espécies nativas de Hymenoptera e demarcações com uso de ferramenta de geoprocessamento, para posteriormente proceder ao resgate e realocação completa, para local apropriado e com condições favoráveis.

No período não houve resgate de colmeias.

3.3.3 Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino dos Animais Silvestres

As atividades desse Subprograma elencadas no PBA, são apresentadas nos itens a seguir, onde são indicadas as realizações dos métodos propostos nesta etapa de execução do empreendimento. Ressalta-se que o local de atendimento à fauna é aqui denominado de Base de Apoio de Animais Silvestres.

3.3.3.1 Recepção e Triagem dos Animais

Todos os indivíduos de espécies da fauna silvestre resgatados no perímetro da barragem (localizados nas áreas de supressão vegetal, canteiros de obras, sede administrativa, acessos internos e entradas localizadas no perímetro da obra) são prontamente submetidos a uma operação de triagem, que consiste em exames físicos nos quais é feita a identificação taxonômica das espécies e, se possível, a determinação do sexo de todos os animais resgatados.

Todas as informações dos indivíduos resgatados, são compiladas em Fichas de Prontuário individuais. As Fichas contêm registros como: identificação no menor nível taxonômico possível, sexo, dados biométricos, idade reprodutiva, coordenadas geográficas do local de origem e apreensão, nome do responsável pela captura e resgate, possível capacidade de readaptação, dentre outras informações relevantes. Os prontuários podem ser apreciados no **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.04-PMCF**.

3.3.3.2 Avaliação Clínica

Todos os espécimes resgatados são submetidos a exames físicos realizados pelos Médicos Veterinários, que analisam suas condições individuais. Caso o animal apresente algum problema médico, esse será registrado em ficha clínica e o indivíduo recebe o tratamento necessário, neste caso, dentro da Base de Apoio de Animais Silvestres.

3.3.3.3 Destinação dos Animais

As realocações ocorreram sempre nas áreas pré-estabelecidas e aprovadas no Plano de Manejo pelo DeFau/SMA. As carcaças são acondicionadas em freezer e posteriormente encaminhadas para a universidade, quando há número significativo, são encaminhados à entidade parceira. Nesse quadrimestre, não foram encaminhados animais para a UNIFAJ. No período foi encaminhado animais para à Associação Mata Ciliar, **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.05-PMCF**.

3.3.4 Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamentos da Fauna

O Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamentos da Fauna tem como objetivo geral mitigar os impactos por perda de indivíduos da fauna por atropelamento durante as atividades de implantação das infraestruturas de apoio às obras das áreas diretamente afetadas pelas interferências da barragem Pedreira.

Para a etapa de implantação do empreendimento, o subprograma está estruturado em três ações:

- Sinalização e redutores de velocidade;
- Ações educativas;
- Monitoramento dos Atropelamentos;
- Sistema de Registros.

Visando definir os trechos mais críticos e a frequência com que ocorrem os atropelamentos, foram realizadas mensalmente duas campanhas com amostragens sistemática e quantitativa, com periodicidade e esforço padronizado. O monitoramento vem ocorrendo desde janeiro de 2019.

3.3.4.1 Caracterização da Área Percorrida

Foram percorridos nas campanhas aproximadamente 30 km das vias existentes (estradas vicinais e acessos) no interior da Área de Intervenção Direta da Barragem Pedreira, conforme **Figura 5**.




Figura 5 – Representação da área objeto das vistorias de monitoramento de atropelamento de fauna silvestre.

3.3.4.2 Monitoramento do Atropelamento

São realizadas mensalmente duas campanhas de amostragens sistemáticas e quantitativas. As amostragens de carro foram realizadas em baixa velocidade, aproximadamente 20 a 40 km/h, iniciando no canteiro de apoio – Fazenda Ingatuba e percorrendo estradas vicinais e acessos na AID.

Além das amostragens sistemáticas, a equipe de meio ambiente realizou rondas diárias em toda a área da obra, registrando todas as ocorrências de animais atropelados.

O formulário com o registro de atropelamento é apresentado no **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.06-PMCF**. O **ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.07-PMCF** apresenta a tabela com os animais atropelados identificados no trecho desde o início do programa.

As campanhas realizadas neste quadrimestre (10º quadrimestre) são resumidas na sequência.

Campanha 03/09/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 13°C min. e 30°C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir os registros fotográficos da atividade realizada no período.



Foto 22 – Percurso (Data: 03/09/2022).



Foto 23 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 03/09/2022).

Campanha 17/09/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 12°C min e 21°C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir o registro fotográfico da atividade realizada no período.



Foto 24 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 17/09/2022).



Foto 25 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 17/09/2022).

Campanha 08/10/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 14°C min. e 29°C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir os registros fotográficos da atividade realizada no período.



Foto 26 – Percurso (Data: 08/10/2022).



Foto 27 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 08/10/2022).

Campanha 22/10/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 18°C min e 30 °C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir o registro fotográfico da atividade realizada no período.



Foto 28 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 22/10/2022).



Foto 29 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 22/10/2022).

Campanha 12/11/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 16°C min. e 29°C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir os registros fotográficos da atividade realizada no período.



Foto 30 – Percurso (Data: 12/11/2022).



Foto 31 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 12/11/2022).

Campanha 22/10/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 18°C min e 32 °C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir o registro fotográfico da atividade realizada no período.



Foto 32 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 19/11/2022).



Foto 33 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 19/11/2022).

Campanha 03/12/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 19°C min. e 30°C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir os registros fotográficos da atividade realizada no período.



Foto 34 – Percurso (Data: 03/12/2022).



Foto 35 – Velocidade durante o monitoramento. (Data: 03/12/2022).

Campanha 17/12/2022 – Na data em questão a temperatura variou entre 16°C min e 29 °C max. Foram percorridos 30 km de estradas vicinais sem pavimentação sendo que ao longo do percurso não foi identificado nenhum animal atropelado.

A seguir o registro fotográfico da atividade realizada no período.



Foto 36 – Velocidade durante o monitoramento (Data: 17/12/2022).



Foto 37 – Percurso percorrido na ADA do empreendimento. (Data: 17/12/2022).

3.3.4.3 Ações Educativas

Como ações educativas, no período foi implantada placas de sinalização com intuito de conscientizar e orientar os motoristas sobre a presença da fauna de maneira inconspícua.



Foto 38 – Placas de sinalização (Data: 17/09/2022).



Foto 39 – Instalação placas de sinalização 2 (Data: 19/11/2022).

3.3.5 Planejamento das Próximas Atividades

O empreendimento continuará realizando quinzenalmente o monitoramento das vias existentes na área de influência do empreendimento para verificar a incidência ou não de atropelamento de fauna, bem como, promovendo ações de educação ambiental visando a proteção à fauna.

4. CRONOGRAMA – PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA

Os quadros a seguir apresentam o cronograma das atividades do Programa nos períodos: Ano 1 a Ano 5.

PROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA												
Atividades	Implantação											
	Ano 1											
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA												
Monitoramento da Fauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA SILVESTRE												
Treinamento da equipe												
Vistoria												
Afugentamento e resgates na Fase de Supressão de Vegetação dos Canteiros de obra e obras civis;												
Resgates na Fase de Supressão de Vegetação do Reservatório												
Resgates na Fase de Enchimento do Reservatório												
Soltura												
Aproveitamento Científico												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ATROPELAMENTO DE FAUNA												
Sinalização e redutores de velocidade na rodovia e vicinais												
Ações educativas												
Monitoramento do Atropelamento												
SUBPROGRAMA DE RECEPÇÃO, ATENDIMENTO E DESTINO DOS ANIMAIS SILVESTRES												
Definição da Infraestrutura (Posto de Atendimento dos Animais Silvestres)												
Triagem, tratamento/internação e recepção dos animais pelos médicos veterinários e biólogos da equipe												
Destinação (Soltura, CRAS, Mata Ciliar e UNIP)												
GERAL												
Relatórios Mensais												
Relatórios Quadrimestrais												

Quadro 8 – Cronograma – ano 1.

↑
Início da Obra

Atividades	Implantação											
	Ano 2											
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA												
Monitoramento da Fauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA SILVESTRE												
Treinamento da equipe												
Vistoria												
Afugentamento e resgates na Fase de Supressão de Vegetação dos Canteiros de obra e obras civis;												
Resgates na Fase de Supressão de Vegetação do Reservatório												
Resgates na Fase de Enchimento do Reservatório												
Soltura												
Aproveitamento Científico												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ATROPELAMENTO DE FAUNA												
Sinalização e redutores de velocidade na rodovia e vicinais												
Ações educativas												
Monitoramento do Atropelamento												
SUBPROGRAMA DE RECEPÇÃO, ATENDIMENTO E DESTINO DOS ANIMAIS SILVESTRES												
Definição da Infraestrutura (Posto de Atendimento dos Animais Silvestres)												
Triagem, tratamento/ internação e recepção dos animais pelos médicos veterinários e biólogos da equipe												
Destinação (Soltura, CRAS, Mata Ciliar e UNIP)												
GERAL												
Relatórios Mensais												
Relatórios Quadrimestrais												

Quadro 9 – Cronograma – ano 2.

Atividades	Implantação											
	Ano 3											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA												
Monitoramento da Fauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA SILVESTRE												
Treinamento da equipe												
Vistoria												
Afugentamento e resgates na Fase de Supressão de Vegetação dos Canteiros de obra e obras civis;												
Resgates na Fase de Supressão de Vegetação do Reservatório												
Resgates na Fase de Enchimento do Reservatório												
Soltura												
Aproveitamento Científico												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ATROPELAMENTO DE FAUNA												
Sinalização e redutores de velocidade na rodovia e vicinais												
Ações educativas												
Monitoramento do Atropelamento												
SUBPROGRAMA DE RECEPÇÃO, ATENDIMENTO E DESTINO DOS ANIMAIS SILVESTRES												
Definição da Infraestrutura (Posto de Atendimento dos Animais Silvestres)												
Triagem, tratamento/ internação e recepção dos animais pelos médicos veterinários e biólogos da equipe												
Destinação (Soltura, CRAS, Mata Ciliar e UNIP)												
GERAL												
Relatórios Mensais												
Relatórios Quadrimestrais												


Quadro 10 – Cronograma – ano 3.

Atividades	Implantação											
	Ano 4											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA												
Monitoramento da Fauna	■				■			■	■			
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA SILVESTRE												
Treinamento da equipe												
Vistoria									■	■	■	■
Afugentamento e resgates na Fase de Supressão de Vegetação dos Canteiros de obra e obras civis;	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resgates na Fase de Supressão de Vegetação do Reservatório										■	■	■
Resgates na Fase de Enchimento do Reservatório												
Soltura										■	■	■
Aproveitamento Científico			■		■				■			■
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ATROPELAMENTO DE FAUNA												
Sinalização e redutores de velocidade na rodovia e vicinais	■			■							■	
Ações educativas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoramento do Atropelamento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUBPROGRAMA DE RECEPÇÃO, ATENDIMENTO E DESTINO DOS ANIMAIS SILVESTRES												
Definição da Infraestrutura (Posto de Atendimento dos Animais Silvestres)												
Triagem, tratamento/ internação e recepção dos animais pelos médicos veterinários e biólogos da equipe	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Destinação (Soltura, CRAS, Mata Ciliar e UNIP)	■	■	■	■	■	■	■	■				
GERAL												
Relatórios Mensais	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relatórios Quadrimestrais	■				■				■			

Quadro 11 – Cronograma – ano 4.

Atividades	Implantação											
	Ano 5											
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA												
Monitoramento da Fauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA SILVESTRE												
Treinamento da equipe												
Vistoria												
Afugentamento e resgates na Fase de Supressão de Vegetação dos Canteiros de obra e obras civis;												
Resgates na Fase de Supressão de Vegetação do Reservatório												
Resgates na Fase de Enchimento do Reservatório												
Soltura												
Aproveitamento Científico												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ATROPELAMENTO DE FAUNA												
Sinalização e redutores de velocidade na rodovia e vicinais												
Ações educativas												
Monitoramento do Atropelamento												
SUBPROGRAMA DE RECEPÇÃO, ATENDIMENTO E DESTINO DOS ANIMAIS SILVESTRES												
Definição da Infraestrutura (Posto de Atendimento dos Animais Silvestres)												
Triagem, tratamento/ internação e recepção dos animais pelos médicos veterinários e biólogos da equipe												
Destinação (Soltura, CRAS, Mata Ciliar e UNIP)												
GERAL												
Relatórios Mensais												
Relatórios Quadrimestrais												

Quadro 12 – Cronograma – ano 5.



LEGENDA

- PREVISTO
- REALIZADO
- REPROGRAMADO
- FINALIZADO

5. ANEXOS

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.01-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.02-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.03-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.04-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.05-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.06-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.07-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.01-PMCF

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.02-PMCF

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS	3
3. HIPÓTESES A SEREM TESTADAS	4
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	5
4.1 Desenho Amostral	5
4.2 Desenho Analítico	26
5. RESULTADOS	33
5.1 Paisagens Sonoras (Comunidade)	33
5.2 Avifauna	45
5.3 Mastofauna	67
5.4 Herpetofauna	89
6. CONCLUSÕES	122
7. CRONOGRAMA	126
8. EQUIPE TÉCNICA	127
9. BIBLIOGRAFIA	128

ANEXOS

ANEXO I: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

1. INTRODUÇÃO

Para a implantação e operação da Barragem Pedreira, localizada entre os municípios de Pedreira/SP e Campinas/SP, estão sendo realizadas atividades cujos aspectos ambientais relacionados produzem impactos sobre a comunidade animal.

Entre as atividades causadores de impactos negativos sobre a fauna, destaca-se a supressão de cobertura vegetal. Além da perda de habitat, a remoção da vegetação nativa induz o deslocamento da fauna da área afetada para áreas vizinhas. Esse deslocamento é estimulado pelas ações de afugentamento de fauna que visam reduzir a perda de espécimes animais durante a supressão de vegetação. Por outro lado, espécimes resgatados nas áreas a serem suprimidas são posteriormente soltos em áreas com características similares àquelas de onde foram resgatados (áreas de soltura). Assim, torna-se necessário o monitoramento das comunidades animais das áreas vizinhas às áreas onde será realizada a supressão, assim como daquelas áreas que serão objeto da soltura dos animais resgatados.

Ainda, em razão da supressão de cobertura vegetal, será necessário, a título de compensação, a implementação de Projeto de Restauração Florestal. Esse projeto, entre outros objetivos, dedica-se a disponibilizar novos habitats para a fauna, equivalentes àqueles suprimidos. Portanto, torna-se necessário, também, o monitoramento de áreas onde será realizada a restauração florestal, de modo a avaliar a efetividade das ações propostas como compensação.

Para que seja possível avaliar as transformações ambientais decorrentes dos impactos causados pela instalação da Barragem Pedreira, assim como a efetividade das ações voltadas à compensação ambiental estão sendo realizadas campanhas de amostragem com periodicidade quadrimestral. No mês de janeiro de 2019 foi realizada uma primeira campanha. Em maio-junho e setembro-outubro, deste mesmo ano, foram realizadas, respectivamente, a segunda e a terceira campanha de amostragem da fauna de vertebrados terrestres.

Em razão dos problemas de saúde pública, e seguindo as orientações das autoridades de saúde, os trabalhos que deveriam ter sido realizados no início do ano de 2020 foram suspensos, sendo retomados em agosto deste mesmo ano. Após esse período de paralização das atividades de monitoramento, foi realizada a quarta campanha, entre agosto e setembro de 2020 e, quinta campanha entre dezembro e janeiro de 2021 e a sexta campanha, entre

abril e maio de 2021. A sétima campanha foi realizada entre agosto e setembro de 2021, enquanto a oitava campanha em dezembro de 2021; a nona campanha entre maio e junho de 2022; e a décima campanha entre setembro e outubro de 2022.

Ressalta-se que para as campanhas de monitoramento foi adotada uma malha de amostragem contemplando as diretrizes determinadas pela Cetesb, por meio do Parecer Técnico Cetesb nº 468/18/IE (Processo IMPACTO 189/2013 - 017840/2018-87 e-ambiente). Ou seja, uma malha de amostragem que inclui: (1) áreas da futura APP a ser revegetada; (2) ambas as margens do futuro reservatório; (3) fragmentos que serão utilizados para a soltura da fauna; e (4) fragmentos expressivos de vegetação nativa que serão afetados pela supressão.

2. OBJETIVOS

O objetivo principal do Monitoramento de Fauna das áreas sob influência da Barragem de Pedreira é compreender as mudanças na comunidade de vertebrados terrestres desencadeadas pela implantação do empreendimento, ou seja:

- Avaliar os impactos da supressão da cobertura vegetal nativa;
- Avaliar os impactos decorrentes da soltura de espécimes da fauna resgatados durante a atividade de supressão de vegetação; e
- Avaliar a efetividade das ações de compensação ambiental, ou seja, da implementação do Projeto de Restauração Florestal.

3. HIPÓTESES A SEREM TESTADAS

Conforme mencionado, o propósito do Monitoramento de Fauna é avaliar os efeitos dos impactos ambientais sobre os fragmentos de vegetação nativa vizinhos à ADA, e avaliar a efetividade das ações voltadas à compensação. Nesse sentido é importante explicitar as hipóteses que serão testadas neste subprograma:

- H1: Com a supressão de cobertura vegetal necessária para a implantação do empreendimento ocorrerá uma alteração significativa na paisagem acústica, assim como nas comunidades de aves, mamíferos de médio e grande porte, répteis e anfíbios;
- H2: A soltura dos espécimes animais resgatados durante as atividades de supressão de vegetação contribuirá para as alterações previstas na hipótese H1.
- H3: Com a implementação do projeto de Restauração Florestal (medida destinada à compensação pela supressão de vegetação) ocorrerá um incremento da diversidade de espécies animais nessas áreas; e

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste item são apresentadas informações a respeito do desenho, métodos e esforço amostrais empregados para o levantamento das comunidades de aves, mamíferos de médio/grande porte, répteis e anfíbios das áreas sob influência da Barragem Pedreira.

4.1 DESENHO AMOSTRAL

A. Período de Amostragem

Até o momento foram realizadas sete campanhas de monitoramento da comunidade de vertebrados terrestres, conforme apresentado na **Tabela 4.1-1**.

TABELA 4.1-1: Campanhas de amostragem da fauna de vertebrados terrestres

Campanha	Início	Término
Primeira	08/01/2019	21/01/2019
Segunda	10/05/2019	03/06/2019
Terceira	25/09/2019	17/10/2019
Quarta	27/08/2020	17/09/2020
Quinta	11/12/2020	02/01/2021
Sexta	29/04/2021	21/05/2021
Sétima	18/08/2021	10/09/2021
Oitava	04/12/2021	27/12/2021
Nona	30/05/2022	20/06/2022
Décima	25/09/2022	15/10/2022

Ressalta-se que os levantamentos de campo foram realizados de modo que todos os pontos/áreas de monitoramento fossem amostrados de maneira equivalente, considerando os diferentes conjuntos de métodos empregados.

B. Malha de Amostragem

Para o monitoramento de fauna foi definido um total de 21 pontos de amostragem distribuídos na área sob influência da Barragem Pedreira, contemplando, conforme solicitado no Parecer Técnico Cetestb n° 468/18/IE (Processo IMPACTO 189/2013 - 017840/2018-87 e-ambiente): (1) principais remanescentes de vegetação nativa existentes na área; (2) áreas previstas para a soltura dos espécimes resgatados durante as atividades de supressão de vegetação; (3) áreas que serão objeto do Projeto de Restauração Florestal a título de compensação pela supressão de cobertura



vegetal necessária para a implantação do empreendimento; e (4) áreas localizadas em ambas as margens do rio Jaguari.

Na **Figura 4.1-1** e **Tabela 4.1-2** é apresentada a distribuição dos pontos/áreas de amostragem definidos no Subprograma de Monitoramento de Fauna.




FIGURA 4.1-1: Distribuição dos pontos/áreas de amostragem definidos no Subprograma de Monitoramento de Fauna

TABELA 4.1-2: Pontos de amostragem da fauna de vertebrados terrestres (aves, mamíferos de médio e grande porte, répteis e anfíbios). Localização - RE: remanescente a ser afetado parcialmente pela supressão de vegetação nativa, AS: área de soltura de animais resgatados, PA: área de plantio em APP; Métodos - MP: monitoramento acústico passivo, CT: camera-trap, PA: procura ativa, CP: cama de pegada.

PONTOS	LOCALIZAÇÃO	MÉTODOS	HIPÓTESE A SER TESTADA	COORDENADAS UTM (SIRGAS2000)	
				UTM E(M) - F23S	UTM N (M) - F23S
PD 01	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	303.851,518	7.481.273,798
PD 02	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	304.079,188	7.481.097,983
PD 03	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	304.204,969	7.481.012,844
PD 04	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	303.688,668	7.481.003,414
PD 05	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	303.891,535	7.480.826,051
PD 06	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	304.041,785	7.480.724,000
PD 07	PA	PA, CP	H2	305.485,380	7.480.640,407
PD 08	PA	PA, CP	H2	305.397,869	7.480.367,008
PD 09	PA	PA, CP	H2	305.290,158	7.480.111,808
PD 10	RE,AS	PA, CT	H3	306.076,987	7.479.934,510
PD 11	RE,AS	PA, CT	H3	305.820,561	7.479.751,869
PD 12	RE,AS	PA, CT	H3	305.692,659	7.479.669,934
PD 13	PA	PA, CP	H2	305.042,231	7.479.534,226
PD 14	PA	PA, CP	H2	304.896,956	7.479.361,609
PD 15	PA	PA, CP	H2	304.756,327	7.479.182,896
PD 16	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	305.431,730	7.477.547,122
PD 17	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	305.307,081	7.477.457,840
PD 18	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	305.065,297	7.477.271,984
PD 19	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	305.595,352	7.476.888,057
PD 20	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	305.473,678	7.476.789,584
PD 21	RE,AS	GR, CT, PA	H1, H3	305.177,555	7.476.704,561

C. Métodos de Amostragem e Esforço Amostral

Os métodos e esforço amostrais são apresentados por grupo animal em razão das especificidades dos mesmos.

Avifauna

A amostragem da avifauna foi realizada utilizando-se o método de monitoramento acústico passivo descrito a seguir.

Monitoramento Acústico Passivo (MAP)

Para o MAP foram utilizados gravadores portáteis autônomos (LG L70 celular) protegido por uma caixa a prova d'água (*Grace Digital Eco Pod*) conectado por um cabo a um microfone (Monoprice – Model 600200), este, por sua vez, conectado externamente à caixa. Os gravadores foram instalados a cerca de 2 m de altura, fixados em árvores com diâmetro mínimo de 10 cm (**Foto 4.1-1**).



FOTO 4.1-1: Gravador em atividade

Os gravadores foram instalados em um total de 12 pontos de amostragem (**Tabela 4.1-1**). Cada gravador foi programado para obter gravações de um minuto de duração a cada 10 minutos, durante todo o período diurno e noturno.

Cada um dos 12 pontos, onde foi empregado este método, foi monitorado por um período de 10 dias consecutivos, totalizando um esforço amostral por ponto de 1.440 minutos por

campanha. Portanto, o esforço total acumulado nas dez primeiras campanhas foi de 172.800 minutos (Tabela 4.1-3).

TABELA 4.1-3: Esforço amostral, empregado por meio do método de Monitoramento Acústico Passivo

PONTO DE AMOSTRAGEM	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM, ZONA 23K)		ESFORÇO AMOSTRAL PONTO/CAMPANHA PONTO DE ESCUTA (MINUTOS)
PD01	303.851	7.481.273	1.440
PD02	304.079	7.481.097	1.440
PD03	304.204	7.481.012	1.440
PD04	303.688	7.481.003	1.440
PD05	303.891	7.480.826	1.440
PD06	304.041	7.480.724	1.440
PD16	305.431	7.477.547	1.440
PD17	305.307	7.477.457	1.440
PD18	305.065	7.477.271	1.440
PD19	305.595	7.476.888	1.440
PD20	305.473	7.476.789	1.440
PD21	305.177	7.476.704	1.440
TOTAL/CAMPANHA			17.280
TOTAL ACUMULADO (10 CAMPANHAS)			172.800

Mastofauna de Médio/Grande Porte

A amostragem da fauna de mamíferos de médio e grande porte foi realizada por meio de três métodos complementares, conforme descritos a seguir:

Monitoramento Acústico Passivo

Já descrito no item que trata dos métodos empregados para a avifauna.

Armadilhas Fotográficas

Este método consiste no registro e identificação das espécies por meio de registros fotográficos obtidos por câmeras automáticas ativadas por calor e movimento (TOMAS & MIRANDA, 2003). É um método efetivo principalmente no estudo de espécies elusivas e de difícil detecção (KARANTH *et. al.*, 2004) e tem sido utilizado com sucesso em estudos de densidade populacional (TROLLE *et. al.*, 2008; TOBLER, *et. al.*, 2008; MAFFEI *et. al.*, 2005) e no registro de espécies raras (BEISIEGEL, 2009).

Ressalta-se que não foram utilizadas iscas pois estas alteram o padrão natural de uso das áreas pelos mamíferos, mascarando os efeitos decorrentes dos impactos associados às atividades do empreendimento.

Foi instalado um total de 15 armadilhas modelo Bushnell (**Foto 4.1-2**) em modo de câmera (para a obtenção de fotos). As armadilhas fotográficas permaneceram operantes por 10 dias consecutivos. Desta forma foi obtido um esforço amostral de cerca de 240 horas por ponto de amostragem, por campanha. Portanto, nas dez primeiras campanhas de amostragem foi acumulado um esforço amostral de 36.000 câmeras.horas (**Tabela 4.1-4**).



FOTO 4.1-2: Armadilha fotográfica modelo Bushnell HD

TABELA 4.1-4: Esforço amostral da metodologia de armadilha fotográfica

PONTO DE AMOSTRAGEM	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM, ZONA 23K)		ESFORÇO AMOSTRAL PONTO/CAMPANHA (CAMERAS-HORAS)
PD01	303.851	7.481.273	240
PD02	304.079	7.481.097	240
PD03	304.204	7.481.012	240
PD04	303.688	7.481.003	240
PD05	303.891	7.480.826	240
PD06	304.041	7.480.724	240
PD10	306.076	7.479.934	240
PD11	305.820	7.479.751	240
PD12	305.692	7.479.669	240
PD16	305.431	7.477.547	240
PD17	305.307	7.477.457	240
PD18	305.065	7.477.271	240
PD19	305.595	7.476.888	240
PD20	305.473	7.476.789	240
PD21	305.177	7.476.704	240
TOTAL/CAMPANHA			3.600
TOTAL ACUMULADO (10 CAMPANHAS)			36.000

Parcelas de areia

Consiste em dispor parcelas de areia fina para a obtenção de impressão de pegadas de mamíferos, com o intuito de posterior identificação (DIRZO & MIRANDA, 1990; PARDINI *et. al.*, 2003).

As parcelas de areia foram instaladas (**Foto 4.1-3**) em um total de seis pontos localizados em áreas que serão objeto do Projeto de Restauração Florestal. Esse método foi empregado nessas áreas em razão da impossibilidade de se utilizar as armadilhas fotográficas por razões de segurança.

As dimensões das parcelas foram padronizadas 1 x 1m, permanecendo em atividade por 10 dias consecutivos. Assim como para as armadilhas fotográficas, as parcelas de areia não foram iscadas pois alteram os padrões naturais de deslocamento das espécies de mamíferos nas áreas monitoradas.

As parcelas foram checadas periodicamente e, em caso da ocorrência de impressão de pegadas, foram fotografadas, identificadas e em seguida apagadas. As armadilhas que se encontraram visivelmente danificadas por chuva ou vento não foram consideradas.

O esforço amostral empregado por ponto de amostragem foi de 240 horas, por campanha. Portanto, nas dez primeiras campanhas de monitoramento foi acumulado um esforço 14.400 parcelas.hora (**Tabela 4.1-5**).



Foto 4.1-3: Instalação de parcela de areia

TABELA 4.1-5: Esforço amostral empregado por meio do método de parcelas de areia em cada ponto de amostragem e no total

PONTO DE AMOSTRAGEM	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM, ZONA 23K)		ESFORÇO AMOSTRAL PONTO/ CAMPANHA - (HORAS)
PD07	305.485	7.480.640	240
PD08	305.397	7.480.367	240
PD09	305.290	7.480.111	240
PD13	305.042	7.479.534	240
PD14	304.896	7.479.361	240
PD15	304.756	7.479.182	240
TOTAL/CAMPANHA			1.440
TOTAL ACUMULADO (9 CAMPANHAS)			14.400

Herpetofauna

Para o monitoramento da fauna de répteis e anfíbios foram empregados dois métodos de amostragem: o Monitoramento Acústico Passivo e a Procura Ativa, conforme apresentado a seguir.

Monitoramento Acústico Passivo

Já descrito no item que trata dos métodos empregados para a avifauna.

Procura Ativa

A Procura Ativa, um método amplamente utilizado para o levantamento da herpetofauna (CRUMP & SCOTT, 1994), consiste em caminhar, devagar e cuidadosamente, ao longo de uma trilha ou trajeto, tanto durante o dia quanto durante a noite, com o objetivo de observar e registrar espécimes ou ainda buscar vestígios, como trocas de pele e rastros deixados pelo caminho, bem como por outras evidências indiretas como vocalizações e mesmo restos de animais mortos, muitas vezes atropelados nas estradas.

Deste modo, nas proximidades de pontos amostrais previamente determinados, foi examinada a vegetação, o folhicho, troncos em decomposição, cavidades e buracos (em troncos, árvores e no chão) e em outros locais que pudessem servir de abrigo para os animais.

Aqueles localizados foram identificados e, quando possível, fotografados. Além dos animais registrados por meio de contato visual, também foram considerados aqueles registrados por meio de vocalização. Todos os dados foram anotados em campo, com data, local e nome da espécie.

A herpetofauna foi amostrada de forma sistemática, por meio de procura ativa, em todos os pontos (21 pontos - ver **Tabela 4.1-2**). Além destes, apenas de maneira qualitativa, também foram anotados espécimes registrados ocasionalmente ao longo de estradas de acesso das proximidades da região estudada.

Foram realizadas, em média, de cerca de 4 horas por dia de procura ativa durante o dia e aproximadamente 5 horas durante a noite.

A duração das amostragens variou um pouco conforme o dia, devido a fatores extrínsecos ao trabalho (ex. a ocorrência de chuvas fortes), mas resultou em um esforço amostral total por campanha de aproximadamente de 50 horas de procura ativa, exclusivamente nos pontos de amostragem, sem considerar os deslocamentos entre áreas (cerca de 40 horas).

A seguir são apresentados alguns registros fotográficos das áreas estudadas e dos procedimentos de amostragem da fauna de vertebrados terrestres, obtidos durante a décima campanha, na área sob influência da Barragem Pedreira.



Foto 4,1-4. Vista parcial da mata do P1, monitoramento de fauna da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-5. Armadilha fotográfica instalada no ponto 1, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-6. Gravador instalado na área do ponto 1, monitoramento de fauna da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-7. Vista parcial do riacho da área do ponto 1, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-8. Vista parcial da vegetação da área do entorno do ponto 2, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 06/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-9. Armadilha fotográfica instalada no ponto 2, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 06/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-10. Gravador instalado no ponto 2, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-11. Vista parcial da mata na área do ponto 3, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-12. Armadilha fotográfica no ponto 3, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 06/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-13. Gravador instalado no ponto 3, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-14. Vista parcial da vegetação na área do ponto 4, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-15. Armadilha fotográfica instalada na área do ponto 4, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-16. Gravador instalado na vegetação do ponto 4, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-17. Vista parcial do riacho na área do ponto 4, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-18. Vista parcial do riacho na área do ponto 4, monitoramento da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-19. Vista parcial da vegetação no ponto 5, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-20. Armadilha fotográfica na área do ponto 5, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 06/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-21. Gravador instalado na vegetação do ponto 5, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-22. Vista parcial da vegetação na área do ponto 6, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-23. Armadilha fotográfica instalada na área do ponto 6, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 06/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-24. Gravador instalado na vegetação da área do ponto 6, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 28/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-25. Vista do reflorestamento do ponto 7 (centro da imagem), Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 20/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-26. Armadilha fotográfica instalada no ponto 7, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 26/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-27. Vista parcial do reflorestamento da área do ponto 8, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 26/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-28. Armadilha fotográfica instalada no ponto 8, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 26/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-29. Vista parcial da área de reflorestamento do ponto 9, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 26/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-30. Armadilha fotográfica instalada no ponto 9, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 26/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-31. Vista parcial da vegetação no entorno do ponto 10, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-32. Armadilha fotográfica instalada no ponto 10, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-33. Vista parcial da área do ponto 11, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-34. Armadilha fotográfica instalada no ponto 11, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-35. Vista parcial da mata na área do ponto 12, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-36. Armadilha fotográfica instalado no ponto 12, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-37. Vista parcial de brejo onde algumas espécies de anfíbios são registradas na área do ponto 12, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-38. Poça temporária presente próximo da área do ponto 12, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



F Foto 4,1-39. Poça presente próximo da área do ponto 12, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 25/09/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-40. Vista parcial do reflorestamento na área do ponto 13, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-41. Armadilha fotográfica instalada no ponto 13, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-42. Vista parcial do reflorestamento da área do ponto 14, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-43. Armadilha fotográfica instalada no ponto 14, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-44. Poça temporária presente na área do ponto 14, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-45. Poça temporária presente na área do ponto 14, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-46. Vista parcial do reflorestamento da área do ponto 15, monitoramento da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-47. Armadilha fotográfica instalada no ponto 15, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 07/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-48. Vista parcial da vegetação no ponto 16, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-49. Armadilha fotográfica instalada na vegetação do ponto 16, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-50. Gravador instalado na mata do entorno do ponto 16, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-51. Vista parcial da vegetação do ponto 17, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-52. Armadilha fotográfica instalada no ponto 17, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-53. Gravador instalado na mata, ponto 17, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-54. Vista parcial da vegetação nas proximidades do ponto 18, monitoramento de fauna da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-55. Armadilha fotográfica instalada no ponto 18, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-56. Gravador instalado na mata, ponto 18, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-57. Vista parcial da vegetação no ponto 19, monitoramento de fauna da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-58. Armadilha fotográfica instalada no ponto 19, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-59. Gravador instalado na mata, ponto 19, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-60. Vista parcial da vegetação do ponto 20, monitoramento de fauna da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-61. Armadilha fotográfica instalada no ponto 20, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-62. Gravador instalado na mata, ponto 20, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-63. Vista parcial da vegetação no ponto 21, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-64. Armadilha fotográfica instalada no ponto 21, Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.



Foto 4,1-65. Gravador instalado na mata, ponto 21, monitoramento de fauna da Barragem Pedreira, 10ª. campanha, 10/10/22. Autor: J. Cassimiro.

4.2 DESENHO ANALÍTICO

Neste item são apresentados os métodos utilizados para a análise das informações obtidas durante as dez primeiras campanhas de monitoramento de fauna, relativas (1) às paisagens sonoras (biofonia - aves, mamíferos, anfíbios e insetos); (2) à avifauna; (3) à mastofauna de médio e grande porte; e (4) à herpetofauna.

A. Paisagens Sonoras

As análises das paisagens sonoras foram realizadas com o objetivo de registrar as características da comunidade animal nas áreas sob influência da Barragem de Pedreira, durante as dez primeiras campanhas de amostragem.

Essas análises incluíram duas etapas. Uma primeira que reuniu os procedimentos necessários para a criação da representação das paisagens sonoras (*soundscapes*) e a segunda, dedicada à análise, propriamente dita, para a avaliação e comparação dos *soundscapes* obtidos.

Criação dos soundscapes

Os *soundscapes* são representações visuais de gravações agregadas, que refletem todos os sons emitidos na área (biológicos, abióticos e antrópicos). Por conterem as manifestações sonoras de todos os táxons presentes em uma comunidade, podem ser explorados como um *proxy* de diversidade biológica.

Para criar os *soundscapes* foi utilizado o software ARBIMON II (AIDE *et. al.*, 2013). Como primeira etapa foi dado um nome para o *soundscape* (**Figura 4.2-1a**); depois foi definida uma *playlist* (**Figura 4.2-1b**), a qual reuniu o conjunto de gravações de interesse (ex. todas as gravações do ponto PED01). Em seguida foi selecionada a escala de agregação temporal (ex. hora, mês, ano) (**Figura 4.2-1c**), o tamanho do intervalo de frequência (**Figura 4.2-1d**), a amplitude do pico de energia a ser incluído nas análises (**Figura 4.2-1e**), e a mínima distância entre frequências (Hz) entre picos a serem incluídas no *soundscape* (**Figura 4.2-1f**).

Para as análises realizadas nesse estudo, os parâmetros utilizados foram: (1) agregação de tempo por horas do dia; (2) 86 Hz de largura de banda de frequência; e (3) 0,01 de amplitude limite. Uma vez selecionados esses parâmetros os *soundscapes* foram gerados (**Figura 4.2-1**). A cor de cada pixel representado na **Figura 4.2-1** representa o percentual de gravações que tiveram um pico de atividade a uma dada frequência e tempo. Esse *soundscape* mostrou que a maioria da atividade ocorre entre 05:00 e 09:00 hs; e entre 16:00 e 24:00 e a um intervalo de frequência compreendido entre 2 e 5 kHz.




FIGURA 4.2-1: Ferramenta para criar os *soundscape*s. O usuário a) cria um nome, b) seleciona um conjunto de gravações (*playlist*), c) seleciona a escala de tempo de agregação, d) define o intervalo de frequência, e) amplitude, e f) distância entre picos. À direita é apresentado um exemplo de um *soundscape*

Análises do Soundscape

Existem várias maneiras de explorar e comparar os *soundscape*s. Neste estudo optamos por utilizar duas abordagens: (1) análise do percentual de uso do espaço acústico; e (2) análise da similaridade entre os *soundscape*s.

O percentual de uso do espaço acústico está correlacionado à **riqueza** de espécies presentes na área. Portanto, quantificar o uso dos espaços acústicos nos diferentes pontos de monitoramento e nas diferentes campanhas de amostragem permitem avaliar como a riqueza de espécies varia espacial e temporalmente. Os *soundscape*s criados para este estudo são representados por matrizes com 6.144 células, resultantes do cruzamento dos intervalos de tempo (24 - horas do dia) com os intervalos de frequência (256 - intervalos de 86 Hz).

A partir dos valores obtidos em cada ponto de monitoramento foi avaliada a existência de diferenças significativas entre: (1) as diferentes distâncias da ADA, (2) entre os diferentes fragmentos monitorados e (3) entre as diferentes campanhas de amostragem. Para tanto foi empregada uma análise não paramétrica (Kruskal-Wallis), utilizando o pacote *coin* (HOTHORN *et. al.*, 2008). A normalidade e homogeneidade dos dados foram avaliadas pelos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett no pacote *nortest* (GROSS & LIGGES, 2015). O teste de Dunn foi feito a posteriori para testar as diferenças entre os níveis, quando houve diferença

significativa. Os gráficos foram construídos no pacote ggplot2 (WICKHAM, 2016). Todas as análises e gráficos foram realizadas na plataforma R (*R Development Core Team*, 2008).

A análise de similaridade entre as paisagens acústicas (*sounscapes*) registradas nos pontos de amostragem, por outro lado, permite avaliar as diferenças na **composição** de espécies das comunidades. Duas áreas podem exibir o mesmo percentual de uso do espaço acústico (ou seja, apresentar riquezas semelhantes), porém esse percentual pode estar distribuído de maneira distinta no espaço acústico, evidenciando comunidades com composição de espécies distintas, embora semelhantes em termos de riqueza.

Para determinar o grau de similaridade no uso dos intervalos de tempo/frequência entre pontos/períodos de amostragem foi utilizada a análise de variância permutacional (PERMANOVA) para testar as diferenças médias na composição do *soundscape* entre (1) os remanescentes monitorados, (2) as diferentes distâncias analisadas, e (3) as campanhas de monitoramento. A PERMANOVA possui robustez similar a ANOVA, entretanto, não requer os pressupostos de normalidade e homocedasticidade (ANDERSON, 2001; MCARDLE E ANDERSON, 2001). A PERMANOVA foi implementada através da função Adonis. As análises foram realizadas no programa R (*R Development Core Team*, 2015), utilizando os pacotes Vegan (OKSANEN *et. al.*, 2016).

B. Avifauna

Para a caracterização da comunidade de aves dos diferentes pontos/campanhas de monitoramento foi realizada uma amostragem das gravações obtidas em campo. Foram selecionadas, de forma aleatorizada, 50 gravações de cada ponto, em cada campanha. Essa amostragem foi realizada dentro do intervalo de tempo onde, por meio das análises de *soundscape*, foi verificada maior atividade das aves, ou seja, entre 06:00 e 09:00 hs.

Assim, para a caracterização da comunidade de aves foram analisadas cerca de 600 gravações/campanha, ou seja, nas primeiras dez campanhas foram analisadas 6.000 gravações de um minuto cada uma. Cada gravação de um minuto foi escutada, e seu sonograma analisado, de modo que todas as espécies de aves presentes fossem identificadas. Assim, para cada gravação analisada foi gerada uma lista de espécies. A partir dessas listas de espécies foram realizadas as análises descritas a seguir.

Suficiência Amostral

A suficiência amostral da comunidade de aves foi analisada a partir de curvas de rarefação e extrapolação (CHAO & JOST, 2012). Por esta técnica as comparações são baseadas em características da comunidade ao invés de esforços amostrais distintos (CHAO & JOST, 2012). A extrapolação das curvas foi ajustada para o dobro do número de indivíduos de cada ponto, e o número de cortes (*knots*) foi de 40, como sugerido por Chao *et al.* (2016). O intervalo de confiança de 95% das curvas de rarefação e extrapolação foi estimado a partir do método Bootstrap com 999 interações. O nível de significância alpha de 0.05 é garantido quando os intervalos de confiança não se sobrepõem (CHAO & JOST, 2012). As curvas de rarefação e extrapolação foram construídas através do pacote iNEXT (CHAO *et al.*, 2016). Todas as análises e gráficos foram realizados na plataforma R (R Development Core Team, 2008).

Frequência Relativa

Para o cálculo da frequência relativa de cada uma das espécies de aves registradas durante as dez primeiras campanhas de monitoramento foi realizada a divisão do número de registros de cada espécie pelo número total de registros (todos os registros de todas as espécies) obtidos por meio da análise das 6.000 gravações amostradas (total das dez campanhas).

Dissimilaridade

A estrutura e composição da comunidade de aves foi avaliada através da ordenação não métrica (NMDS) dos pontos amostrados a partir da abundância das espécies. Para diminuir o efeito das espécies mais abundantes foi realizado uma transformação pela raiz quadrada e uma padronização pelo total das linhas. A medida de dissimilaridade utilizada foi a distância de Bray-Curtis. A ordenação foi realizada usando a função metaMDS no pacote vegan (OKSANEN *et al.*, 2016). Para testar a consistência dos grupos revelados no NMDS foi utilizado o procedimento de permutação multi-resposta (MRPP), um procedimento não paramétrico recomendado quando se tem mais que dois grupos a serem testados (MCCUNE & GRACE, 2002; p.188).

Para avaliar o efeito (1) dos diferentes fragmentos, (2) das diferentes distâncias e (3) das diferentes campanhas de amostragem, foi utilizado a riqueza observada e estimada pela extrapolação. A normalidade e homogeneidade dos dados foram avaliadas pelos testes de

Shapiro-Wilk e Bartlett no pacote *nortest* (GROSS & LIGGES, 2015). Como não foram atendidos os pressupostos para uma análise paramétrica, utilizamos análises correspondentes não paramétricas (Kruskal-Wallis) disponíveis no pacote *coin* (HOTHORN *et. al.*, 2008). O teste de Dunn foi feito *a posteriori* para testar as diferenças entre os níveis, quando houve diferença significativa. Os gráficos foram construídos no pacote *ggplot2* (WICKHAM, 2016). Todas as análises e gráficos foram realizadas na plataforma R (R Development Core Team, 2008).

C. Mastofauna e Herpetofauna

A análise dos dados obtidos para masto e herpetofauna foram realizadas seguindo o mesmo protocolo. Desta forma, são descritas conjuntamente.

Suficiência Amostral

A suficiência da amostragem foi estimada para a herpetofauna e mastofauna, utilizando-se o programa EstimateS v.9.1.0 (COLWELL, 2013) através de curvas de rarefação de espécies, baseada em 1.000 randomizações da matriz original com as espécies registradas nos 21 pontos amostrais com os ca. de 100 dias¹ de esforço (dez campanhas) nas colunas.

Frequência Relativa

Para o cálculo da frequência relativa das espécies da mastofauna de médio/grande porte e da herpetofauna foi realizada a divisão o número de registros, de cada espécie, pelo número de registros totais obtidos durante cada campanha e durante as dez primeiras campanhas de monitoramento de fauna.

Similaridade

Para avaliar a similaridade entre as áreas amostradas, quanto à mastofauna de médio/grande porte e à herpetofauna, foi realizada uma análise de agrupamento hierárquico. A análise foi realizada pela aplicação do índice de similaridade de Bray-Curtis (BRAY e CURTIS, 1957) e o método de agrupamento utilizado foi o método hierárquico de agrupamento “UPGMA”

¹ Aqui também foram considerados tanto o dia de instalação quanto o de desinstalação das armadilhas, já que também foram feitos alguns registros ocasionais (EO).



(“*Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages*”). A análise foi conduzida utilizando-se o programa Past, na sua versão 3.14 (HAMMER *et. al.*, 2001).

5. RESULTADOS

Neste item são apresentados os resultados obtidos nas dez primeiras campanhas de amostragem do Subprograma de Monitoramento de Fauna da Barragem Pedreira. Estes resultados são apresentados em quatro blocos: (1) paisagens sonoras, que retratam a variação espacial de toda a comunidade faunística de forma integrada (aves, mamíferos, anfíbios e insetos); (2) avifauna; (3) mastofauna de médio e grande porte; e (4) herpetofauna.

5.1 PAISAGENS SONORAS (COMUNIDADE)

Em anos recentes, o termo “paisagem” tem sido re-conceituado como um sistema dinâmico composto por matéria, energia estruturada, informação e significado (COSGROVE 2003, FARINA, 2010), expandindo o conceito clássico apoiado em uma perspectiva geográfica-ecológica (ex. FORMAN AND GODRON 1986; TURNER, 2005).

A paisagem sonora (PIJANOWSKI *et. al.*, 2011) é um exemplo de energia estruturada e representa um elemento fundamental da paisagem (FARINA *et. al.*, 2011). É o resultado da combinação de três elementos/componentes sonoros: a geofonia (vento, água em movimento, chuva), antropofonia (ruídos produzidos pelo homem) e biofonia (sons produzidos por seres vivos) (KRAUSE, 1987).

Smith & Pijanowski (2014) adotam a seguinte definição para paisagem sonora: “paisagem sonora é a percepção de todos os sons – aqueles produzidos pelas atividades humanas, criados por entidades biológicas e gerados por processos geofísicos – que emanam de uma dada paisagem”.

Essa disciplina científica tem sua origem no início dos anos 1970, baseada na hipótese de que “todo local na Terra tem um *bio-spectrum* acústico único, que oferece informações sobre a dinâmica do ecossistema daquele lugar” (KRAUSE, 1987). A ecologia de paisagens sonoras é uma área da ciência que surge de duas áreas relativamente antigas do conhecimento: bioacústica e ecologia de paisagem. Entretanto, apenas na última década, ganhou corpo teórico e metodológico, se consolidado como uma importante e promissora área da ciência.

A partir da coleta de registros acústicos de locais específicos, ao longo do tempo, podemos entender melhor como aspectos ambientais associados a atividades humanas podem promover mudanças na paisagem sonora e, portanto, na comunidade animal.

A teoria e métodos em ecologia de paisagem acústica têm expandido consideravelmente nos últimos anos, com melhoria dos equipamentos de gravação, softwares e modelos estatísticos (PIJANOWSKI *et. al.*, 2011b). Com isso, tornou-se possível, não apenas o avanço do conhecimento científico mas, também, um ganho extremamente grande na qualidade de estudos voltados ao conhecimento e monitoramento da biodiversidade.

A seguir são apresentados os resultados obtidos durante as cinco primeiras campanhas do Subprograma de Monitoramento de Fauna da Barragem Pedreira. Os resultados são organizados em função dos resultados das análises: (1) da variação temporal da atividade acústica, ou seja, de como essa atividade sonora varia ao longo do tempo (horários do dia); (2) do uso do espaço acústico, ou seja, qual o percentual do espaço acústico utilizado nos diferentes pontos de amostragem, informação que está diretamente relacionada com a riqueza de espécies da comunidade amostrada; e (3) da dissimilaridade no uso do espaço acústico, que representa o quão diferentes são as comunidades em relação ao padrão de uso do espaço acústico, ou seja, o quanto as comunidades diferem em termos de composição de espécies.

A. Atividade Acústica

É bastante conhecido que a atividade acústica dos animais varia ao longo do dia em razão das características ambientais e das características eco-fisiológicas das espécies. Há uma tendência geral de redução da atividade dos animais (principalmente entre os vertebrados) durante o período mais quente do dia, em razão do maior custo energético. Por outro lado, as atividades mais intensas, entre esses grupos de animais, são observadas nos períodos compreendidos entre o final da noite e início da manhã; e final do dia até o início da noite.

O início da manhã e final da tarde são períodos onde é registrada atividade mais intensa das espécies de hábito diurno (ex. grande parte das espécies de aves e primatas), enquanto o início da noite é o período de maior atividade daquelas espécies que apresentam hábito crepuscular e noturno (ex. aves noturnas e anfíbios).

É importante ressaltar que durante certos períodos do ano, a atividade acústica dos insetos aumenta significativamente, podendo gerar picos de atividade justamente nas horas do dia onde os vertebrados apresentam baixa atividade, ou seja, no período mais quente (ex. cigarras), em razão da dependência de seu metabolismo, da temperatura externa.

Na **Figura 5.1-1** é observado um gráfico que representa a variação da atividade acústica ao longo do dia, considerando todas as gravações obtidas durante as dez primeiras campanhas de amostragem, em todos os pontos de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira. A variação da atividade observada em cada campanha é representada por uma linha do gráfico.




FIGURA 5.1-1: Representação da variação no uso do espaço acústico ao longo do dia, considerando as gravações obtidas nas diferentes campanhas de monitoramento, por todos os gravadores, ao longo dos 10 dias de amostragem contínua (por campanha). As faixas representam os períodos do dia com maior utilização do espaço acústico pelos diferentes grupos animais (aves, insetos e insetos/aves/anfíbios).

A análise da **Figura 5.1-1** deixa evidente a grande variação no uso do espaço acústico, das áreas monitoradas, ao longo do dia, assim como, entre campanhas. Os resultados observados são consistentes com a variação esperada ao longo do ano. Entre as campanhas que apresentaram menores valores médios atividade acústica duas foram realizadas no início do período de seca (campanhas 02 e 06). Por outro lado, os maiores valores médios de atividade acústica foram observados nas campanhas 03, 05 e 08, realizadas no período chuvoso. Exceção é feita aos resultados observados para a nona campanha, quando foi detectada maior atividade, apesar de ter sido realizada em pleno período de seca. Entre os extremos, temos as campanhas 04, 07 e 10, realizadas no final da estação seca. O único resultado

surpreendente foi o obtido na campanha 01, realizada no meio do período chuvoso, porém com os menores valores médios de atividade acústica.

A atividade acústica no período compreendido entre 5:00 e 9:00 hs é dominada pelas aves (período conhecido como "*morning chorus*"). Na terceira, quarta, quinta e oitava campanhas, realizadas no período pré-reprodutivo (terceira e quarta) e reprodutivo (quinta e oitava) da maioria das espécies de aves, verifica-se uma maior incremento da atividade acústica desse grupo (o que é confirmado pelo maior número de registros obtidos para aves), no entanto, também é registrado um incremento significativo dos sons produzidos por insetos (ex. as cigarras) cuja participação é mais evidente a partir das 8:00 hs, se estendendo até, por volta das 18:00 hs. Esse efeito do aumento significativo da atividade dos insetos é verificado de maneira ainda mais clara na quinta e oitava campanha, realizadas no mês de dezembro. Conforme comentado, resultado surpreendente é observado para a nona campanha, realizada na seca. No período mais quente do dia a paisagem acústica é dominada pelos insetos.

Um novo incremento do uso do espaço acústico é identificado a partir do final da tarde (cerca de 17:00 - 18:00 hs), atingindo seu máximo por volta das 19:00 - 20:00 hs. Esse segundo pico é registrado em todas as dez campanhas, porém com incrementos significativamente maiores na terceira, quarta, quinta, sétima, oitava e nona campanha. A atividade acústica nesse período é produzida, principalmente, por insetos, aves e, secundariamente, por anfíbios. É importante notar que nas áreas monitoradas a participação da anurofauna tem se mostrado pouco importante.

B. Percentual de Uso do Espaço Acústico

Conforme mencionado, o percentual de uso do espaço acústico está relacionado à riqueza de espécies presentes na comunidade. Assim, quando comparado este percentual, entre diferentes pontos de amostragem distribuídos em uma dada região, estamos fazendo uma comparação indireta da riqueza de espécies da comunidade animal (aves, mamíferos, anfíbios e insetos) entre esses pontos.

Para descrever a variação no uso do espaço acústico na área sob influência das atividades de implantação da Barragem Pedreira, foi testada a existência de diferenças significativas entre os diferentes remanescentes (**Figura 5.1-2**); as diferentes distâncias da ADA (**Figura 5.1-3** - pequena 50 m, média 200 m e grande 500 m); e as diferentes campanhas realizadas até o momento.




FIGURA 5.1-2: Representação do uso do espaço acústico nos dois remanescentes monitorados (Remanescente 1 - vermelho - localizado próximo ao eixo da barragem - PED01, PED02, PED03, PED04, PED05 e PED06; Remanescente 2 - verde- localizado na porção montante do futuro reservatório - PED16, PED17, PED18, PED19, PED20 e PED21).

Conforme pode ser observado na **Figura 5.1-2**, embora os valores das medianas sejam distintos (cerca de 14% no Remanescente 01 e 17% no Remanescente 02) não foi observada diferença significativa no percentual de uso do espaço acústico entre os dois remanescentes monitorados ($p = 0,95$). Esse resultado sugere uma riqueza de espécies animais semelhante entre as duas áreas estudadas.

Mesmo a amplitude da variação de riqueza entre as amostras obtidas no Remanescente 01 e Remanescente 02 são semelhantes. Registra-se uma variação levemente maior no Remanescente 01, que pode estar ligada ao histórico de maiores perturbações (inclusive supressão de vegetação) ocorridas durante o período de monitoramento.

Na **Figura 5.1-3** são apresentados os valores de percentual de uso do espaço acústico para as diferentes distâncias da borda dos remanescentes.




FIGURA 5.1-3: Representação do uso do espaço acústico nos dois remanescentes (Remanescente 1 - tons de vermelho; e Remanescente 2 - tons de azul) e nas três distâncias monitoradas (pequena - 1, média - 2 e grande - 3 distância da borda).

Os resultados representados na **Figura 5.1-3** indicam que a riqueza de espécies não apenas não varia significativamente entre remanescentes como também não varia em relação à distância da borda dos remanescentes. Os resultados dos testes estatísticos (Kruskal-Wallis) mostram que não há diferença significativa entre distâncias ($p = 0,73$ para o remanescente próximo ao eixo da barragem; e $p = 0,59$ para o remanescente localizado na porção montante do futuro reservatório).

Portanto, com base nos dados obtidos durante as dez primeiras campanhas de monitoramento de fauna pode-se afirmar que a riqueza de espécies, indicada pelo percentual de uso do espaço acústico, é relativamente homogênea na área de estudo, não variando entre as diferentes distâncias monitoradas, mesmo no remanescente que sofreu intervenções. Isso indica que o remanescente afetado pela supressão de vegetação já apresentava uma comunidade típica de ambientes de borda, não respondendo de maneira significativa às intervenções ocorridas.




FIGURA 5.1-4: Representação do uso do espaço acústico nas dez primeiras campanhas de monitoramento, por remanescente amostrado (Remanescente 1 e Remanescente 2)

Analisando a **Figura 5.1-4** é possível verificar uma clara tendência de aumento da atividade acústica entre a primeira e a quinta campanha, tanto no remanescente situado próximo do eixo da futura Barragem Pedreira (Remanescente 01), que sofreu supressão parcial de sua área, como no remanescente localizado a montante do reservatório, que não sofreu intervenções (Remanescente 02). Apenas na sexta campanha verifica-se uma queda na atividade acústica, quando comparado à quinta campanha, o que se deve, provavelmente, ao início do período de seca. Na sétima campanha, realizada no final do período de seca verifica-se um leve incremento na atividade acústica no Remanescente 01 e valores similares no Remanescente 02, em relação à sexta campanha. Na oitava campanha, realizada no período de chuva, verifica-se um importante incremento da atividade, semelhante àquela observada na sexta campanha, voltando a cair na nona campanha, realizada no período de seca. Por fim, na décima é registrado um incremento da atividade, chegando aos níveis observados na oitava campanha.

No Remanescente 01 o incremento é gradual não sendo observada variação significativa entre campanhas vizinhas (**Figura 5.1-4**), até a quarta campanha. Entre a quarta e a quinta, há um incremento significativo da atividade ($p < 0,05$). Entre a quinta e a sexta, por sua vez, há uma redução significativa ($p < 0,05$). Embora seja observado um incremento da atividade acústica entre a sexta e sétima, entre a sétima e a oitava e entre a oitava e nona campanha, a variação não é significativa, assim como entre a nona e a décima.

No Remanescente 02 verifica-se o padrão similar de incremento entre a primeira e a quinta campanha (**Figura 5.1-4**). No entanto, observa-se um aumento significativo ($p < 0,05$) entre a segunda e a terceira campanha. Da mesma forma que o observado no Remanescente 01, registra-se uma queda significativa ($p < 0,05$) da atividade acústica entre a quinta e a sexta campanha, resultado, provavelmente, da transição do período chuvoso para o seco. Entre a sexta e a sétima campanha os valores de atividade acústica se mantêm próximos. Entre a sétima e oitava registra-se um incremento significativo ($p < 0,05$). Por fim, entre a oitava e nona campanha, e entre esta e a décima, não é observada variação significativa.

Se por um lado, as diferenças observadas entre campanhas (principalmente no Remanescente 02) podem ser explicadas pelas épocas do ano em que as mesmas foram realizadas, as diferenças entre os remanescentes podem estar refletindo os diferentes históricos de perturbação recente, ou seja, enquanto o Remanescente 01 teve sua área reduzida pelas supressão de vegetação, o Remanescente 02 não sofreu qualquer intervenção no período.

C. Dissimilaridade no Uso de Espaço Acústico

A análise da dissimilaridade entre *soundscape*s obtidos durante o monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira permite fazer inferências sobre as diferenças na composição de espécies, complementando as análises de percentual de uso do espaço acústico que indicam as variações na riqueza de espécies.

Na **Figura 5.1-6** é apresentado o resultado de uma análise de NMDS que considerou os *soundscape*s obtidos em todos os pontos de amostragem, de acordo com os remanescentes monitorados.




FIGURA 5.1-6: Ordenação multivariada (NMS) da variação na composição das paisagens acústicas de acordo com o remanescente monitorado com base nos resultados obtidos nas dez campanhas de monitoramento. Em preto são apresentados os pontos localizados no remanescente próximo ao eixo da barragem (Remanescente 01 - PED01, PED02, PED03, PED04, PED05 e PED06). Em azul os pontos localizados no remanescente localizado na porção montante do futuro reservatório (Remanescente 2 - PED16, PED17, PED18, PED19, PED20 e PED21).

Os resultados apresentados na **Figura 5.1-6** são reveladores dos padrões espaciais e temporais de variação na composição das paisagens sonoras analisadas, que representam, principalmente, os insetos, as aves, os anfíbios e parte da comunidade de mamíferos (ex. primatas), além da geofonia e antropofonia.

Ao contrário do observado nas análises de percentual de uso do espaço acústico (*proxy* de riqueza) foram verificadas diferenças significativas ($p < 0,05$) entre os dois remanescentes monitorados quanto à composição das paisagens sonoras.




FIGURA 5.1-7: Ordenação multivariada (NMDS) da variação na composição das paisagens acústicas de acordo com as campanhas de monitoramento. Em azul claro são apresentados os pontos amostrados na primeira; em verde escuro na segunda, em cinza na terceira, em vermelho na quarta; em verde claro na quinta; em violeta na sexta; em azul escuro na sétima; em bege na oitava; em azul esverdeado na nona; e em azul claro na décima.

Na **Figura 5.1-7** são apresentados os resultados nas análises de NMDS para as dez campanhas de amostragem. Os resultados evidenciam diferenças significativas na composição do espaço acústico entre campanhas ($p < 0,01$).

Nas **Figuras 5.1-8 e 5.1-9** são apresentados exemplos de representações gráficas das paisagens sonoras (*soundscape*). Nessas figuras é possível observar como a atividade sonora varia ao longo do tempo e quais intervalos de frequência são mais utilizados ao longo do dia.




FIGURA 5.1-8: Exemplo de representação gráfica das paisagens sonoras (*soundscapes*) obtidas nos pontos de amostragem (PED01, PED02, PED03, PED04, PED05 e PED06). Dados obtidos na primeira campanha de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira




FIGURA 5.1-9: Exemplo de representação gráfica das paisagens sonoras (*soundscape*s) dos pontos de amostragem (PED16, PED17, PED18, PED19, PED20 e PED21). Dados obtidos na primeira campanha de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira

5.2 AVIFAUNA

A. Riqueza e Composição

Para a caracterização da comunidade de aves das áreas sob influência da Barragem Pedreira foi analisado um total de 6.000 gravações (50 gravações por ponto de monitoramento, por campanha). Essas gravações foram selecionadas, de modo aleatório, entre todas as gravações obtidas durante as dez campanhas de monitoramento da avifauna realizadas até o momento. A partir da análise dessas gravações foram realizados 12.027 registros, dos quais 872 na primeira, 1.536 na segunda, 1.338 na terceira, 1.322 na quarta, 1.069 na quinta, 378 na sexta, 1.053 na sétima, 2210 na oitava, 491 na nona e 1.756 na décima campanha. Por meio da análise das gravações dos 12 pontos de amostragem (PED01, PED02, PED03, PED04, PED05, PED06, PED16, PED17, PED18, PED19, PED20 e PED21), nas dez campanhas, foi registrado um total de 114 espécies de aves.

A este total de espécies registrado, de maneira padronizada, por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP), foram acrescentadas 36 espécies registradas de maneira não padronizada, totalizando 150 espécies de aves para as áreas sob influência da Barragem Pedreira.

Na **Tabela 5.2-1** é apresentada a lista total de espécies de aves já registrada para as áreas de estudo e aquelas registradas durante as dez primeiras campanhas do Subprograma de Monitoramento de Fauna.

TABELA 5.2-1: Lista total de espécies de aves já registradas nas áreas sob influência da Barragem Pedreira e aquelas registradas por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP) durante as dez primeiras campanhas de monitoramento

Família	Nome do Táxon	Nome em Português	PONTOS de Registro (PED)											Sens	End	Status de Conservação		
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	19	20			21	SP	BR
Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inambu-chororó	0	1	1	2	5	1	0	0	2	0	0	0	B	N	N	N
Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	B	N	N	N
Anatidae	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Cracidae	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasiliense</i> (Gmelin, 1789)	biguá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	socó-dorminhoco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró	1	2	0	1	2	0	2	0	0	0	2	0	M	N	N	N
Threskiornithidae	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	0	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-gato	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Accipitridae	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Accipitridae	<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	0	2	0	1	3	11	16	21	7	0	1	3	B	N	N	N
Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Accipitridae	<i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	A	N	N	N
Rallidae	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M	N	N	N
Rallidae	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Rallidae	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	2	3	35	8	14	5	5	1	6	3	8	1	B	N	N	N
Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	B	N	N	N
Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	asa-branca	31	51	27	48	38	58	72	44	23	13	46	76	B	N	N	N
Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Columbidae	<i>Zenaidura macroura</i> (Des Murs, 1847)	avoante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	9	130	7	146	31	54	84	180	75	15	52	88	B	N	N	N
Columbidae	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-de-testa-branca	1	0	0	0	0	2	4	0	8	0	0	4	M	N	N	N
Columbidae	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	M	N	N	N
Columbidae	<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juruti-vermelha	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	A	N	EP	N
Cuculidae	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	2	5	0	1	1	1	4	10	2	2	6	4	B	N	N	N
Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Cuculidae	<i>Guiraca caerulea</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Cuculidae	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	0	17	4	8	2	2	1	1	4	0	3	8	B	N	N	N
Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango	0	0	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	B	N	N	N
Apodidae	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Trochilidae	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	3	0	0	1	4	8	0	2	1	8	3	2	B	N	N	N
Trochilidae	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Trochilidae	<i>Anthracoceros nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Trochilidae	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N

TABELA 5.2-1: Lista total de espécies de aves já registradas nas áreas sob influência da Barragem Pedreira e aquelas registradas por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP) durante as dez primeiras campanhas de monitoramento

Família	Nome do Taxon	Nome em Português	PONTOS de Registro (PED)												Sens	End	Status de Conservação		
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21			SP	BR	
Trochilidae	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	0	3	1	0	2	0	2	1	0	2	2	0	B	N	N	N	
Bucconidae	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	M	MA	N	N	
Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	2	4	1	4	7	0	2	4	5	0	0	5	M	N	N	N	
Picidae	<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	picapauzinho-barrado	3	6	10	3	4	11	0	0	8	1	5	13	B	N	N	N	
Picidae	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	1	1	1	1	0	1	4	1	0	0	1	0	B	N	N	N	
Picidae	<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-pequeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N	
Picidae	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	0	0	0	0	0	3	3	4	2	0	4	2	M	MA	N	N	
Picidae	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N	
Picidae	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	0	6	3	3	14	1	15	3	2	2	7	0	B	N	N	N	
Picidae	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	2	1	0	5	4	2	1	0	1	0	0	4	M	N	N	N	
Picidae	<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	A	N	N	N	
Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	0	1	0	2	7	3	1	3	4	1	3	7	B	N	N	N	
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema	3	16	13	32	31	18	5	5	15	6	18	24	B	N	N	N	
Falconidae	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N	
Falconidae	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	2	1	4	1	1	2	1	0	3	0	4	0	B	N	N	N	
Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauiã	0	4	0	1	6	0	1	0	3	0	2	0	B	N	N	N	
Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	gavião-relógio	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	0	4	M	N	N	N	
Psittacidae	<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	AM	N	
Psittacidae	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M	N	N	N	
Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão	16	20	10	37	18	12	51	15	11	2	10	7	B	N	N	N	
Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	B	N	N	N	
Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	23	20	16	10	7	17	21	7	9	6	17	5	M	N	N	N	
Psittacidae	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	M	N	N	N	
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada	0	1	1	0	0	0	0	11	2	0	0	17	B	N	N	N	
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N	
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus caeruleus</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	5	5	3	11	7	5	59	71	56	2	6	45	B	N	N	N	
Thamnophilidae	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca do sul	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	A	MA	N	N	
Thamnophilidae	<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-barrado	1	0	0	0	0	0	13	31	38	6	4	6	A	MA	N	N	
Thamnophilidae	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	17	1	0	0	0	4	6	14	8	2	23	18	M	N	N	N	
Thamnophilidae	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	A	MA	N	N	
Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	1	1	1	4	0	1	15	7	13	8	9	18	M	N	N	N	
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N	
Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	7	0	2	0	0	1	0	4	3	3	0	0	M	N	N	N	
Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	B	N	N	N	
Furnariidae	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	3	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0	0	M	N	N	N	
Furnariidae	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barraqueiro-de-olho-branco	11	0	0	0	0	1	7	9	17	1	0	1	M	N	N	N	
Furnariidae	<i>Clibanornis rectirostris</i> (Wied, 1831)	cisqueiro-do-rio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M	CE	N	N	
Furnariidae	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N	
Furnariidae	<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	B	N	N	N	
Furnariidae	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi	0	24	0	0	0	3	0	0	6	0	0	0	M	N	N	N	

TABELA 5.2-1: Lista total de espécies de aves já registradas nas áreas sob influência da Barragem Pedreira e aquelas registradas por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP) durante as dez primeiras campanhas de monitoramento

Família	Nome do Taxon	Nome em Português	PONTOS de Registro (PED)												Sens	End	Status de Conservação	
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21			SP	BR
Furnariidae	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	B	N	N	N
Furnariidae	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	M	N	N	N
Furnariidae	<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	arredio-do-rio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Furnariidae	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Pipridae	<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	soldadinho	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M	N	QA	N
Tityridae	<i>Pachyrampus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Tytyridae	<i>Pachyrampus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	8	2	0	1	12	4	0	0	0	0	4	4	B	N	N	N
Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	0	0	0	0	0	0	1	1	25	0	3	6	M	N	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	8	2	0	3	1	11	5	9	1	1	9	0	M	N	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador	117	48	9	26	62	128	242	125	129	44	10	99	M	N	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	32	20	56	12	31	21	40	35	41	95	47	19	M	N	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	BR	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	B	N	N	N
Rhynchocyclidae	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	B	MA	N	N
Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	4	4	5	2	0	21	11	8	6	1	6	2	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	4	13	0	1	45	4	5	1	2	2	5	5	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	0	2	0	1	1	7	2	10	2	11	12	2	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	0	13	0	0	2	0	1	1	3	0	0	3	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	2	5	31	12	6	12	58	4	8	48	15	2	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	6	15	11	6	5	3	7	1	0	3	5	6	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	1	0	1	6	1	5	4	0	4	5	0	0	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	3	1	1	2	2	4	11	3	5	2	0	1	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	2	1	7	1	0	1	2	0	0	6	0	0	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	0	52	24	24	0	1	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Tyrannidae	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	47	7	12	2	47	52	12	35	37	8	1	11	M	N	N	N
Tyrannidae	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	B	N	N	N
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	66	130	88	135	70	95	130	117	162	27	53	177	B	N	N	N
Vireonidae	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Vireonidae	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviara	31	7	72	7	1	0	22	126	98	2	5	28	B	N	N	N
Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo	0	3	4	3	2	7	0	2	0	0	1	0	M	N	N	N
Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Hirundinidae	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruira	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Turdidae	<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	1	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	M	N	N	N

TABELA 5.2-1: Lista total de espécies de aves já registradas nas áreas sob influência da Barragem Pedreira e aquelas registradas por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP) durante as dez primeiras campanhas de monitoramento

Família	Nome do Táxon	Nome em Português	PONTOS de Registro (PED)												Sens	End	Status de Conservação	
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21			SP	BR
Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-branco	56	40	17	22	41	60	68	56	27	33	32	16	B	N	N	N
Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	6	23	5	19	29	25	35	26	12	6	29	15	B	N	N	N
Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Parulidae	<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	0	3	9	0	0	4	49	9	9	38	97	8	M	N	N	N
Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	127	58	81	28	153	151	207	186	144	148	172	165	M	N	N	N
Parulidae	<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	canário-do-mato	36	75	87	31	120	130	67	113	155	31	5	15	M	N	N	N
Icteridae	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	N	N	N
Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	QA	N
Thraupidae	<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzento	0	0	1	1	3	6	8	0	3	6	2	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaço-do-coqueiro	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	21	12	35	33	8	19	29	15	23	15	10	5	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	M	N	N	N
Thraupidae	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	3	3	6	2	0	7	11	59	11	32	11	51	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	7	9	10	2	0	8	25	14	10	23	7	6	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	N	N	N
Thraupidae	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro	0	0	1	11	0	0	27	23	105	0	13	59	B	N	N	N
Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	0	1	10	3	2	5	8	7	6	6	5	0	B	N	N	N
Fringillidae	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	4	1	B	N	N	N

Considerando o total de espécies registradas até o momento, 62 (42,5%) pertencem à ordens de Não-Passeriformes, enquanto 84 (57,5%) pertencem à ordem Passeriformes. Entre os Não-Passeriformes as famílias que tiveram o maior número de espécies registrado foram: Picidae (nove espécies), Columbidae (oito espécies), Trochilidae (seis espécies) e Psittacidae (seis espécies). Por outro lado, entre os Passeriformes, as famílias mais diversas foram: Tyrannidae (16 espécies), Thraupidae (15 espécies) e Furnariidae (10 espécies).

Ressalta-se que durante a primeira campanha de monitoramento foram registradas cinco espécies de aves que ainda não haviam sido registradas nos levantamentos anteriores realizados na área de estudo, são elas o anu-branco (*Gira guira*), o falcão-relógio (*Micrastur semitorquatus*), o chocão-barrado (*Hypoedaleus guttatus*), o tuque (*Elaenia mesoleuca*) e a saíra-preciosa (*Tangara preciosa*). Na segunda campanha foram acrescentadas outras sete espécies, ou seja: o curiango (*Nyctidromus albicollis*), o pica-pau-rei (*Campephilus robustus*), a choquinha-lisa (*Dysithamnus mentalis*), arredio-pálido (*Cranioleuca pallida*), o corocoxó (*Carpornis cucullata*), a maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado (*Myiarchus tyrannulus*), sanhaçu-do-coqueiro (*Tangara palmarum*). Na terceira campanha, foram acrescentadas três espécies, o matracão (*Batara cinerea*), a papa-taoca-do-sul (*Pyriglena leucoptera*) e o tororó (*Poecilatriccus plumbeiceps*). Os resultados da quarta campanha adicionaram quatro espécies que ainda não haviam sido relacionadas para a área de estudo, a curicaca (*Theristicus caudatus*), a juriti-vermelha (*Geotrygon violacea*) (considerada "em perigo" pelo Decreto nº 63.853/2018), o pichororé (*Synallaxis ruficapilla*) e a viuvinha (*Colonia colonus*). A quinta campanha, por sua vez, adicionou três espécies de aves: o barbudo-rajado - (*Malacoptila striata*), o ui-pí (*Synallaxis albescens*) e a pipira-preta (*Tachyphonus rufus*). Na sexta campanha, apenas uma espécie foi adicionada, o ferreirinho-relógio (*Todirostrum cinereum*). Na sétima campanha foi registrado o teque-teque (*Todirostrum poliocephalum*), quanainda não havia sido registrado para a área. Na nona campanha foi registrado o João-de-barro (*Furnarius rufus*), espécie comum na região. Por fim, na décima campanha foram registradas outras quatro espécies: o inhambu-chintã (*Crypturellus tataupa*), o gavião-caboclo (*Buteogallus meridionalis*), a saracura-do-mato (*Aramides saracura*) e o cisqueiro-do-rio (*Clibanornis rectirostris*), esta última, uma espécie cuja distribuição está associada, principalmente ao Cerrado. Portanto, no total, durante as primeiras dez campanhas de monitoramento de fauna foram acrescentadas 29 espécies de aves à lista inicialmente elaborada para a área de estudo.

B. Suficiência Amostral

Para a avaliação da suficiência amostral foi elaborada uma curva de riqueza com base nos dados observados e na extrapolação a partir destes. Essa análise permite avaliar o quão bem está representada a comunidade de aves pela amostragem realizada até a décima campanha (**Figura 5.2-1**).




FIGURA 5.2-1: Diversidade de aves observada e estimada para os remanescentes monitorados. Linha contínua - dados observados; Linha tracejada - dados estimados; e respectivos intervalos de confiança (IC 95%). Cada cor representa um dos pontos de amostragem, conforme consta da figura. As extrapolações realizadas, considerando o dobro de indivíduos daqueles observados em cada fragmento, indica incremento pouco significativo.

Aparentemente, as curvas de riqueza de espécies, que representam os dados obtidos nos pontos localizados no remanescente situado na porção montante do futuro reservatório, estão mais próximas de atingir a assíntota do que aquelas que representam os pontos no remanescente próximo ao eixo da Barragem Pedreira.

Embora o número de indivíduos registrados no Remanescente 01 tenha sido menor do que o observado para o Remanescente 02, a riqueza de espécies de aves é maior no primeiro. Isso é constatado, não apenas pelos dados observados, como pela riqueza inferida.

C. Características Ecológicas

Neste item é apresentada uma caracterização geral da avifauna quanto à sensibilidade a alterações ambientais. Essas análises ajudam a avaliar o estado de conservação dos ambientes amostrados, assim como eventuais variações em função da implantação do empreendimento.

As espécies de aves, em particular aquelas da Região Neotropical, apresentam grande diversidade quanto à sensibilidade a alterações nos ambientes naturais. Enquanto algumas espécies apresentam alta resiliência, permanecendo mesmo em ambientes profundamente alterados pelo homem, outras respondem prontamente, e de forma drástica às alterações, ainda que tênues, dos ambientes em que vivem, muitas vezes desaparecendo de paisagens alteradas.

Stotz *et. al.* (1996) propuseram a classificação das espécies das aves neotropicais em três níveis de sensibilidade. As espécies de baixa sensibilidade, que apresentam alta resiliência, permanecendo mesmo em ambientes extremamente empobrecidos; as espécies de média sensibilidade, que apresentam uma menor resiliência, mas que conseguem sobreviver em ambientes sob certo nível de pressão antrópica, embora desapareçam de cenários mais severos de simplificação ambiental; e espécies de alta sensibilidade, que apresentam baixa resiliência, respondendo de maneira negativa, mesmo a pequenas alterações ambientais.

A avifauna de florestas neotropicais, como a Mata Atlântica, apresenta, em cenários de bom estado de conservação, uma composição marcada pela predominância de espécies de média e alta sensibilidade a alterações ambientais. As espécies de baixa sensibilidade, nesses ambientes, tendem a ser um grupo minoritário.

O processo de alteração dos ambientes florestais, assim como da estrutura da paisagem, tem consequências sobre a composição da avifauna. Com a intensificação do processo de simplificação ambiental, assiste-se, também, a um processo não apenas de perda de diversidade (riqueza) como de alteração na composição da avifauna quanto à sensibilidade ambiental. Quanto mais drásticas as mudanças imprimidas sobre esses ambientes, menor será a participação de espécies de média e, principalmente, de alta sensibilidade, aumentando, proporcionalmente, a participação daquelas espécies de baixa sensibilidade.




FIGURA 5.2-2: Distribuição das espécies de aves registradas durante as campanhas de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira, quanto à sensibilidade a alterações ambientais (baixa, média ou alta).

Na **Figura 5.2-2** é apresentada a composição da avifauna amostrada nas dez primeiras campanhas de monitoramento, quanto aos níveis de sensibilidade a alterações ambientais. Conforme esperado, os resultados indicam uma predominância de espécies consideradas de baixa sensibilidade a alterações ambientais. Este grupo representa 62% do total de espécies registradas e reúne espécies como a asa-branca (*Patagioenas picazuro*), a juruti (*Leptotila verreauxi*), o pica-pau -do-campo (*Colaptes campestris*), o periquitão (*Psittacara leucophthalmus*), o joão-teneném (*Synallaxis spixi*), o irré (*Myarchus swainsonii*) e o sabiá-barranco (*Turdus leucomelas*). A maior parte dessas espécies possuem ampla distribuição ocorrendo tanto no bioma da Mata Atlântica como em outros biomas, sendo algumas (como o pica-pau-do-campo, *Colaptes campestris*) típicas de ambientes abertos. Muitas dessas aves se beneficiam do processo transformação da paisagem imposto pelo homem, aumentando a abundância nas áreas de ocorrência natural, ou mesmo ampliando a distribuição geográfica.

Por outro lado, 34% das espécies de aves registradas são consideradas de média sensibilidade, ou seja, são espécies que apresentam alguma resiliência, mas que são dependentes de fragmentos de vegetação nativa em estado de conservação relativamente bom (ex. fragmentos em estágio médio de regeneração). Como exemplo de espécies de aves que pertencem a esse grupo podemos citar: o gavião-de-cauda-curta (*Buteo brachyurus*); o chupa-dente (*Conopophaga lineata*), espécie endêmica da Mata Atlântica; o barranqueiro-de-

olho-branco (*Automolus leucophthalmus*), espécie endêmica da Mata Atlântica; e o soldadinho (*Antilophia galeata*), espécie endêmica do Cerrado, que ocorre exclusivamente associada as formações florestais que se desenvolvem nas margens dos rios (ex. florestas de galeria). Entre essas espécies, porém, também são encontradas aves de ambientes abertos, caso da gralha-do-campo (*Cyanocorax cristatellus*), típica do Cerrado. É importante lembrar que uma parte significativa das espécies frequentes nas sete campanhas de monitoramento são dependentes de ambientes florestais, caso do pula-pula (*Basileuterus culicivorus*) que em todas as campanhas figura entre as espécies mais frequentes (veja **Figura 5.2-4**).

Por fim, merece destaque o registro de espécies consideradas por Stotz et. al. (1996) de alta sensibilidade a alterações ambientais, ou seja a saracura-três-potes (*Aramides cajaneus*); a juruti-vermelha (*Geotrygon violacea*), espécie "em perigo" no Estado de São Paulo, o pica-pau-rei (*Campephilus robustus*), o papa-taoca do sul (*Pyriglena leucoptera*), o chocão-barrado (*Hypoedaleus guttatus*) e o matracão (*Batara cinerea*). Este grupo representou 4% das espécies registradas até o momento para as áreas sob influência da Barragem Pedreira.

D. Frequência Relativa

A partir dos resultados obtidos por meio da análise das 6.000 gravações (50 gravações por ponto de monitoramento, por campanha) foi calculada a frequência relativa das espécies de aves nas áreas sob influência da Barragem Pedreira considerando todas as campanhas (para o Remanescente 01 e o Remanescente 02) e, individualmente, para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima campanha (**Figura 5.2-3 e 5.2-4**).




FIGURA 5.2-3: Número de registros das espécies de aves nas dez primeiras campanhas de monitoramento da área sob influência da Barragem Pedreira. Em azul a distribuição do número de registros no Remanescente (01) localizado próximo ao eixo da barragem; e em vermelho o Remanescente (02) localizado na porção montante do futuro reservatório.

Os resultados apresentados na **Figura 5.2-3** são bastante informativos. Em ambos os remanescentes estudados, de maneira mais evidente no Remanescente 02, verifica-se um padrão onde poucas espécies apresentam alta frequência e muitas apresentam baixa frequência. Registra-se, também, que a espécie com maior frequência em ambos os remanescentes foi o pula-pula (*Basileuterus culicivorus*), espécie dependente de ambientes florestais, mas que tende a aumentar sua abundância em formações alteradas pelo processo de fragmentação.

Na **Figura 5.2-4**, são apresentadas as 20 espécies mais frequentes em cada uma das dez campanhas de monitoramento de fauna realizadas até o momento.

Nas duas primeiras campanhas, a espécie mais frequente foi o pula-pula (*Basileuterus culicivorus*) (Figura 5.2-5). Na primeira campanha esta espécie foi registrada 144 vezes, representando 16,49% de todos os registros realizados; e na segunda campanha foram 123 registros, representando 17,08% do total. Na terceira campanha o pula-pula obteve o segundo maior valor de frequência (10,31%), tendo sido registrado 126 vezes. A espécie mais frequente na terceira campanha foi o pitiguari (*Cyclarhis gujanensis*), documentada 150 vezes, representando 12,27% do total de registros. Na quarta campanha o pula-pula foi a terceira espécie mais frequente (9,08%), sendo a juriti (*Leptotila verreauxi*) a mais comum (11,72%) seguida do pitiguari (9,30%). Na quinta campanha, a espécie mais frequente foi o estalador (*Corythopsis delalandi*), que representou 17,2% de todos os registros. Na sexta campanha o pula-pula (*Basileuterus culicivorus*) volta a ser a espécie mais frequente, correspondendo a 29,1% dos registros, seguida pelo pitiguari (*Cyclarhis gujanensis*), representando apenas 6,9% dos registros. Na sétima, oitava e nona campanha, a espécie mais frequente foi o pula-pula (*Basileuterus culicivorus*), representando 29%, 15,7% e 19,5% de todos os registros, respectivamente. Por fim, na décima campanha a espécie mais frequente foi o pitiguari (*Cyclarhis gujanensis*), representando 10,93% dos registros, seguido do sabia-laranjeira *Turdus rufiventris*, representando 10,76%, e do pula-pula (*Basileuterus culicivorus*) totalizando 10,19% dos registros.

Ficaram entre as 20 espécies mais frequentes, nas dez campanhas de monitoramento, sete espécies de aves (*Basileuterus culicivorus*, *Corythopsis delalandi*, *Cyclarhis gujanensis*, *Myiothlypis flaveola*, *Patagioenas picazuro*, *Tolmomyias sulphureus* e *Turdus leucomelas*).

Destacam-se, portanto, espécies típicas de fragmentos florestais (da Floresta Estacional Semidecidual) do interior do Estado de São Paulo. Embora a maioria seja considerada dependente ou semi-dependente de ambientes florestais, são espécies mais tolerantes ao processo de simplificação ambiental ocorrendo em paisagens antropizadas e sob maior influência de atividades humanas, como em borda de remanescentes e em formações em estágio inicial e inicial/médio do processo de sucessão secundária da vegetação.

E. Similaridade

Neste item são apresentados os resultados das análises de NMDS que visam avaliar a dissimilaridade entre as comunidades de aves associadas aos dois remanescentes e entre as

dez campanhas de amostragem. Na **Tabela 5.2-2** são apresentados os resultados dos testes que avaliam a significância das diferenças entre remanescentes e entre campanhas.

TABELA 5.2-2: Significância da diferença entre as comunidades de aves registradas nos dois remanescentes (próximo ao Eixo e na cabeceira do reservatório) e entre as sete campanhas realizadas

TRATAMENTO	P
Remanescentes	<0,01**
Campanhas	<0,01**

Conforme pode ser observado na **Tabela 5.2-2**, foi identificada diferença significativa na composição da avifauna, tanto entre os dois remanescentes monitorados (**Figura 5.2-5**); como entre as campanhas de monitoramento (**Figura 5.2-6**).




FIGURA 5.2-5: NMDS das comunidades de aves associadas aos 12 pontos amostrados. Em cores diferentes são apresentados os pontos localizados no remanescente próximo ao eixo (azul) e no remanescente situado na porção montante do futuro reservatório (preto).

Os resultados na **Figura 5.2-5** mostra a dispersão dos pontos de cada remanescente monitorado no espaço de dissimilaridades. É importante notar uma maior dispersão dos pontos (maior dissimilaridade) no Remanescente 01, localizado mais próximo ao eixo da barragem e que sofreu supressão durante o período de monitoramento. No Remanescente 02, essa dispersão é menor, indicando maior homogeneidade na composição de espécies de aves.




FIGURA 5.2-6: NMDS das comunidades de aves associadas aos pontos amostrados nas áreas sob influência da Barragem Pedreira. Em azul claro são apresentados os pontos amostrados na primeira; em verde escuro na segunda, em cinza na terceira, em vermelho na quarta; em verde claro na quinta; em violeta na sexta; em azul escuro na sétima; em bege na oitava; em azul esverdeado na nona; e em azul claro na décima.

As comunidades de aves variam significativamente, quanto à composição, entre as dez campanhas. A grande consistência observada entre os resultados das análises de *soundscape* e da avifauna, mostram que a atividade sonora das aves têm uma influência marcante sobre a paisagem sonora analisada.

As diferenças significativas registradas entre campanhas deve-se, possivelmente, a dois fatores principais: (1) perturbação da comunidade em razão das intervenções realizadas para a implantação do eixo da Barragem Pedreira, e (2) variação na atividade das espécies de aves ao longo do ano, condicionada pelas mudanças climáticas e, conseqüentemente, oferta de recursos.

F. Espécies Prioritárias

Neste item são apresentadas todas as espécies, já registradas na área de estudo, consideradas sob algum grau de ameaça pelas listas oficiais de espécies ameaçadas em âmbito nacional (ICMBio, 2018) ou estadual (Decreto Estadual N° 60.133 de 7 de fevereiro de 2014), conforme descrito a seguir:

- Juriti-vermelha (*Geotrygon violacea*) - Espécie de columbídeo, de médio porte. A distribuição da subespécie *Geotrygon v. violacea* inclui a Mata Atlântica, da região sul do Brasil até o sul da Bahia, se estendendo a leste em direção ao nordeste da Argentina, leste do Paraguai e Bolívia. Também ocorre no leste da Amazônia. Embora se distribua por uma área relativamente ampla, é relativamente rara, sendo registrada apenas esporadicamente. Habita ambientes florestais onde se alimenta, principalmente de sementes e frutos caídos no chão. É considerada na categoria "em perigo" pela lista do Estado de São Paulo. Foi registrada na área, pela primeira vez, na 4ª campanha, apenas no ponto PED17, localizado no Remanescente 02;
- Arara-canindé (*Ara ararauna*) - Espécie de psitacídeo de grande porte (cerca de 80 cm de comprimento), com ampla distribuição, ocorre principalmente no Brasil Central, embora também seja encontrada em outros biomas como a Amazônia. Originalmente comum no estado de São Paulo, ocorrendo associado às formações abertas e florestas estacionais do interior tornou-se progressivamente mais rara no em razão da destruição de seu hábitat e, também, pela captura para o comércio de animais silvestres. Foi registrada apenas em levantamentos anteriores, realizados na área de estudo;
- Soldadinho (*Antilophia galeata*) - Essa espécie de píprideo é endêmica do Cerrado, onde ocorre associada às formações florestais marginais à cursos d'água (ex. matas de galeria). É uma espécie de sub-bosque que se alimenta, principalmente, de pequenos frutos, mas também de insetos. A principal ameaça a essa espécie é a destruição de seu hábitat. Foi registrada nos pontos PED01 e PED16; e

- Pássaro-preto (*Gnorimopsar chopi*) - Esse icterídeo, bastante conhecido, possui ampla distribuição pelo país, só não ocorrendo em extensas formações florestais como a Amazônia. É uma espécie que se alimenta de diferentes itens como insetos, frutos, sementes, sendo considerada onívora. A principal pressão sobre essa espécie (principalmente histórica) é a captura em razão de ser uma ave extremamente dócil e com um canto muito atraente. Foi registrada apenas em levantamentos anteriores, realizados na área de estudo.

G. Registros Fotográficos

A seguir são apresentadas algumas fotos de aves registradas na área de estudo durante estudos de campo nas áreas sob influência da Barragem Pedreira.

São apresentadas, também, exemplos de sonogramas, de gravações obtidas durante as campanhas de monitoramento, onde são indicadas e identificadas espécies registradas durante o presente estudo.



Foto 5.2-1: Indivíduo de coruja-orelhuda (*Asio clamator*), registrado na sétima campanha de monitoramento Autor: J. Cassimiro



Foto 5.2-2: jacu (*Penelope obscura*), registrado durante a sétima campanha de amostragem por meio de armadilha fotográfica



Foto 5.2-3: Seriema (*Cariama cristata*) fotografada próxima ao PED12, na quarta. campanha. Autor: J. Cassimiro



Foto 5.2-4: Bacurau (*Nyctidromus albicollis*) fotografado no ninho, nas proximidades do PED17, quarta. campanha. Autor: J. Cassimiro



Foto 5.2-5: Espécime de rolinha (*Columbina talpacoti*), registrado no ponto PED09 na sexta campanha. . Autor: J. Cassimiro



Foto 5.2-6: Espécime de asa-branca (*Patagioenas picazuro*), registrado próximo ao ponto PED13, na sexta campanha. . Autor: J. Cassimiro



Foto 5.2-7: Espécime de juruti (*Leptotila verreauxi*), registrado no ponto PED21 na quinta campanha



Foto 5.2-8: Casal de *Ara ararauna*, registrado próximo à área de estudo



Foto 5.2-9: Tucanuçu (*Ramphastos toco*), nas proximidades do ponto PED08



Foto 5.2-10: Picapauzinho-barrado (*Picumnus cirratus*)



Foto 5.2-11: Indivíduo de *Tachyphonus coronatus*



Foto 5.2-12: Indivíduo (fêmea ou jovem) de *Thamnophilus caerulescens*



Foto 5.2-13: Indivíduo de *Tolmomyias sulphureus*



Foto 5.2-14: Indivíduo de *Setophaga pitiayumi*



Foto 5.2-15: Indivíduo de *Saltator similis*



Foto 5.2-16: Indivíduo de *Picumnus cirratus*




Foto 5.2-17: Indivíduo de *Patagioenas picazuro*



Foto 5.2-18: Indivíduo de *Piaya cayana*



Foto 5.2-19: Indivíduo de *Coryphospingus cucullatus*



Foto 5.2-20: Indivíduo de *Buteo brachyurus*




FIGURA 5.2-7: Exemplos de sonogramas obtidos entre as 1.800 gravações analisadas nessas dez primeiras campanhas de monitoramento, onde podem ser observados registros da biofonia, em particular, do canto de espécies como o estalador (*Corythopsis delalandi*), o gavião-de-cauda-curta (*Buteo brachyurus*) e o picapauzinho-barrado (*Picumnus cirratus*)

5.3 MASTOFAUNA

A. Riqueza e Composição

Durante as dez primeiras campanhas de monitoramento da mastofauna de médio e grande porte nas áreas sob influência da Barragem Pedreira foram registradas 28 espécies de mamíferos, das quais 22 nativas. Essas espécies encontram-se distribuídas em oito ordens (Figura 5.3-1, Tabela 5.3-1).




FIGURA 5.3-1: Proporção de espécies em cada ordem de mamíferos (incluindo espécies exóticas) registradas nos pontos de amostragem, durante as dez primeiras campanhas de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira

TABELA 5.3-1: Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte já registradas na área de estudo e espécies registradas durante as dez primeiras campanhas de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira

Família	Espécie	Nome popular	Pontos de Amostrados nas Dez Primeiras Campanhas																					MT	RG	End	Status de Conservação		
			F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	BR	SP
Bovidae	<i>Bos taurus</i>	gado	X	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	BA,PA	AV	-	-	-
Suidae	<i>Sus scrofa</i>	javaporco	X	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-
Cervidae	<i>Mazama guazoubira</i>	veado-catingueiro	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	AF,BA	RF	-	-	-	
Canidae	<i>Canis familiaris</i>	cachorro-doméstico	X	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AF	RF	-	-	-
	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato	X	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	AF,BA	RF	BR	-	-
	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	lobo-guará	X	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BA,VE	FE	-	VU	VU
Felidae	<i>Felis catus</i>	gato-doméstico	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BA				
	<i>Puma concolor</i>	onça-parda	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	VE	-	BR	VU	AM
	<i>Leopardus guttulus</i>	gato-do-mato	X	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	AF,VE	RF	-		
	<i>Herpailurus yagouarundi</i>	gato-mourisco	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	VU	
Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	irara		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	AF	RF	BR	-	-
	<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	BR	-	QA
Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	quati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0					
	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	X	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AF	RF	BR	-	-
Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AF	RF	-	VU	AM
Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha	X	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	AF,BA	RF,AV	BR	-	-	
	<i>Cabassous tatouay</i>	tatu-de-rabo-mole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	AF	RF	-	-	-
Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	gambá-de-orelha-branca	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	BR	-	-	
	<i>Didelphis aurita</i>	gambá-de-orelha-preta	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	BA	AV	BR	-	-
Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapiti	X	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	BA	AV	BR	-	-
	<i>Lepus europeus</i>	lebre	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-do-tufo-branco	X	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	BA	AV,VC	BR	-	-
	<i>Callithrix penicillata</i>	sagui-do-tufo-preto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifrons</i>	guigó		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	X	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	BA,VE	OB	BR	-	-	
Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	paca	X	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	AF	RF	BR	-	QA
Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	porco-espinho	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	BR	-	-
Sciuridae	<i>Guerlinguetus brasiliensis</i>	esquilo	X	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AF	RF	BR	-	-

As ordens Carnívora e Rodentia foram as que apresentaram maior número de espécies até esta etapa do monitoramento, com 11 e 4 espécies, respectivamente. Artyodactyla e Primates são representadas por três espécies, Didelphiomorpha, Cingulata e Lagomorpha por duas e Pilosa é representada por apenas uma espécie.

Dentre os mamíferos registrados em campo, quatro são considerados ameaçados de extinção (na categoria vulnerável) no estado de São Paulo (Decreto Estadual N° 63.853 de 27 de novembro de 2018), a onça-parda (*Puma concolor*), o gato-do-mato-pequeno (*Leopardus guttulus*), o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) e o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*). Na lista brasileira (ICMBio, 2018) os quatro também são considerados vulneráveis, assim como o gato-mourisco (*Herpailurus yagouarundi*).

Dentre os pontos amostrais, PED18 foi aquele onde mais espécies foram registradas (12 no total, sendo três exóticas e nove nativas). Em seguida temos PED12, com 11 espécies (duas exóticas e nove nativas). Com o terceiro maior número de espécies, até a décima campanha, aparecem com dez espécies o PED01 (quatro exóticas e seis nativas) e o PED10 (uma exótica e nove nativas). Em quarto lugar, dois pontos apresentaram nove espécies, PED09 (três exóticas e seis nativas) e PED19 (uma exótica e oito nativas). Um total de oito espécies foram registradas em PED02 e PED16 (ambas com duas exóticas e seis nativas). PED14 e PED21 apresentaram sete espécies (ambas com duas exóticas e cinco nativas). Em seis pontos foi registrado um total de seis espécies, sendo que em PED04, PED13, PED15 e PED17 foram registradas cinco espécies nativas e uma exótica; enquanto em PED05 e PED20 foram registradas duas exóticas e quatro nativas. Em PED03 (duas exóticas e três nativas) e PED11 (uma exótica e quatro nativas) foi registrado um total de cinco espécies de mamíferos. No ponto PED08 foram registradas quatro espécies, sendo duas exóticas e duas nativas. Por fim, o ponto PED07 foi o que apresentou, até o momento, menor riqueza de espécies, tendo sido registradas apenas duas, ambas nativas (**Figura 5.3-2**).




FIGURA 5.3-2: Riqueza de espécies registrada em cada ponto amostral, durante as dez primeiras campanhas de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira

B. Suficiência Amostral

Neste item é apresentada uma análise da suficiência amostral da comunidade de mamíferos, com base nos registros realizados ao longo das dez primeiras campanhas de monitoramento.

A curva apresentada na **Figura 5.3-3** evidencia uma tendência de incremento do número de espécies, indicando que há uma parcela de espécies ainda não registradas durante o monitoramento, o que é confirmado por espécies que foram registradas em levantamentos anteriores na área e que não foram identificadas até a décima campanha de monitoramento.

Entretanto, mesmo com a continuidade dos esforços de monitoramento, o incremento de espécies não deve ser expressivo uma vez que a curva apresenta uma tendência a estabilização e o número total de espécies já registradas (levantamentos passados e nas dez primeiras campanhas de monitoramento - 27 espécies, sendo 21 nativas) é consistente com o esperado para ambientes com as características daqueles amostrados.




FIGURA 5.3-3: Curva de rarefação do número acumulado de espécies de mamíferos em função do número de áreas de amostragem, ao longo das dez primeiras campanhas de monitoramento a área de influência da Barragem Pedreira. Linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 95%

A tendência de novas espécies serem registradas com a continuidade da amostragem é corroborada pela estimativa de riqueza obtida por meio do estimador Jackknife de primeira ordem. A partir dos dados coletados durante as dez primeiras campanhas de amostragem, estimou-se uma riqueza de 32 espécies, ou seja, cerca de quatro espécies a mais do que aquelas registradas até o momento (**Figura 5.3-3**). Este cenário poderá ser confirmado com a continuidade dos estudos que estão sendo realizados na área.

É importante lembrar que apesar da riqueza de espécies de uma área ser finita, apenas amostragens exaustivas podem levar à assíntota de curvas de acumulação de espécies (Delabie *et al.* 2000). Entretanto, se a natureza da curva indicar um decréscimo na taxa de acúmulo de espécies, então o esforço amostral é adequado para estimar a riqueza de espécies de uma área.

C. Características Ecológicas

A composição de espécies de mamíferos registrada na área sob influência da Barragem Pedreira compreende basicamente espécies generalistas e tolerantes a pressão antrópica. A capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*), o mão-pelada (*Procyon cancrivorus*), o gambá (*Didelphis karkinophaga*), o tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) são exemplos de espécies de ampla distribuição e tolerantes a perturbações antrópicas.

Mesmo espécies predadoras como a onça-parda (*Puma concolor*), o gato-do-mato (*Leopardus guttulus*) e a irara (*Eira barbara*) apresentam grande resiliência, estando presentes mesmo em paisagens onde os ambientes naturais encontram-se fragmentados e sob maior pressão antrópica. Embora o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) seja uma espécie relativamente sensível, consegue sobreviver em ambientes onde persistam recursos, ainda que dispersos em remanescentes de vegetação nativa.

A presença de espécies exóticas observadas nas áreas de estudo é também um fator de pressão para as espécies nativas. Os bovinos são reservatórios e hospedeiros de zoonoses como a brucelose, tuberculose, leptospirose, gripe suína com potencial de contágio entre animais domésticos e silvestres (AGUIAR, 2007). A presença de cães (*Canis familiaris*) e gatos (*Felis catus*) é relevante quando se trata de conservação da diversidade de mamíferos. Esses animais são potenciais predadores e competidores da fauna silvestre quando em áreas de vegetação nativa, e têm sido apontados como responsáveis por grande impacto sobre a fauna silvestre (OLIVEIRA *et. al.*, 2008; SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 2008; ESPARTOSA, 2009).

Os cães domésticos acessam áreas naturais e atuam como predador não natural de diversas espécies de animais silvestres, sendo relatada a predação de veados (*Mazama sp.*), paca (*Cuniculus paca*), tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) e gambás (*Didelphis spp*) (GALETTI & SAZIMA, 2006), presentes na área de estudo.

Também foram registradas a presença do javaporco (*Sus scrofa*), espécie exótica que tem ampliado rapidamente sua distribuição e causando prejuízos, não apenas a culturas agrícolas, mas, principalmente, aos ambientes naturais, competindo por recursos com espécies nativas.

D. Frequência Relativa

Na **Figura 5.3-4** é apresentada a frequência relativa das espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas durante a primeira (**Figura 5.3-4a**), a segunda (**Figura 5.3-4b**) a terceira (**Figura 5.3-4c**), a quarta (**Figura 5.3-4d**), quinta (**Figura 5.3-4e**), sexta (**Figura 5.3-4f**), sétima (**Figura 5.3-4g**), oitava (**Figura 5.3-4h**), nona (**Figura 5.3-4i**) e décima (**Figura 5.3-4j**) campanha do Subprograma de Monitoramento de Fauna.




FIGURA 5.3-4: Frequência de ocorrência das espécies registradas durante o monitoramento da área sob influência da Barragem Pedreira. Resultados obtidos na primeira (A), segunda (B), terceira (C), quarta (D), quinta (E), sexta (F), sétima (G), oitava (H), nona (I) e décima (J) campanha de monitoramento

Durante a primeira campanha de monitoramento, o sagui-de-tufo-branco (*C. jacchus*) foi a espécie mais frequente, seguido do tatu-galinha (*Dasytus novemcinctus*) e da capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*). Juntas responderam por cerca de 60% de todos os registros realizados nesta etapa do trabalho. A quarta espécie mais frequente foi uma espécie exótica (*Bos taurus*) respondendo por 12% dos registros, o que evidencia a grande influência de espécies exóticas sobre os ambientes monitorados, inclusive sobre os dois mais importantes remanescentes de vegetação nativa existentes no entorno do empreendimento. As demais espécies registradas representam, cada uma, 4% do total de registros (*Canis familiaris*, exótica, e as espécies nativas *Leopardus guttulus*, *Eira barbara*, *Procyon cancrivorus*, *Didelphis karkinhphaga*, *Sylvilagus brasiliensis* e *Guerlinguetus brasiliensis*).

Na segunda campanha, quando foram registradas apenas oito espécies de mamíferos de médio e grande porte, a espécie mais frequente foi *Bos taurus*, representando 25% do total de registros, confirmando a grande exposição dos ambientes da região aos impactos causados por espécies exóticas. Grande parte dos registros foram realizados por armadilhas fotográficas instaladas em meio aos principais remanescentes de vegetação nativa da região. A segunda espécie mais frequente durante a segunda campanha de amostragem foi o sagui-de-tufo-branco (*C. jacchus*), que também apresentou elevada frequência na primeira campanha. Essa espécie respondeu por 21% dos registros. O sagui-de-tufo-branco é seguido pelo tatu-galinha (*Dasytus novemcinctus*) que representou 17% dos registros; a paca (*Cuniculus paca*) 13%, embora não tenha sido registrada durante a primeira campanha; o cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*) e o veado-catingueiro (*Mazama guazoubira*), ambos representando 8% dos registros; e, finalmente, o esquilo (*Guerlinguetus brasiliensis*) e o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*), responsáveis, cada um, por 4% dos registros realizados na segunda campanha de monitoramento.

A terceira campanha foi aquela onde foi registrado o maior número de espécies, o dobro do registrado na segunda campanha, ou seja 16 espécies. Assim como na primeira campanha a espécie que apresentou maior frequência foi o sagui-de-tufo-branco (*C. jacchus*), que representou 21% dos registros. O segundo lugar é ocupado pelo gambá-de-orelha-preta (*Didelphis karkinhphaga*) e pelo tatu-galinha (*Dasytus novemcinctus*), com 13% dos registros, cada uma. Em seguida temos uma espécie nativa, o veado-catingueiro (*Mazama guazoubira*), e uma espécie exótica, o cachorro-doméstico (*Canis familiaris*), representando 8% dos registros. Exibem frequência relativa de 5% quatro espécies, três nativas, a capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*), a irara (*Eira barbara*) e o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*,

registrado apenas nessa campanha); e uma espécie exótica, o javaporco (*Sus scrofa*). As espécies com menor número relativo de registros durante a terceira campanha (frequência de 3%) foram o gambá-de-orelha-branca (*Didelphis marsupialis*), o tatu-de-rabo-mole (*Cabassous tatouay*, registrado apenas na terceira campanha), o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*), o gato-mourisco (*Herpailurus yaguaroundi*), o gato-do-mato (*Leopardus guttulus*) e o cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*), entre as espécies nativas; e o gado (*Bos taurus*), espécie exótica.

Durante a quarta campanha, quando foram registradas nove espécies, o tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) representou 28% dos registros, seguido da capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) e de *Bos taurus* uma espécie exótica. Todas as demais espécies (sagui-de-tufo-branco - *Callithrix jacchus*, mão-pelada - *Procyon cancrivorus*, gato-mourisco - *Herpailurus yaguaroundi*, gato-do-mato-pequeno - *Leopardus guttulus*, veado - *Mazama guazoubira* e javaporco - *Sus scrofa*) representaram apenas 4% dos registros realizados durante esta última campanha de amostragem da mastofauna.

Os resultados obtidos na quinta campanha, incluem 11 espécies (duas exóticas e nove nativas). A espécie que exibiu maior frequência foi o sagui-de-tufo-preto (*Callithrix jacchus*), que representou mais da metade do total de registros (55,4%). Essa espécie foi seguida da capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris* - 16,2%) e do tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus* - 10,8%). As demais espécies apresentaram frequência abaixo de 10%, ou seja: o gambá-de-orelha-preta (*Didelphis karkinophaga* - 5,4%), veado (*Mazama guazoubira* - 2,7%), paca (*Cuniculus paca*, 2,7), o gato-do-mato-pequeno (*Leopardus guttulus* - 1,35%), o gato-mourisco (*Herpailurus yaguaroundi* - 1,35%), o cão-doméstico (*Canis familiaris* - 1,35%), a irara (*Eira barbara* - 1,35%) e a onça-parda (*Puma concolor* - 1,35%).

Na sexta campanha, quando foram registradas 13 espécies (duas exóticas e 11 nativas), aquela que mostrou maior frequência foi o sagui-de-tufo-preto (*Callithrix jacchus*), que representou 32,4% dos registros. Em seguida, aparecem a capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) e o gato-do-mato-pequeno (*Leopardus guttulus*), ambas representando 10,8% dos registros. O gambá-de-orelha-preta (*Didelphis karkinophaga*) e a onça-parda (*Puma concolor*) se encontram na terceira posição em relação à frequência, representando, cada uma, 8,1% dos registros totais. Quatro espécies representam isoladamente 5,4% dos registros, ou seja: a irara (*Eira barbara*), o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*), o cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*) e o veado (*Mazama guazoubira*). Finalmente, temos três espécies

com frequência de 2,7%, o tatu-galinha (*Dasyopus novemcinctus*), espécie nativa; e duas exóticas, o gato-doméstico (*Felis catus*) e o cachorro-doméstico (*Canis familiaris*).

Na sétima campanha foram registradas 11 espécies de mamíferos, sendo sete nativas e quatro exóticas. Assim como na maioria das campanhas realizadas até o momento, uma das espécies que exibiram maior frequência foi o sagui-de-tufo-preto (*Callithrix jacchus*), representando 20% dos registros, assim como a capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*). O gado (*Bos taurus*) foi a terceira espécie mais frequente, representando 16,7%. Em seguida tivemos o tatu-galinha (*Dasyopus novemcinctus*) e o veado (*Mazama guazoubira*), ambos representando 10%. O javali (*sus scrofa*) representou 6,7% dos registros. E as demais espécies a lebre européia (*Lepus europaeus*), o tapiti (*Sylvilagus brasiliensis*), o gambá-de-orelha-preta (*Didelphis karkinophaga*), o gambá-de-orelha-branca (*Didelphis marsupialis*) e o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) foram registrados apenas uma vez, representando cerca de 3% do total de mamíferos observados nesta campanha.

Na oitava campanha foram registradas 12 espécies, sendo a mais frequente delas o sagui-de-tufo-preto (*Callithrix jacchus*), representando 32,3% de todos os registros. A capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) vem em segundo lugar (20%), seguida do tatu-galinha (*Dasyopus novemcinctus* - 13,8%); da irara (*Eira barbara* - 7,7%); do veado (*Mazama guazoubira* - 6,2%); do lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) e do quati (*Nasua nasua*), ambos representando 4,6% dos registros; do cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*) e do guigó (*Callicebus nigrifrons*), ambos representando 3,1%; e, finalmente, três espécies que representam, cada uma 1,5% dos registros, ou seja a onça-parda (*Puma concolor*), o gato-do-mato-pequeno (*Leopardus guttulus*) e o ouriço (*Coendou spinosus*).

Na nona campanha de monitoramento foram registradas nove espécies de mamíferos de médio ou grande porte. Do total de registros realizados, a grande maioria se deve ao sagui-de-tufo-preto (*Callithrix jacchus*), que representou 59,57%. Em segundo lugar aparecem o cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*) e o tatu-galinha (*Dasyopus novemcinctus*) ambos representando 8,51% dos registros. O veado (*Mazama guazoubira*) e a onça-parda (*Puma concolor*), responderam, cada um, por 6,38% dos registros realizados nessa campanha. A capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) representou 4,26%. Completando a lista de espécies registradas na nona campanha temos o gato-do-mato-pequeno (*Leopardus guttulus*) o cachorro-doméstico (*Canis familiaris*) e o gado (*Bos taurus*), cada uma com apenas um registro (2,13%).

Por fim, na décima campanha de monitoramento da mastofauna foram obtidos registros de 11 espécies. Aquela que exibiu maior frequência foi o tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*), representando 25,58% do total de registros realizados. A segunda espécie com maior número de registros foi a capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) com 18,60% dos registros. O veado (*Mazama gouazoubira*) foi a terceira espécie mais frequente (17,44%); seguida do sagui-de-tufo-branco (*Callithrix jacchus*) que representou 13,95% dos registros; do cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous* - 8,14%); onça-parda (*Puma concolor* - 4,65%); sagui-de-tufo-branco (*Callithrix penicillata* - 3,49%); gado (*Bos taurus*), javali (*Sus scrofa*) e tatu-do-rabo-mole (*Cabassous tatouay*) representando 2,33% dos registros, cada uma; e o gambá-de-orelha-preta (*Didelphis karkinophaga*) representando, apenas, 1,16% dos registros.

E. Similaridade

A **Figura 5.3-5** apresenta o agrupamento dos pontos de monitoramento com base na composição de espécies através do método UPGMA utilizando o índice de Bray-Curtis que pode ser interpretado como a porcentagem de similaridade compartilhada entre os agrupamentos.




FIGURA 5.3-5: Análise de agrupamento por similaridade dos pontos de amostragem da mastofauna, realizada com base nos resultados obtidos nas dez primeiras campanhas de monitoramento das áreas sob influência da Barragem Pedreira. A análise foi realizada a partir da matriz do índice de similaridade de Bray-Curtis, utilizando método UPGMA

Os dados obtidos durante as dez primeiras campanhas de monitoramento ainda não resultam em um claro padrão de agrupamento por similaridade dos pontos estudados, é possível notar uma mistura generalizada entre a maior parte dos pontos amostrados nos remanescentes melhor preservados (PED01, PED02, PED03, PED04, PED16, PED17, PED18, PED19, PED20 e PED21) e os demais pontos que se localizam em áreas agrícolas e em floretas mas secas. Tal padrão pode estar ligado à grande capacidade de dispersão da maioria das espécies de mamíferos registradas e, ainda, da baixa seletividade em relação ao habitat (a maior parte das espécies ocorre tanto em ambientes abertos como florestais)

De qualquer forma, com a continuidade do monitoramento, e conseqüente acúmulo de dados, poderá emergir padrões mais claros do que o observado até o momento (**Figura 5.3-5**). É importante lembrar que as análises de similaridade realizadas para a herpetofauna durante as primeiras campanhas de monitoramento (principalmente na primeira) também mostravam ausência de padrões claros com as características da área de estudo, no entanto, com o

acúmulo de informações os padrões foram surgindo e se tornando cada vez mais consistentes. O pode acontecer para a mastofauna.

F. Espécies Prioritárias

Neste item destacamos aquelas espécies de mamíferos de médio/grande porte que merecem maior cuidado, seja em relação à conservação, seja em relação aos impactos que podem causar em ambientes naturais.

- Onça-parda (*Puma concolor*) – é um carnívoro de hábito solitário e territorialista, formando pares somente durante a época de acasalamento (SUNQUIST & SUNQUIST, 2002). Considerado a segunda maior espécie de felino das Américas e a quarta maior do mundo com peso médio de um macho adulto podendo variar entre 40 e 72 kg, enquanto que nas fêmeas varia de 34 a 48 kg (SUNQUIST & SUNQUIST, 2009). Na região, a densidade estimada desse felino é varia de 0,68 a 3,74 indivíduos/100km² (BEISIEGEL & OLIVEIRA, 2012). As principais ameaças para a espécie são perda e fragmentação de habitat por expansão urbana e agropecuária, atropelamentos, eliminação de indivíduos por caça e/ou retaliação e queimadas (AZEVEDO *et. al.*, 2013; PERCEQUILLO & KIERRUFF, 2009). É considerada ameaçada de extinção em São Paulo e vulnerável no Brasil. Seu registro foi realizado na sexta, oitava, nona e décima campanha, nos pontos PED1, PED12, PED17, PED19 e PED20;
- Gato-do-mato (*Leopardus guttulus*), pequena espécie de felino, que possui hábito solitário que apresenta maior atividade no período da manhã, embora possa ser encontrado tanto no período diurno como noturno. A sua dieta é baseada em pequenos mamíferos, roedores, marsupiais, aves, répteis e invertebrados. É considerada ameaçada no Estado de São Paulo (Decreto Estadual N° 60.133 de 7 de fevereiro de 2014) e vulnerável na lista nacional (ICMBIO, 2018). Em razão da perda e fragmentação de seu habitat, causado pela expansão das atividades humanas estima-se que nos próximos 15 anos sua população possa declinar em 10%. Foi realizado o registro de um indivíduo na durante a primeira campanha no ponto de monitoramento PED10; no ponto PED19, durante a quarta campanha; no ponto PED12, na quinta campanha; na sexta campanha foi registrado em três pontos PED02, PED10 e PED12; na oitava campanha foi registrado no PED21; e na nona campanha teve seu registro

realizado no ponto PED11. Todos os registros foram realizados por meio da amostragem com armadilhas fotográficas.

- Gato mourisco (*Herpailurus yagouarundi*) - é de porte pequeno-médio, com corpo alongado, com cabeça pequena, arredondada e achatada, orelhas pequenas e também arredondadas. O comprimento médio da cabeça ao corpo é em média de 63,7 cm e o peso de 5,2 kg. Seu habitat é variado e ocorre em todos os biomas brasileiros, inclusive em vegetação secundária. Se alimenta principalmente de pequenos roedores, aves e répteis (OLIVEIRA & CASSARO, 1999). É o único felino que não consta na lista estadual de espécies ameaçadas do Estado de São Paulo (São Paulo, 2014); entretanto, foi recentemente incluído com o *status* de vulnerável na lista brasileira de espécies ameaçadas (MMA, 2014), visto que pouco se sabe sobre sua biologia, além de que é afetado pela perda de habitat (MICHALSKI & PERES, 2005). Seu registro foi realizado apenas na quarta campanha, no ponto PED19 e na quinta campanha, no ponto PED12, ambos por meio de armadilha fotográfica;
- Lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) - trata-se de uma espécie da família Canidae, de grande porte (chega a 1,15 m de comprimento, sem contar a cauda), típica dos ambientes abertos da América do Sul (ex. Cerrado). Ocorre desde o nordeste do Brasil ao norte do Uruguai. É uma espécie onívora, que se alimenta de grande variedade de itens, como frutos (em especial a fruta-do-lobo - *Solanum lycocarpum* - para a qual é o principal dispersor), pequenos vertebrados, como alguns mamíferos, aves, e répteis, além de insetos (ex. BUENO & MOTTA 2009; JUAREZ & MARINHO 2002 e RODRIGUES *et al.* 2007). Tanto na lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo, quanto na lista nacional, é considerada na categoria vulnerável. Foi registrada na área de estudo, durante o monitoramento, na terceira campanha, por meio de registro indireto (fezes) realizado próximo aos pontos PED05 e PED07; na sexta campanha no ponto PED14; e na oitava campanha nos pontos PED04, PED07 e PED09.
- Lontra (*L. longicaudis*) - é uma espécie solitária e semi-aquática, de hábitos noturnos ou diurnos que se abriga em tocas cavadas às margens de rios (CHEIDA *et al.*, 2011). Foi recentemente considerada “quase ameaçada” em nível global por ser suscetível a pressão, principalmente devido a alteração e perda de habitat (RHEINGANTZ & TRINCA, 2015). Entre os anos de 1996 a 2008 essa espécie foi considerada “não preocupante” e posteriormente “Deficiente em Dados”, demonstrando uma evolução

temporal no *status* de conservação. Estudos demonstram que as lontras são diretamente afetadas pela alteração de rios em represas. A jusante reduz o fluxo de água em períodos de escassez hídrica e a montante cria ambientes de grande profundidade não sendo apropriados para a obtenção de alimento por esses animais. As margens normalmente íngremes não fornecem abrigos e refúgios adequados, além de aumento da perturbação pela utilização humana recreativa dos reservatórios (PEDROSO, 2012). Todavia, é demonstrado que reservatórios com presença de mata ciliar no entorno, margens complexas e ausência de gado utilizando as margens contribuem para a utilização de reservatórios por lontras (PEDROSO, 2012). Foi registrada, apenas em levantamentos realizados anteriormente na área de estudo;

- Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) é uma espécie terrestre com dieta específica, voltada principalmente ao consumo de formigas e cupins, além de larvas. Utiliza uma ampla variedade de habitats, desde áreas abertas a campos inundáveis (MEDRI *et al.*, 2011). É também considerada uma espécie vulnerável a atropelamentos (CÁCERES *et al.*, 2012). Sua dieta específica, baixas taxas reprodutivas e tamanho grande tornam a espécie vulnerável a mudanças do habitat. Atualmente é considerada ameaçada no Estado de São Paulo (São Paulo, 2014) e vulnerável em âmbito nacional (MMA, 2014), devido principalmente à perda de habitats e mortes causadas por queimadas e atropelamentos (MIRANDA *et al.*, 2014). Foi registrado na segunda campanha de monitoramento, no ponto PED05, por meio de armadilha fotográfica;
- Paca (*Cuniculus paca*) possui distribuição geográfica desde o sul do México até o sul do Brasil. Apesar de ser uma espécie amplamente distribuída e generalista com relação ao habitat, sua abundância é baixa na porção sul e extinções locais decorrentes da destruição de habitat são relatadas na sua porção sudeste de sua distribuição (EMMONS, 2016), fortalecendo a classificação de quase ameaçada no estado de São Paulo. Adicionalmente, é uma espécie alvo constante de caça, estima-se que esta espécie represente cerca de 8% da carne de caça consumida ao longo de sua distribuição (PATTON, 2015a). Foi registrada apenas na segunda e quinta campanha de monitoramento, nos pontos PED05, PED12, PED18, PED19;
- Sagui-de-tufo-branco (*Callithrix jacchus*) – é um primata de pequeno porte com peso entre 450 e 500g. É caracterizado por possuir pelagem do corpo estriada, tufo de pelos brancos na região das orelhas e uma mancha branca na testa. Sua distribuição natural restringe-se a Caatinga e Mata Atlântica do nordeste brasileiro. Essa espécie

é registrada no Sudeste, principalmente no litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, devido a introduções de animais provenientes tráfico, coleta e comercialização ilegal de animais trazidos do Nordeste como animais de estimação ou pesquisa. Muitos espécimes tornam-se agressivos depois de adultos e são inadvertidamente soltos fora da sua área natural de distribuição, gerando danos ao ecossistema devido a competição e hidridização com o sagui nativo ameaçado de extinção (*Callithrix aurita*), predação de aves e transmissão de vírus rábico a humanos (TRAAD *et. al.*, 2012). É uma espécie disseminada, abundante e muito frequente na área de estudo. Foi registrado em todas as campanhas de monitoramento, por meio do método de busca ativa. Conta com registro em 14 dos 21 pontos de amostragem;

- Javaporco (*Sus scrofa*) – é um suíno exótico resultado da hibridização de porcos-domésticos e do javali europeu. Trazido ao Brasil para fins de comercialização e também disseminado por invasões vindas de países vizinhos como o Uruguai. Diversos impactos estão associados a esta espécie, entre eles estão os prejuízos a agroindústria, redução da diversidade de plantas da localidade, efeitos nas propriedades do solo e erosão, transmissão de doenças para a fauna nativa (PEDROSA *et. al.*, 2015). Foi registrada na primeira, na quarta e na décima campanha de monitoramento (PED08, PED16, PED18 e PED20), por meio de vestígios e armadilhas fotográficas.

G. Registro Fotográfico

Neste item são apresentados alguns registros fotográficos de espécimes da mastofauna obtidos por meio das armadilhas fotográficas ou durante a amostragem por procura ativa; e de vestígios. Ressalta-se que parte desses registros foram obtidos em levantamentos anteriores realizados na área de estudo.



Foto 5.3-1: Pegadas de capivaras (*Hydrochaeris hydrochaeris*) registradas no PD14 durante a quarta campanha. Foto: José Cassimiro, 2019



Foto 5.3-2: Fezes de lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*), registradas durante a terceira campanha de monitoramento, próximo ao ponto PED05.



Foto 5.3-3: Fezes provavelmente de lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*), registradas durante a sexta campanha de monitoramento.



Foto 5.3-4: Pegada de javaporco (*Sus scrofa*), registrada na quinta campanha de monitoramento.



Foto 5.3-5: sagui-de-tufo-branco (*Callithrix jacchus*) registrado em busca ativa no ponto amostral PD03 na décima campanha.



Foto 5.3-6: Capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) próxima ao PED02 na quinta campanha de monitoramento.



Foto 5.3-7: Porco-espinho (*Coendou spinosus*).
Foto: Paul F. Colas-rosas, 2017



Foto 5.3-8: Lontra (*Lontra longicaudis*) registrado na margem do rio Jaguari . Foto: Cassimiro da Silva Jr., 2017



Foto 5.3-9: Gambá-de-orelha-branca (*Didelphis albiventris*) próximo ao PED06. Foto: Cassimiro da Silva Jr., 2017



Foto 5.3-10: Gambá-de-orelha-preta (*Didelphis aurita*). Foto: Paul F. Colas-Rosas, 2017



Foto 5.3-11: Indivíduo de *Mazama gouazoubira* registrado, por meio de armadilha fotográfica no ponto PED06, durante a nona campanha de monitoramento



Foto 5.3-12: Indivíduo de *Mazama gouazoubira* registrado na terceira campanha, por meio de armadilha fotográfica, no ponto PED11.



Foto 5.3-13: Indivíduo de *Mazama gouazoubira* registrado, por meio de armadilha fotográfica no ponto PED07, durante a décima campanha de monitoramento



Foto 5.3-14: Indivíduo de *Mazama gouazoubira* registrado na décima campanha, por meio de armadilha fotográfica, no ponto PED15



Foto 5.3-15: Cachorros-domésticos (*Canis familiaris*) registrados na terceira campanha, no ponto PED01



Foto 5.3-16: Espécime de gato-do-mato (*Leopardus guttulus*) registrado na quinta campanha de monitoramento em armadilha fotográfica no ponto PED12



Foto 5.3-17: Gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*) registrado na quinta campanha em armadilha fotográfica no ponto PED12



Foto 5.3-18: Irara (*Eira barbara*) registrada na primeira campanha de monitoramento em armadilha fotográfica no ponto PED16



Foto 5.3-19: Espécime de onça-parda (*Puma concolor*) registrado no ponto PED01, durante a sexta campanha de monitoramento



Foto 5.3-20: Espécime de onça-parda (*Puma concolor*) registrado no ponto PED19, durante a décima campanha de monitoramento



Foto 5.3-21: Espécime de irara (*Eira barbara*) registrado no ponto PED10, durante a sexta campanha de monitoramento



Foto 5.3-22: Irara (*Eira barbara*) registrada em armadilha fotográfica, durante a terceira campanha de amostragem, no ponto PED20.



Foto 5.3-23: Espécime de gato-do-mato-pequeno (*Leopardus guttulus*) registrado no ponto PED12, durante a sexta campanha de monitoramento



Foto 5.3-24: Paca (*Cuniculus paca*) registrado no ponto PED20 por armadilha fotográfica, durante a segunda campanha de monitoramento



Foto 5.3-25: Espécime de tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) registrado no ponto PED12, durante a sexta campanha de monitoramento



Foto 5.3-26: Espécime de tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) registrado no ponto PED17, durante a segunda campanha de monitoramento



Foto 5.3-27: Tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) registrado na terceira campanha em armadilha fotográfica no ponto amostral PED02



Foto 5.3-28: Tatu-de-rabo-mole (*Cabassous tatouay*) registrado na terceira campanha, por meio de armadilha fotográfica, no ponto PED18

5.4 HERPETOFAUNA

São apresentados, a seguir, os resultados obtidos para o monitoramento de anfíbios e de répteis da Barragem de Pedreira.

H. Riqueza e Composição

O registro acumulado para as dez campanhas do monitoramento de fauna é de 23 espécies de anfíbios e 13 de répteis, totalizando 36 espécies para a herpetofauna local das áreas sob influência da Barragem de Pedreira (**Figura 5.4-1**). Nesta décima campanha, foram adicionadas quatro espécies à lista do monitoramento, uma de anfíbio e três de répteis.




FIGURA 5.4-1: Número de espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas) e de répteis (lagartos e serpentes) dentro das famílias registradas no acumulado das campanhas de monitoramento das áreas sob influência da Barragem de Pedreira, município de Pedreira, SP.

Anfíbios

Entre os anfíbios as espécies registradas ao longo deste monitoramento encontram-se distribuídas em sete famílias: Brachycephalidae (1 espécie), Bufonidae (2), Hylidae (8), Leptodactylidae (9), Microhylidae (1), Odontophrynidae (1) e Phyllomedusidae (1) (**Figura 5.4-1**). A lista das espécies encontradas e os pontos onde foram observados os indivíduos estão apresentados, respectivamente, nas **Tabelas 5.4-1 e 5.4-2**, a seguir. A lista das espécies (**Tabela 5.4-1**) também inclui aquelas registradas em estudos realizados durante o licenciamento ambiental do empreendimento.

Durante os trabalhos desta décima campanha, foi feito um novo registro de anfíbio, a perereca-grudenta (*Trachycephalus* sp.), apenas a partir de sua vocalização nas proximidades do ponto PED06. Não foi possível localizá-la e nem mesmo gravá-la para posterior confirmação, mas trata-se, certamente, do que hoje é chamado de *Trachycephalus "vermiculatus"*, um "táxon" substituto para todos os nomes disponíveis para parte dos ex-*Trachycephalus typhonius*, incluindo *Trachycephalus venulosus* (previamente *Phrynohyas venulosa*) e que ocorrem desde o norte da Argentina até ao sul e leste do México (FROST, 2021) e que engloba, certamente, um complexo de espécies (RON *et al.*, 2016). É uma perereca de grande porte que habita as copas das florestas e matas ciliares, onde se reproduzem em cavidades de árvores e raramente, ou nunca, descem ao solo. Vocalizam esporadicamente também durante o dia na estação chuvosa e intensivamente durante tempestades, pois apresentam reprodução explosiva durante as chuvas fortes (COCHRAN, 1955).

TABELA 5.4-1: Lista de anfíbios anuros (Ordem: Anura) registrados nas áreas de influência da Barragem de Pedreira. Também são assinaladas aquelas espécies registradas no EIA realizado para o empreendimento. Legenda. Sensitividade: A = alta, M = média, B = baixa. Endemismo: BR = Brasil, MA = Mata Atlântica, CE = Cerrado.

Família	Espécies	Nome Comum	EIA	Este estudo	DP	Sensitividade	Endemismo	Estado de Conservação	
								SP	BR
Brachycephalidae	<i>Ischnocnema cf. juipoca</i> (Sazima & Cardoso, 1978)	Rãzinha-da-mata	•	•	•	A	MA	LC	NC
Bufonidae	<i>Rhinella diptycha</i> (Cope, 1862)	Sapo-cururu	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	Cururuzinho	•	•	•	M	—	LC	NC
Craugastoridae	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	Rãzinha-da-mata	—	—	•	A	—	LC	NC
Hylidae	<i>Boana albopunctata</i> (Spix, 1824)	Perereca-cabrinha	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Boana faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	Sapo-martelo	•	•	•	M	—	LC	NC
	<i>Boana lundii</i> (Burmeister, 1856)	Perereca	•	•	•	A	CE	LC	NC
	<i>Boana prasina</i> (Burmeister, 1856)	Perereca-verde-de-inverno	•	•	•	A	MA	LC	NC
	<i>Bokermannohyla luctuosa</i> (Pombal & Haddad, 1993)	Perereca	—	—	•	A	MA	LC	NC
	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	Pererequinha	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Dendropsophus nanus</i> (Boulenger, 1889)	Pererequinha	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Dendropsophus sanborni</i> (Schmidt, 1944)	Pererequinha	—	—	•	B	—	LC	NC
	<i>Scinax fuscovarius</i> (Lutz, 1925)	Perereca-de-banheiro	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Trachycephalus</i> sp. ²	Sapo-canoeiro	—	•	•	A	—	—	NC
Leptodactylidae	<i>Adenomera</i> sp. ³	Rãzinha	•	•	•	A	MA	NC	NC
	<i>Leptodactylus furnarius</i> Sazima & Bokermann, 1978	Rãzinha	•	?	—	M	—	LC	NC
	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	Rãzinha	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)	Rã-pimenta	•	•	•	M	—	LC	NC

² Trata-se, provavelmente, de *Trachycephalus "vermiculatus"*, um "táxon" substituído para todos os nomes disponíveis para parte dos ex-*Trachycephalus typhonius*, incluindo *Trachycephalus venulosus* (previamente *Phrynohyas venulosa*) e que ocorrem desde o norte da Argentina até ao sul e leste do México (FROST, 2021) e que inclui provavelmente formas diversas.

³ Identificada como *Adenomera cf. thomei* no EIA e mantida como tal nas versões anteriores deste relatório. No entanto, deve se tratar de outra espécie. Nenhum espécime foi capturado até o momento para a adequada identificação, além de se escutar alguns indivíduos vocalizando esporadicamente.

Família	Espécies	Nome Comum	EIA	Este estudo	DP	Sensitividade	Endemismo	Estado de Conservação	
								SP	BR
	<i>Leptodactylus luctator</i> ⁴ (Steffen, 1815)	Rã-manteiga	•	•	•	M	—	LC	NC
	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	Rãzinha	—	•	•	M	—	LC	NC
	<i>Leptodactylus mystacinus</i> (Burmeister, 1861)	Rãzinha	•	•	•	M	—	LC	NC
	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	Rã-cachorro	•	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Physalaemus nattereri</i> (Steindachner, 1863)	Rã-quatro-olhos	•	•	•	A	—	LC	NC
Microhylidae	<i>Elachistocleis cesarii</i> (Miranda-Ribeiro, 1920)	Rãzinha	•	•	•	M	BR	NC	NC
Phyllomedusidae	<i>Phyllomedusa burmeisteri</i> Boulenger, 1882	Perereca-verde	•	•	•	M	BR	LC	NC
Odontophrynidae	<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1824)	Sapo-de-chifre	•	•	—	A	MA	LC	NC

⁴ Até recentemente, *Leptodactylus latrans*. Após trabalho recente de revisão, *L. luctator* foi revalidado dentro deste complexo (MAGALHÃES *et al.*, 2020).

TABELA 5.4-2: Pontos amostrais onde foram registradas as espécies durante as campanhas de monitoramento de fauna das áreas de influência da Barragem Pedreira. Legenda: Método: PA = procura ativa, V = Vocalização, EO = encontro ocasional, ET = encontro por terceiros.

Espécies	Pontos e locais dos registros									
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
<i>Adenomera sp.</i>	4	11, 18	—	—	—	—	—	—	—	6 ?, 7 ?
<i>Boana albopunctata</i>	9, 12, 16	11, 12	4, 12	J, C	8, 12	—	C	8, 12, J	—	11, C
<i>Boana faber</i>	5, 8, 12, 13, 16, 17, 18	10, 12, 16, 17, 19	1, 4, 12, 16-21	12, 18	2, 8, 12, 16	—	—	1, 8, 16, J, T	13	1, 12, 16, 21, C
<i>Boana lundii</i>	1, 4, 11	1	1, 4, 12	1, 4, 12, J	1, 12, 17	—	1, 4, 12	1, 4, 12, 17	—	11, 12
<i>Boana prasina</i>	1	1, 4, 16	4, 12	1, 4, 12	1, 12	1, 4	1, 4, 12	1, 4	1, 12	1, 4
<i>Dendropsophus minutus</i>	8, 9	1, 8	8	C	1, 5, 8, 12, T	—	C	3, 8, T	—	T, C
<i>Dendropsophus nanus</i>	8, 9	8	8, 12	—	C	—	—	—	—	C
<i>Elachistocleis cesarii</i>	—	—	—	—	7, 15	—	—	—	—	19-21, C
<i>Ischnocnema cf. juipoca</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Leptodactylus furnarius</i>	J	—	—	—	—	—	—	J	—	—
<i>Leptodactylus fuscus</i>	6, 7, 9, 12	—	—	—	6, 7, 12, 13, 14, 15, P, T	—	—	7, 13, 14, 16, 20, J, T	P	7-9, 12, 13, 14, T, C
<i>Leptodactylus luctator</i>	7	8	8, 16	21 ?, J	J	—	—	—	—	C ?
<i>Leptodactylus mystaceus</i>	—	—	—	—	4	—	—	J	—	4
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	6, 7, 9, 15	—	—	—	4, 6, 7, 13, 14, 15, 20, T	—	—	J	—	4, 14, 7-9, 13-5, 19-21
<i>Phyllomedusa burmeisteri</i>	21	—	C	—	12, 21	—	—	21, T	—	—
<i>Physalaemus cuvieri</i>	7, 8, 15	—	4, 8, 12, 17	21, C	12, 13, T	—	—	20, P	—	10-12, P, 14, 19-21, 21
<i>Physalaemus nattereri</i>	17	—	—	—	7, 12, 14, 15, T	—	—	15	—	7-9, 14, T (10-12)
<i>Proceratophrys boiei</i>	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Rhinella diptycha</i>	9, 15, 17	—	—	J	3	—	—	—	—	4, 16, J, P



Espécies	Pontos e locais dos registros									
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
<i>Rhinella ornata</i>	1	1, 16	16, 17, 20, 21	1, 3, 4, 11, 15, 16, 17	2, 10, 16	—	1, 16, 19, 20, J	1, 4, 20, J	1, 12, 16, 19	1, 14, 7-9
<i>Scinax fuscovarius</i>	1, 9, 20	8, 9, 14, 15	15, 20	3	1, 7, 12, 14, T	1, 15, P	1	T	10, 13	4, 14, 18, 20, T (10-2), 19-21
<i>Trachycephalus sp.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

Até este momento, as famílias Leptodactylidae e Hylidae foram aquelas que apresentaram o maior número de espécies, com nove e sete respectivamente, seguidas de Bufonidae com duas espécies. Embora esta campanha tenha ocorrido na estação chuvosa, o número de espécimes e de espécies registrados pode ser considerado relativamente baixo. Como sabemos, o período reprodutivo da maioria das espécies ocorre principalmente na época quente e úmida do ano, que é quando anfíbios e répteis podem ser mais facilmente encontrados.

No acumulado, Leptodactylidae e Hylidae representam 9 (39%) e 8 (35%) espécies, respectivamente, do total de espécies encontradas, seguidas por Bufonidae com duas espécies (9%). Já Brachycephalidae, Microhylidae, Odontophrynidae e Phyllomedusidae aparecem com apenas uma única espécie cada (4%), perfazendo juntas 16% do restante de espécies (**Figura 5.4-2**). Estas proporções aproximam-se do esperado, já que Hylidae é a família mais diversa do país, compreendendo 32% das espécies de ocorrência conhecida para o território nacional, seguida por Leptodactylidae com 15%, Bufonidae com 8%, Brachycephalidae 6%, e Craugastoridae e Microhylidae com 5% cada uma (SEGALLA *et al.*, 2016). As 19 famílias restantes de anfíbios conhecidas para o Brasil contribuem com porcentagens inferiores a 5% cada uma, totalizando 29%.




FIGURA 5.4-2: Contribuição relativa das famílias de anfíbios registradas até o momento para o monitoramento de anfíbios e répteis da Barragem de Pedreira.

Via de regra, as espécies de anfíbios registradas neste estudo seguem os padrões esperados de espécies generalistas. Espécies mais generalistas lidam melhor com alterações estruturais da paisagem, como aquelas decorrentes de fragmentação, como aqueles fragmentos remanescentes estudados na área do monitoramento, enquanto o contrário ocorre com as espécies mais especializadas e que, conseqüentemente, sofrem de modo mais acentuado com a redução e ou com a fragmentação de seus ambientes naturais.

Algumas das formas encontradas durante este monitoramento e em levantamentos pretéritos realizados na área são consideradas endêmicas da Mata Atlântica (ver **Tabela 5.4-1**). Este é o caso de *Adenomera cf. thomei* (Leptodactylidae), *Boana prasina* (Hylidae), *Proceratophrys boiei* (Odontophrynidae) e de *Ischnocnema cf. juipoca*; muito embora esta última com registros para a Serra do Caraça, porção sul da Serra do Espinhaço (CANELAS & BERTOLUCI, 2007). Uma, ainda, é conhecida pelo seu endemismo no Cerrado: *Boana lundii* (Hylidae) (FROST, 2021). Os resultados obtidos para herpetofauna, assim como para os demais grupos de vertebrados (aves e mamíferos) evidenciam, por meio da composição de espécies, a natureza ecotonal da região onde se insere a área de estudo, em razão da ocorrência tanto de táxons típicos da Mata Atlântica quanto alguns táxons do Cerrado.

Todavia, a maioria das espécies encontradas apresenta uma distribuição mais ampla, que abrange formações fora dos domínios da Mata Atlântica ou do Cerrado, como é o caso, por exemplo de *Rhinella ornata*, *R. diptycha* (Bufonidae), *Boana albopunctata*, *Dendropsophus minutus*, *Scinax fuscovarius* (Hylidae), *Leptodactylus luctator* (Leptodactylidae) e *Elachistocleis cesarii* (Microhylidae).

Ainda não foi encontrada nenhuma espécie de anfíbio considerada ameaçada ou em risco de extinção, tanto na lista estadual de espécies ameaçadas, quanto nacional, ou mesmo internacional.

Répteis

Até a presente campanha, apenas 13 espécies de répteis foram registradas e elas se encontram distribuídas dentro de seis famílias, sendo quatro delas de lagartos: Gekkonidae (1), Scincidae⁵ (2), Tropicuridae (1) e Teiidae (1) e serpentes representadas pelas famílias Boidae (1), Colubridae⁶ (6) e Viperidae (1). Nesta campanha, três registros inéditos de répteis

⁵ Seguimos PYRON *et al.* (2013) ao invés das modificações de nomenclatura adotadas por HEDGES & CONN (2012) para a família Scincidae e o gênero *Mabuia*.

⁶ Família Colubridae conforme PYRON *et al.* (2013) e ZHENG & WIENS (2016) a definem.

foram feitos para o monitoramento, o do calango-comum *Tropidurus* sp. que, embora já tenha sido observado na área urbana do município de Pedreira, desta vez foi observado em dois pontos dentro da área do monitoramento, e das serpentes *Erythrolamprus poecilogyrus* e *Thamnodynastes hypoconia*, a primeira observada próxima ao ponto PED13 e a segunda no condomínio Iracema. Os indivíduos do calango-comum foram observados muito rapidamente e não foi possível identifica-los a nível específico visto que ocorrem para a região duas espécies muito parecidas, *Tropidurus torquatus* e *T. itambere*, sendo necessário o manuseio de indivíduos para o exame das bolsas de acarídeos presentes nestas espécies e da observação do tamanho e forma de algumas escamas que são utilizadas como caracteres diagnósticos para esse gênero de lagartos (RODRIGUES, 1987).

Embora muitas outras espécies sejam esperadas e conhecidas para a região, como, por exemplo, a cobra-coral (*Micrurus corallinus*; Elapidae) e a jararaca (*Bothrops jararaca*; Viperidae) e que apesar de comuns, como no caso da jararaca, e registradas em áreas muito próximas e com exemplares de coleções com ocorrência para o município de Pedreira, ainda não foram observadas nos trabalhos de campo deste monitoramento.

A seguir, a lista das espécies de répteis e os pontos onde foram registrados, são apresentados, respectivamente, nas **Tabelas 5.4-3 e 5.4-5**. A lista de espécies também inclui aquelas espécies registradas durante os estudos de licenciamento ambiental do empreendimento.

TABELA 5.4-3: Lista de répteis registrados nas áreas de influência da Barragem de Pedreira durante as dez campanhas de monitoramento de fauna da Barragem Pedreira. A lista também apresenta aquelas espécies registradas no EIA. Legenda: Sensitividade: A = alta, M = média, B = baixa; Endemismo: BR = Brasil, MA = Mata Atlântica, CE = Cerrado.

Família	Espécies	Nome Comum	EIA	Este estudo	DP	Sensitividade	Endemismo	Estado de Conservação	
								SP	BR
Anguidae	<i>Ophiodes cf. fragilis</i> (Raddi, 1820)	Cobra-de-vidro	•	—	—	M	—	LC	NC
Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818) ⁷	Lagartixa-de-parede	•	•	•	B	—	LC	NC
Leiosauridae	<i>Urostrophus vautieri</i> Duméril & Bibron, 1837	Lagartixa	•	—	—	A	—	LC	NC
Polychrotidae	<i>Polychrus acutirostris</i> Spix, 1825	Papa-vento	—	—	•	M	—	LC	NC
Scincidae ⁸	<i>Mabuya</i> ⁹ <i>dorsivittata</i> (Cope, 1862)	Calango-liso	—	•	•	M	—	LC	NC
	<i>Mabuya frenata</i> (Cope, 1862)	Calango-liso	•	•	•	M	—	LC	NC
Teiidae	<i>Salvator merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	Teiú	•	•	•	M	—	LC	NC
Tropiduridae	<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820)	Calango	•	—	•	B	—	LC	NC
	<i>Tropidurus itambere</i> Rodrigues, 1987	Calango	—	?	?	B	—	LC	NC
Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	Cobra-de-duas-cabeças	—	—	•	M	—	LC	NC
	<i>Amphisbaena mertensii</i> Strauch, 1881	Cobra-de-duas-cabeças	—	—	•	B	—	LC	NC
Boidae	<i>Boa constrictor</i> (Linnaeus, 1758)	Jiboia	—	•	—	A	—	LC	NC
Colubridae	<i>Dipsas mikanii</i> (Schlegel, 1837)	Dormideira	—	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1758)	Falsa-coral	•	—	—	A	—	LC	NC
	<i>Erythrolamprus miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-d'água	—	—	•	A	—	LC	NC
	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i> (Wied-Neuwied, 1825)	Cobra-de-capim	—	•	•	B	—	LC	NC
	<i>Erythrolamprus reginae</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-verde	—	—	•	M	—	LC	NC

⁷ Provavelmente originária da África, de onde teria sido trazida ao nosso continente por meio de navios durante o comércio escravagista (VANZOLINI, 1968b; VANZOLINI *et al.*, 1980).

⁸ Seguimos PYRON *et al.* (2013) ao invés das alterações de nomenclatura adotadas por HEDGES & CONN (2012) para o clado Scincidae.

⁹ Seguimos PYRON *et al.* (2013) e RIVERA *et al.* (2020) ao invés das modificações de nomenclatura adotadas por HEDGES & CONN (2012) para o gênero *Mabuya*.

Família	Espécies	Nome Comum	EIA	Este estudo	DP	Sensitividade	Endemismo	Estado de Conservação	
								SP	BR
	<i>Erythrolamprus typhlus</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-verde	—	•	•	A	—	LC	NC
	<i>Oxyrhopus guibeii</i> Romano & Hoge, 1977	Falsa-coral	•	•	•	M	—	LC	NC
	<i>Philodryas olfersii</i> (Lichtenstein, 1823)	Cobra-verde	—	•	—	M	—	LC	NC
	<i>Thamnodynastes hypoconia</i> (Cope, 1860)	Corredeira-do-campo	—	•	—	A	—	LC	NC
Elapidae	<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	Coral	—	—	•	A	—	LC	NC
Viperidae	<i>Bothrops alternatus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	Urutu	—	—	•	M	—	LC	NC
	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied-Neuwied, 1824)	Jararaca	—	—	•	M	—	LC	NC
	<i>Crotalus durissus</i> Linnaeus, 1758	Boicininga	•	•	•	M	—	LC	NC
Chelidae	<i>Hydromedusa cf. tectifera</i> Cope, 1869	Cágado	—	—	•	M	—	LC	NC

TABELA 5.4-4: Lista de répteis registrados nos pontos amostrais das áreas de influência da Barragem de Pedreira durante as dez campanhas deste monitoramento de fauna. Legenda: Método: PA = procura ativa, EO = encontro ocasional, ET = encontro por terceiros.

Espécies	Local de Registros das Campanhas									
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
<i>Boa constrictor</i>	9	—	—	—	—	—	—	—	C	—
<i>Crotalus durissus</i>	1	2, 7, I	—	—	19, I	5	—	—	C	21
<i>Dipsas mikanii</i>	—	—	—	—	10	—	—	—	—	9
<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
<i>Erythrolamprus typhlus</i>	—	—	—	—	I, C	—	—	—	—	—
<i>Hemidactylus mabouia</i>	13	8, 5	4, 8, 13, 14, 15	8	—	13	—	—	—	—
<i>Mabuya dorsivittata</i>	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—
<i>Mabuya frenata</i>	1, 4, 13, 16, 18, 19, 20	—	8, 12, 19	—	—	—	—	—	—	—
<i>Oxyrhopus guibei</i>	9	—	—	—	—	—	—	—	I	21
<i>Philodryas olfersii</i>	E	—	—	—	—	—	—	—	—	E
<i>Salvator merianae</i>	3, S	—	2, 6, 8, 9, I	—	—	—	4	4	—	5, 16, E
<i>Thamnodynastes hypoconia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
<i>Tropidurus sp.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 ?, 11

Ao considerarmos os dados cumulativos do monitoramento, somente serpentes da família Colubridae, com seis espécies registradas, apresentou mais de uma ou duas espécies, representando, portanto, 46% das espécies observadas em campo. Scincidae, com duas espécies, representa 15% das espécies e as demais famílias tiveram o registro de apenas uma espécie, contribuindo, assim, com 8% cada uma (**Figura 5.4-3**).

Com esse conjunto de dados, os números estão muito longe de se aproximarem do esperado para a região de Campinas. Todavia, é esperado que esse número possa ser incrementado com a continuidade do monitoramento na área estudada, já que muitas das espécies de répteis são de difícil encontro na natureza, principalmente devido aos seus hábitos furtivos, ou ainda por se apresentarem raras em muitas localidades.

Podemos destacar que, a nível nacional, se considerarmos as proporções esperadas de espécies, Amphisbaenidae (cobras-de-duas-cabeças ou anfisbenas) aparece como a terceira família mais rica em espécies (9,1%), ficando atrás apenas dos Gymnophthalmidae (11,4%) e dos Colubridae (36,9%) (COSTA & BÉRNILS, 2018). Tanto Amphisbaenidae quanto Gymnophthalmidae ainda não foram registrados para a área do empreendimento, mesmo considerando os dados apresentados no EIA.

Ainda entre os répteis, as serpentes abrangem 50,9% da diversidade de espécies, ficando os lagartos com 43,8%, as tartarugas com 4,5% e os jacarés com 0,8% (COSTA & BÉRNILS, 2018). Aqui, os lagartos estão representados com um número muito restrito de espécies, tendo sido feito apenas o registro de quatro espécies; uma delas exótica, a lagartixa-de-parede, *Hemidactylus mabouia*. Salientamos que este quadro poderá se alterar com a continuidade do monitoramento e um consequente aumento do esforço amostral, principalmente na estação chuvosa.

Até o momento, as espécies registradas de répteis são consideradas generalistas quanto à utilização do habitat e a maioria delas é encontrada também em outros biomas. Este é o caso do teiú (*Salvator merianae*) e da lagartixa (*Mabuya frenata*), por exemplo. Mesmo aquelas espécies registradas em outros estudos realizados na área, apresentam uma ampla distribuição, não havendo, ainda, o registro de espécies endêmicas nem para a Mata Atlântica nem para o Cerrado. Mas como mencionado, um número maior de espécies é esperado para a região, já que a maioria das serpentes e boa parte dos lagartos são de difícil registro e dependem de um maior esforço amostral para o seu registro.




FIGURA 5.4-3: Contribuição relativa das famílias de répteis registradas durante as campanhas de monitoramento da herpetofauna nos pontos amostrais da Barragem Pedreira. Lagartos (famílias Gekkonidae, Scincidae e Teiidae) e serpentes (Boidae, Colubridae¹⁰ e Viperidae).

Algumas espécies não são tão exigentes quanto às áreas com cobertura vegetal nativa, principalmente alguns lagartos, como o teiú (*Salvator merianae*: Teiidae) que habita ambientes mais abertos (RIBEIRO JR. & AMARAL, 2016). Outras espécies, no entanto, estão mais associadas a essas formações, e este é o caso de muitas espécies esperadas para a região, registradas em outras localidades próximas.

Próximo às residências, é possível encontrar alguns répteis bem adaptados a ambientes antrópicos, como a lagartixa-de-parede (*Hemidactylus mabouia*), espécie provavelmente introduzida (VANZOLINI, 1968a, 1968b), e que também pode ser encontrada em cupinzeiros e troncos caídos no chão, e o teiú que também pode ser observado na área urbana do município de Pedreira.

Ressalta-se que nenhuma das espécies de répteis encontradas até o momento é considerada ameaçada ou em risco de extinção.

I. Suficiência Amostral

¹⁰ Até o momento, representada apenas pela subfamília Dipsadinae.

Uma compilação das informações obtidas para as dez campanhas do monitoramento, nos leva a um total de 510 registros de espécies¹¹, representados por 36 espécies com ocorrência na área da construção da barragem e proximidades. A **Tabela 5.4-5** apresenta estes números para cada um dos dois grandes grupos estudados durante os dias de amostragem em cada uma das campanhas. Já a **Figura 5.4-4** apresenta a relação entre o número total de registros durante esses monitoramentos, comparando os anfíbios (Amphibia) e os lagartos e serpentes (Reptilia) com relação à metodologia aplicada.

¹¹ Este número difere do número de indivíduos observados já que boa parte das vezes se refere a estimativas de indivíduos apenas escutados (vocalizações, no caso dos anfíbios) sem ser possível a contagem do número exato de indivíduos.

TABELA 5.4-5: Número de registros e o número de espécies observadas para cada grupo estudado durante as dez campanhas do monitoramento.

Grupo	1ª. Campanha		2ª. Campanha		3ª. Campanha		4ª. Campanha		5ª. Campanha	
	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies
Anfíbios	54	19	27	9	55	11	35	10	90	18
Répteis	16	7	7	2	15	3	1	1	5	3
TOTAL	70	26	34	11	70	14	36	11	95	21

Grupo	6ª. Campanha		7ª. Campanha		8ª. Campanha		9ª. Campanha		10ª. Campanha	
	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies	Nº de registros	Nº de espécies
Anfíbios	11	2	23	6	58	14	16	5	71	18
Répteis	2	2	3	2	1	1	4	4	16	8
TOTAL	13	4	26	8	59	15	20	9	87	26




FIGURA 5.4-4: Relação entre o número total de registros durante todo o monitoramento por metodologia empregada e grupo estudado. Legenda: PA = Procura Ativa; EO = Encontro Ocasional; CT = Armadilha Fotográfica (“Camera Trap”) e ET = Encontro por Terceiros

A seguir é apresentado um gráfico da curva de rarefação de espécies (**Figura 5.4-5**) com base nos registros ao longo das campanhas deste monitoramento, com duração de cerca de 10 dias de amostragem cada uma. Para esta análise dos dados foi utilizado o programa EstimateS v.9.1.0 (COLWELL, 2013) com 1.000 randomizações da matriz original com as espécies registradas na área do monitoramento ao longo das sete campanhas (colunas). A curva demonstra uma leve tendência a estabilização ao longo das campanhas, mas a sua inclinação ainda indica que novos registros podem ser feitos, o que é o esperado.

Essa tendência à estabilização, ainda que tenha havido quatro adições à lista nesta décima campanha, pode se dever ao fato de nenhuma espécie ter sido acrescentada durante a segunda, terceira, quarta, sexta, oitava e nona campanhas do levantamento, visto que boa parte destas amostragens ocorreram em períodos mais secos e frios, característicos destes períodos, se comparado ao período das chuvas, que é úmido e quente, das campanhas de janeiro de 2019 (1ª), de dezembro de 2020 (5ª), dezembro de 2021 (8ª) ou setembro/outubro de 2022 (10ª).

A sétima e nona campanha ocorreram em período seco e frio do ano, quando nenhuma chuva foi observada durante os dias de amostragem. Mesmo a terceira campanha, onde o período chuvoso ainda não havia iniciado, encontrava-se seco a maior parte do tempo amostral, com chuvas apenas em um dia de amostragem. A quarta campanha foi predominantemente seca, e durante os dias de amostragem, não foi registrado nenhum dia de chuva. Já a quinta campanha, assim como a primeira, ocorreu na estação chuvosa. A oitava campanha, embora tenha sido realizada durante a estação chuvosa, só teve amostragens que coincidiram com chuvas em apenas um dos dias reservados para a Procura Ativa. Ainda que outras duas campanhas tenham sido realizadas em períodos chuvosos, conforme mencionado, espécies de comportamento mais furtivo não foram encontradas, como, por exemplo, lagartos da família Gymnophthalmidae, espécies de anfisbenídeos (cobras-de-duas-cabeças) e serpentes fossoriais, que muitas vezes podem ser observadas logo após chuvas intensas.





FIGURA 5.4-5: Curva de rarefação com base na herpetofauna ao longo das dez campanhas de monitoramento dos pontos amostrais da área de influência da Barragem Pedreira.

De acordo com os resultados representados na **Figura 5.4-5**, o número de espécies para a área de estudo deve ser um pouco maior, visto que para os dois grupos estudados muitas espécies possuem comportamentos e hábitos recônditos e, portanto, de difícil registro, bem como daquelas que são raras e, assim, de difícil encontro na natureza, como muitas espécies de serpentes. No entanto, como a região encontra-se bastante alterada, muitas das espécies


que ocorriam na área ou encontram-se com as populações bastante reduzidas ou mesmo foram extintas localmente.

J. Frequência Relativa


A seguir, são apresentados os resultados relativos à frequência em que as espécies de anfíbios e de répteis foram registradas durante cada uma das campanhas realizadas até o momento neste monitoramento de fauna. Na **Figura 5.4-6** são representadas as espécies com maior frequência de registro durante o esforço amostral dedicado à Procura Ativa em cada uma das campanhas.



5ª. campanha




6ª. campanha




7ª. campanha



8ª. campanha



9ª. campanha



10ª. campanha




Figura 5.4-6 Lista das espécies que apresentaram maior frequência de registros utilizando-se a procura ativa nos pontos amostrais para cada uma das campanhas de monitoramento da Barragem Pedreira.

O sapo-ferreiro (Hylidae: *Boana faber*) foi a espécie com mais registros nas três primeiras campanhas deste trabalho, com 14, 8 e 14 registros, respectivamente. Já na quarta campanha, ela cai para a quarta posição e o sapo-cururu (Bufonidae: *Rhinella ornata*) aparece com mais frequência nos registros, com 10 registros na quarta campanha. Na quinta campanha, *Leptodactylus fuscus* (Leptodactylidae) foi quem teve mais registros. Já a sexta campanha apresentou pouquíssimos registros, tanto com relação à riqueza quanto abundância; a única espécie com um número maior de indivíduos observados foi a perereca-de-inverno *Boana prasina* (Hylidae, **Fotos 61-2**) observada no riacho que passa pelos pontos PED01 e PED04. Na sétima campanha, *Rhinella ornata* (Bufonidae), *Boana prasina* e *Boana lundii* (Hylidae) foram as espécies com mais registros observados. A oitava campanha teve a rãzinha *Leptodactylus fuscus* (Leptodactylidae) e o sapo-ferreiro *Boana faber* apresentando a maior quantidade de registros. A nona, realizada em período frio e seco, teve o cururuzinho (Bufonidae: *Rhinella ornata*) a espécie mais comum, seguido da perereca-de-inverno (Hylidae: *Boana prasina*). Agora, na décima campanha, realizada no início do período chuvoso, a espécie com mais registro foi *Scinax fuscovarius*, seguida de *Boana faber* e *Salvator merianae*.

Para a primeira campanha, *Boana faber* é seguida depois de números mais baixos de registros de espécies também comuns que normalmente podem ser encontradas abundantemente no período chuvoso como *Boana albopunctata*, *Dendropsophus minutus*, *D. nanus*, *Leptodactylus fuscus*, *Scinax fuscovarius* e *Physalaemus cuvieri*. Assim, espécies que geralmente são encontradas em grande quantidade na estação reprodutiva foram pontualmente registradas. Embora a primeira campanha tenha sido realizada no período chuvoso, o ambiente encontrava-se relativamente seco durante os dias de amostragem que coincidiu com dias de estiagem. Algo similar aconteceu também na oitava campanha, realizada na estação chuvosa, quando tivemos maiores registros de *L. fuscus* e *B. faber*, mas que também os dias de amostragem coincidiram com longos períodos de estiagem, sem chuvas durante quase toda a campanha.

Nota-se uma evidente diminuição no número de espécies e na abundância de indivíduos encontrados nas campanhas, claramente relacionadas às estações do ano, ou seja, à estação chuvosa, quente e úmida, da primeira e quinta e décima campanha, ao período seco e frio da segunda campanha, quando naturalmente a grande maioria destes organismos encontram-se fora do período reprodutivo; da terceira campanha com a aproximação do período chuvoso, mas que ainda encontrava-se bastante seco, embora menos frio que a segunda campanha;

da quarta, sexta, sétima e nona campanhas ocorridas em período bastante seco, sem nenhum registro de chuva durante os dias de amostragem e com alguns dias com noites muito frias.

K. Similaridade

Como observado, o número de registros e de espécies tem variado bastante entre os pontos de amostragem. A **Figura 5.4-7** ilustra a contribuição relativa do número de registros com relação aos pontos amostrados somados para as dez campanhas realizadas para este monitoramento, evidenciando uma maior quantidade de registros para os pontos 1, 4, 8, 12 e 16, com boa parte destes pontos situados relativamente próximos a corpos d'água, o que, por si só, explicaria o maior encontro de espécies nestas áreas.




FIGURA 5.4-7: Contribuição relativa do número de registros em relação aos pontos amostrados durante as campanhas do monitoramento das áreas de influência da Barragem Pedreira.

Para avaliar a similaridade entre a herpetofauna das áreas amostradas foi realizada uma análise de agrupamento hierárquico. Para tanto, a análise de similaridade foi realizada com a implementação do índice de similaridade de Bray-Curtis (BRAY & CURTIS, 1957), utilizando-se o método de agrupamento hierárquico “UPGMA” (“Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages”). A análise foi conduzida através do programa Past, versão 3.14 (HAMMER *et al.*, 2001).

Esta análise foi feita considerando a abundância relativa das espécies registradas. Estimativas de abundância foram realizadas empregando-se as seguintes classes de abundância para aquelas espécies que apresentam atividade de vocalização, sendo: (classe

1) 1-2 indivíduos, (2) 3-5 indivíduos, (3) 6-10 indivíduos, (4) 11-20 indivíduos, (5) 21-50 indivíduos e (6) mais do que 50 indivíduos, seguindo-se metodologia utilizada por outros autores (BERTOLUCI, 1998; BERTOLUCI & RODRIGUES, 2002a, 2002b). No entanto, apenas algumas poucas espécies apresentaram estimativas maiores que a classe 1 ou 2, como por exemplo, *Dendropsophus nanus* que no ponto 8, na primeira campanha, poderia ser estimado na classe 4 e *Dendropsophus minutus*, também no ponto 8, e *Boana albopunctata* no ponto 12 que tiveram os seus números estimados na classe 3. Na segunda campanha, apenas *Boana prasina* (Pontos 1, 4 e 16) e *Rhinella ornata* (Ponto 1), tiveram a classe estimada maiores que 1. Já na terceira campanha, maiores que 1, apenas *Boana albopunctata* (Ponto 12), *B. faber* (Pontos 19 e 20; chovia neste dia da amostragem), *B. lundii* (Ponto 4), *B. prasina* (Ponto 4 e 12), *Dendropsophus nanus* (Ponto 12), *Physalaemus cuvieri* (Ponto 12) e *Rhinella ornata* (Pontos 16, 17 e 20; chovia). Para a quarta campanha, bastante seca e com dias muito frios, apenas *Boana prasina*, *Dendropsophus minutus*, *Physalaemus cuvieri* e *Rhinella ornata* tiveram números estimados acima da classe 1; todas espécies que geralmente ocorrem normalmente em uma maior abundância próximo aos ambientes aquáticos. Já para a quinta campanha, realizada em período chuvoso, as quantidades estimadas acima da classe 1, foram observadas para várias espécies: *Boana albopunctata*, *B. faber*, *B. prasina*, *Dendropsophus minutus*, *D. nanus*, *Leptodactylus fuscus*, *L. mystaceus*, *L. mystacinus*, *Phyllomedusa burmeisteri*, *Physalaemus cuvieri*, *P. nattereri*, *S. fuscovarius*; todas espécies comuns que utilizam a estação chuvosa para a sua reprodução. Na sexta campanha, e conforme já assinalado, apenas a perereca-de-inverno *Boana prasina* (Hylidae) pode ser observada em atividade reprodutiva e em maior número, tendo sido estimada na classe 4 em um dos pontos onde foi observada vocalizando. Para a sétima campanha, também ocorrida no inverno, *Boana prasina*, *Boana lundii* e *Rhinella ornata* tiveram as suas estimativas em classes mais abundantes visto que são espécies com atividade reprodutiva também na estação seca e fria. A oitava campanha, realizada no verão, também teve várias espécies estimadas acima da classe 1, foram elas *Boana albopunctata*, *B. faber*, *B. lundii*, *B. prasina*, *Dendropsophus minutus* (Hylidae), *Phyllomedusa burmeisteri* (Phyllomedusidae), *Leptodactylus fuscus*, *L. mystacinus*, *Physalaemus cuvieri* (Leptodactylidae) e *Rhinella ornata* (Bufonidae). Todas espécies comuns facilmente encontradas na estação chuvosa. Finalmente, para a nona campanha, apenas o cururuzinho (Bufonidae: *Rhinella ornata*) e a perereca-de-inverno (Hylidae: *Boana prasina*) tiveram seus números estimados acima da classe 1, ambas espécies comuns no inverno. Já a décima campanha, ocorrida na estação chuvosa, teve *Boana lundii*, *B. prasina*, *Scinax fuscovarius* (Hylidae), *Physalaemus nattereri* (Leptodactylidae) e *Rhinella ornata* (Bufonidae) com abundância relativa mais elevadas em alguns pontos.

Para a análise dos dados, foram utilizados como terminais os 21 pontos amostrados localizados na área do empreendimento somando-se os dados de todas as campanhas realizadas até o momento, e, também analisados separadamente. Estes pontos foram agrupados de três em três conforme a área que ocupavam e de acordo com a proximidade que apresentavam entre si, da seguinte forma: Pontos de 1 a 3 [área de mata, próxima ao eixo da Barragem Pedreira, mais ao norte (N) na área de estudo], Ponto 4 ao 6 (mesmo fragmento que o anterior), Ponto 7 ao 9 (pastagem, com reflorestamento iniciado pouco antes da segunda campanha), Ponto 10 ao 12 [fragmento na margem direita do rio Jaguari, mais central (C) à região de estudo], Ponto 13 ao Ponto 15 (pastagem, com reflorestamento iniciado pouco antes da segunda campanha), Ponto 16 ao 18 [remanescente situado próximo à cabeceira do futuro reservatório, ao sul (S) da região, no condomínio Iracema] e Ponto 19 ao Ponto 21 (mesmo fragmento que o anterior).

A **Figura 5.4-8** ilustra os resultados de similaridade encontrados somando-se as informações obtidas durante a realização das dez campanhas do monitoramento. Assim, é observado uma maior proximidade entre aquelas áreas abertas de pastagem/reflorestamento (refl.) que poderia ser explicado pela presença de espécies de áreas abertas e de uma maior similaridade entre as áreas florestadas por motivos opostos ao primeiro caso. Refletindo-se, assim, o esperado quanto à proximidade das áreas e de uma certa homogeneidade desses ambientes. Assim, as áreas de mata ao sul encontram-se relacionadas, do mesmo modo, as áreas de mata ao norte, incluindo a área de mata mais central. Os dois ambientes de pastagem/reflorestamento, conforme o esperado, também se encontram associados, conforme é apontado pela análise; ver figura a seguir.




FIGURA 5.4-8: Dendrograma da análise de agrupamento entre os pontos amostrados combinando-se os dados das dez campanhas de monitoramento da herpetofauna nas áreas de influência da Barragem de Pedreira, município de Pedreira, SP.

Uma análise de similaridade comparando-se as campanhas de monitoramento realizadas até o momento também foi executada. Esta análise de similaridade corroborou com o padrão esperado e facilmente observado nos trabalhos de campo. Há uma grande similaridade entre aquelas campanhas que coincidiram com os momentos secos e frios (inverno) do ano; as sete com poucos registros de espécies, tanto quantitativamente quanto qualitativamente e, também conforme o esperado, uma maior similaridade entre as três campanhas que aconteceram na estação chuvosa. Veja o resultado desta análise na **Figura 5.4-9**. Assim, ao analisarmos a similaridade entre as campanhas, observamos que aquelas realizadas na estação seca e fria (2^a., 4^a., 6^a., 7^a. e 9^a.) encontram-se mais intimamente relacionadas entre si, o mesmo acontecendo entre as três realizadas na estação chuvosa (1^a., 5^a., 8^a. e 10^a.). A 3^a. campanha que ocorreu num momento de transição, final da estação seca e início da chuvosa apareceu mais relacionada àquelas de inverno; ou seja, seca e fria.





FIGURA 5.4-9: Dendrograma da análise de agrupamento entre as campanhas de monitoramento da herpetofauna nas áreas de influência da Barragem de Pedreira, município de Pedreira, SP.

Até o momento não há evidências da influência da implantação do empreendimento, como aqueles distúrbios esperados em consequência da supressão de vegetação que, até agora, ocorreu apenas no fragmento próximo dos pontos PED01 a PED06, perto da área da construção da barragem e no fragmento próximo ao ponto PED12, e daqueles decorrentes do início do reflorestamento das áreas de APP do futuro reservatório (PED07 a 09 e PED13 a 15).

L. Características Ecológicas

Baseado em informações disponíveis na literatura e no conhecimento dos profissionais responsáveis pelo presente estudo foi realizada uma classificação das espécies de anfíbios e de répteis, registrados durante as campanhas do monitoramento, quanto aos níveis de dependência a ambientes florestais e também quanto a categorias de vulnerabilidade a alterações ambientais. A seguir, os resultados dessas análises são apresentados (**Figura 5.4-11**).

A) Dependência de Ambientes Florestais



B) Vulnerabilidade a Alterações Ambientais




FIGURA 5.4-10: Distribuição das espécies registradas durante as campanhas nos pontos de amostragem das áreas de influência da Barragem de Pedreira em relação aos níveis de dependência a ambientes florestais (esquerda) e quanto à vulnerabilidade a alterações ambientais (direita).

Conforme podemos observar na **Figura 5.4-10** as comunidades de anfíbios e de répteis registradas durante as campanhas do monitoramento da Barragem Pedreira são formadas por uma mistura de espécies que apresentam maior dependência de ambientes florestais (dependentes e semidependentes; 67%) e espécies que não apresentam dependência desses ambientes (independentes; 33%). Em ambientes mais bem conservados verifica-se uma forte dominância de espécies típicas de ambientes florestais, como naqueles fragmentos de mata dos pontos de PED01 a PED06, de PED10 a PED12 e do PED16 ao PED21.

Quanto à vulnerabilidade a alterações ambientais (**Figura 5.4-10**), algumas das espécies registradas podem ser consideradas de grande resiliência (baixa vulnerabilidade). Este grupo representa 28% do total das espécies já registradas neste monitoramento. Entre elas, predominam espécies de ampla distribuição e que não possuem grande dependência de ambientes florestais, como, por exemplo, a rã-assobiadora (*Leptodactylidae*: *Leptodactylus fuscus*) e a rã-cachorro (*Leptodactylidae*: *Physalaemus cuvieri*). Neste grupo também se encontra a espécie introduzida de lagartixa, *Hemidactylus mabouia* (*Gekkonidae*), que além de exibir baixa vulnerabilidade também pode se beneficiar associando-se ao homem. Por outro lado, 28% delas podem ser consideradas mais vulneráveis às alterações ambientais, como aquelas espécies associadas aos ambientes de mata e a corpos d'água mais preservados.

M. Espécies Prioritárias

Anfíbios normalmente são considerados excelentes indicadores da qualidade do ambiente, visto apresentarem certas características fisiológicas que os tornam sensíveis a mudanças do meio, como pele permeável e respiração cutânea; um ciclo de vida complexo, envolvendo fase larvar; com uma ampla diversidade de habitats utilizados graças às diferentes estratégias reprodutivas que possuem (HADDAD & PRADO, 2005; POMBAL & HADDAD, 2008). Esses animais apresentam sensibilidade elevada a mudanças físico-químicas da água e várias espécies também são sensíveis a alterações na estrutura da vegetação às margens dos corpos d'água onde geralmente se utilizam para a sua reprodução (DUELLMAN & TRUEB, 1994; VERDADE *et al.*, 2010).

Algumas espécies mais especializadas, por se reproduzirem tanto em meio aquático quanto terrestre são indicadores ainda mais finos da qualidade do ambiente. A abundância de algumas espécies observadas em alguns dos pontos estudados, indica que o ambiente destes pontos permanece adequado a maioria destas.

Por outro lado, os répteis, por apresentarem pele impermeável são indicadores menos sensíveis, mas, ainda assim, algumas espécies não podem viver longe de seus habitats, do folhoso e da sombra das árvores da mata (POUGH *et al.*, 2003; POUGH *et al.*, 1992). É o caso, certamente, da maioria das espécies de serpentes já registradas para a região.

Conforme já mencionado, poucas espécies encontradas até o momento, incluindo-se também os dados do EIA (THEMAG, 2015), são consideradas endêmicas para a Mata Atlântica; são elas: *Boana prasina* (Hylidae), *Adenomera cf. thomei* (Leptodactylidae) e *Proceratophrys boiei* (Odontophrynidae). Uma espécie, *Boana lundii*, é considerada endêmica do Cerrado, e é normalmente encontrada associada à vegetação arbustiva ao longo de riachos, onde se reproduzem.

Até o momento não foram encontradas espécies de anfíbios ou de répteis consideradas raras ou ameaçadas de extinção na área da Barragem Pedreira.

N. Registro Fotográfico

Neste item são apresentados registros fotográficos de espécimes de répteis e anfíbios obtidos durante a amostragem por procura ativa.



Foto 5.4 1. Girinos de sapo, provavelmente de *Rhinella ornata* (Bufonidae), riacho do ponto 1, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 4ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 2. Cururuzinho (Bufonidae: *Rhinella ornata*), próximo ao ponto 2, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 3. Sapo-cururu (Bufonidae: *Rhinella diptycha*) em buraco de cupinzeiro, ponto 15, Pedreira, SP, 2ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.




Foto 5.4 4. Perereca-cabrinha vocalizando em meio ao taboal (Hylidae: *Boana albopunctata*), ponto 12, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 5. Sapo-ferreiro (*Boana faber*: Hylidae), ponto 2, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 6. A perereca *Boana lundii* (Hylidae) no riacho próximo ao ponto 4, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 7ª. campanha, 24/08/21. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 7. Girino de hilídeo, possivelmente de *Boana prasina* (Hylidae), riacho, próximo ao ponto 4, Pedreira, SP, 4ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 8. A perereca-de-inverno (Hylidae: *Boana prasina*), vocalizando no riacho próximo ao ponto 4, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 6ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 9. A pererequinha *Dendropsophus minutus* (Hylidae) vocalizando em poça temporária próxima ao ponto 12, Pedreira, SP, 5ª. Campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 10. A perereca-de-banheiro (Hylidae: *Scinax fuscovarius*) às margens do riacho próximo ao ponto 1, Pedreira, SP, 7ª. campanha, 23/08/21. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 11. Rãzinha-assobiadora (Leptodactylidae: *Leptodactylus fuscus*) em poça temporária próxima ao ponto 13, Barragem Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 12. Rãzinha (Leptodactylidae: *Leptodactylus mystacinus*), ponto 4, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 13. Rãzinha (Leptodactylidae: *Leptodactylus mystaceus*), ponto 4, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 14. A rã-cachorro (Leptodactylidae: *Physalaemus cuvieri*), nas proximidades do ponto 21, Pedreira, SP, 4ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 15. A rã-quatro-olhos (Leptodactylidae: *Physalaemus nattereri*) em poça temporária próxima ao ponto 12, Pedreira, SP, 5ª. Campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 16. Ninho de espuma em poça-temporária da rã-quatro-olhos (Leptodactylidae: *Physalaemus nattereri*), Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 17. Perereca-verde (Phyllomedusidae: *Phyllomedusa burmeisteri*), próxima do ponto 21, Pedreira, SP, 5ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 18. A lagartixa-de-parede (Gekkonidae: *Hemidactylus mabouia*) em cupinzeiro, ponto 14, Pedreira, SP. 3ª. campanha Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 19. Calango-liso (Scincidae: *Mabuya frenata*), ponto 8, Barragem Pedreira, município de Pedreira, SP, 3ª. campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 20. Calango-liso (Scincidae: *Mabuya dorsivittata*) em meio às gramíneas secas no ponto 14, Pedreira, SP, 7ª. campanha. 22/08/21. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 21. Calango-comum em uma fresta nos muros da cidade (*Tropiduridae: Tropidurus torquatus*), município de Pedreira, SP, 9ª. Campanha. 02/06/22. Autor: J. Cassimiro.




Foto 5.4 22. A dormideira (Colubridae: Dipsadinae: *Dipsas mikanii*), ponto 10, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. Campanha. Autor: J. Cassimiro



Foto 5.4 23. Cobra-verde (Colubridae: Dipsadinae: *Erythrolamprus typhlus*), canteiro de obras, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª, Campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 24. A falsa-coral (Colubridae: Dipsadinae: *Oxyrhopus guibeï*), próximo do ponto 9, Pedreira, 1ª, campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 25. Juvenil de cascavel (Viperidae: *Crotalus durissus*) próximo ao ponto 5, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 6ª. Campanha. Autor: J. Cassimiro.



Foto 5.4 26. Cascavel (Viperidae: *Crotalus durissus*) próxima ao ponto 19, Barragem Pedreira, Pedreira, SP, 5ª. Campanha. Autor: J. Cassimiro.

6. CONCLUSÕES

Conforme mencionado, o Subprograma de Monitoramento de Fauna das áreas sob influência da Barragem Pedreira foi concebido com o objetivo de avaliar: (1) os impactos sobre a fauna de vertebrados terrestres, decorrentes da supressão de vegetação, afugentamento de fauna e soltura de animais resgatados (durante a supressão de vegetação); e (2) a efetividade, para a fauna, da restauração florestal das APPs do futuro reservatório.

Nesse sentido foi definido um desenho amostral (malha de amostragem, métodos de amostragem e esforço amostral) capaz de gerar dados em quantidade e qualidade suficientes para que os objetivos deste Subprograma possam ser atingidos.

As dez primeiras campanhas do Subprograma de Monitoramento de Fauna da Barragem Pedreira foram realizadas com sucesso, mantendo-se a periodicidade quadrimestral, exceto pelo maior período que separa a terceira e a quarta campanha devido ao problema de saúde pública causado pela pandemia de coronavírus, quando os trabalhos de campo foram suspensos.

Durante cada campanha foram realizados 10 dias efetivos de amostragem das áreas monitoradas. Assim, foram gerados cerca de 172.800 minutos de gravações por meio do Monitoramento Acústico Passivo (MAP); 36.000 câmeras.hora, por meio de *cameras-trap*; 14.400 parcelas.hora, por meio de parcelas de areia (ou camas de pegada); e aproximadamente 48.000 minutos por meio de procura ativa.

Destaca-se a contribuição do MAP na geração de dados para a caracterização da comunidade animal. Por meio desse método foi possível gerar uma quantidade de informações muito superior ao gerado pelos métodos tradicionais. Por outro lado, as informações geradas por meio do MAP permitiram a realização de análises integrativas, gerando informações sobre padrões espaciais (comparações entre remanescentes e entre distâncias monitoradas) e temporais (entre campanhas) de toda a comunidade animal presente nas área sob influência do empreendimento.

De uma maneira geral, os resultados obtidos durante as dez campanhas de monitoramento de fauna confirmam e reforçam o diagnóstico apresentado no EIA deste empreendimento, assim como nos estudos que sucederam o EIA (ex. levantamentos realizados na área para a elaboração do Laudo de Fauna que instruiu a solicitação da ASV). A comunidade animal

(aves, mamíferos de médio/grande porte, répteis e anfíbios) presente na área de estudo é característica de ambientes perturbados do interior do Estado de São Paulo. São espécies típicas de fragmentos da Floresta Estacional Semidecidual e de ambientes sob maior pressão antrópica, que se caracterizam pela maior resiliência e capacidade de dispersão por ambientes antrópicos.

Ressalta-se que, durante as dez primeiras campanhas de amostragem, foram obtidos registros de espécies que ainda não haviam sido registradas na área. Entre as espécies registradas merecem destaque o registro: (1) da juriri-vermelha (*Geotrygon violacea* - considerada "em perigo" no Estado de São Paulo), do chocão-barrado (*Hypoedaleus guttatus*) e do matracão (*Batara cinerea*) aves que ocorrem em baixa abundância e apresenta comportamento discreto, tendo sido registradas apenas por meio do MAP; e (2) do gato-domato (*Leopardus guttulus*), espécie de felino de pequeno porte, que também se apresenta em baixa abundância, considerada ameaçada no Estado de São Paulo e vulnerável em âmbito nacional, registrada apenas por meio da *camera-trap*.

As análises de suficiência amostral indicam que a base de dados gerada até o momento é representativa da comunidade animal das áreas sob influência da Barragem Pedreira. Entre os grupos amostrados, as aves parecem ser aquele cujas curvas de suficiência amostral estão mais próximas da assíntota. Tal fato deve-se, principalmente, à grande quantidade de dados geradas por meio do MAP. De qualquer modo, para todos os grupos ainda é esperado o registro de novas espécies.

Os resultados obtidos durante as dez primeiras campanhas de monitoramento revelam, não apenas padrões espaciais de variação na comunidade, mas também padrões temporais, e permitem fazer algumas considerações em relação às hipóteses propostas para teste:

Hipótese 1 - A supressão de vegetação resultará em mudanças negativas na composição e estrutura da comunidade animal

Verificou-se, por meio das análises de paisagens sonoras e da avifauna, sinais dos impactos da supressão de cobertura vegetal ocorrida para a implantação do Eixo da Barragem Pedreira.

Embora nas análises de percentual de uso do espaço acústico não tenham sido registradas diferenças significativas entre os dois remanescentes estudados (próximo ao eixo, que sofreu supressão; e da cabeceira do futuro reservatório, que não sofreu

supressão) nas análises de composição dos *soundscales* a diferença foi significativa (ver **item 5.1**).

Em relação ao percentual de uso foram registradas importantes diferenças entre as campanhas de amostragem. Os padrões de variação entre campanhas observados nos dois remanescentes, entretanto, são bem distintos. No remanescente próximo ao eixo (que sofreu supressão) verifica-se um maior distanciamento da primeira para a segunda campanha, do que desta última para a terceira. Diferentemente, no remanescente localizado na cabeceira do futuro reservatório registrou-se um distanciamento maior da terceira e quarta campanhas em relação às duas primeiras, enquanto entre estas a diferença é relativamente pequena. Na quinta campanha o percentual de uso do espaço acústico no remanescente próximo da cabeceira do futuro reservatório se destaca dos demais. Os resultados obtidos para esse remanescente parece responder mais às variações climáticas entre campanhas. Na sexta campanha, como consequência do início da estação seca (menor umidade e temperatura) verificou-se uma queda acentuada da atividade acústica em ambos os remanescentes estudados, voltando a crescer na sétima e oitava campanha. Na nona campanha os valores voltam a cair, tendendo a subir, novamente, na décima campanha.

As diferenças entre os padrões de variação da atividade acústica (entre campanhas) observadas entre os dois remanescentes monitorados podem estar relacionados à atividade de supressão de vegetação. A partir da segunda campanha, realizada durante a atividade de supressão de vegetação, verifica-se um salto no percentual de uso do espaço acústico no remanescente impactado. Isso pode estar ligado ao efeito do afugentamento de espécies, que aumenta, provisoriamente, a abundância das espécies (*crowding effect*). É importante notar que as duas primeiras campanhas foram realizadas entre o final do período chuvoso e o período seco, quando não é esperada grande variação na atividade sonora, como observado no remanescente que não sofreu supressão. Entretanto, para a terceira e quarta campanhas, realizadas no final do período de seca, era esperado um incremento muito maior na atividade acústica, em razão deste ser o período pré-reprodutivo para muitas das espécies animais. Isso é verificado no fragmento que não sofreu supressão, com o percentual de uso do espaço acústico saltando de 4-6% para 17-19%. Por outro lado, o

incremento do uso no remanescente onde houve supressão é bem menos expressivo (apesar de significativo), ou seja de 7-11% para 11-14% (ver **item 5.1**).

Em síntese, as diferenças observadas entre os dois remanescentes ao longo das dez campanhas de monitoramento (tanto em relação ao percentual de uso do espaço acústico, como em relação à composição da paisagem sonora e da comunidade de aves) são consistentes com os efeitos esperados da supressão de cobertura vegetal nativa. Nesse sentido, as predições relacionadas à Hipótese H1 são corroboradas.

Hipótese 2: A soltura de espécimes capturados nas áreas objeto de supressão resultará em mudanças negativas na composição e estrutura da comunidade animal das áreas de soltura.

Até o momento não foi possível identificar impactos decorrentes da soltura dos espécimes animais resgatados durante as atividades de supressão de vegetação. A soltura é realizada tanto em remanescentes que já sofreram o impacto da supressão de vegetação como em remanescentes que ainda não foram impactados. A falta de sinais perceptíveis da soltura deve-se principalmente a dois fatores: (1) o número relativamente pequeno de espécimes capturados e soltos; e (2) o forte efeito da sazonalidade e, principalmente, da supressão de vegetação sobre essas comunidades; tornando difícil isolar os eventuais efeitos da soltura.

Hipótese 3: A restauração florestal que está sendo implementada resultará em mudanças positivas na composição e estrutura da comunidade animal.

Os resultados obtidos por meio do monitoramento das APPs do futuro reservatório, que estão sendo objeto de restauração florestal, ainda não indicam mudanças na fauna dessas áreas. Apenas com o desenvolvimento dos plantios e consequente mudança na diversidade e estrutura da vegetação, incremento na oferta de recursos e mudanças nas condições microclimáticas se estabelecerá o processo de mudança da comunidade animal. Assim, espera-se que os efeitos da melhoria nas condições ambientais dessas áreas possam ser capturados com a continuidade do monitoramento.

Cabe ressaltar que embora os levantamentos da comunidade de mamíferos, de répteis e anfíbios tenham contribuído de forma significativa para o melhor conhecimento das áreas estudadas, ainda contribuem de pouco para o teste das hipóteses. Entretanto, com o avanço do monitoramento este cenário deve ser alterado.

7. CRONOGRAMA

Conforme definido pela Cetesb, no Parecer Técnico Cetesb no 468/18/IE (Processo IMPACTO 189/2013 - 017840/2018-87 e-ambiente), as campanhas de monitoramento de fauna estão sendo realizadas com periodicidade quadrimestral, e não semestral, como havia sido proposto inicialmente. Assim, serão realizadas três campanhas de amostragem por ano, ao longo de toda a fase de implantação da Barragem Pedreira, conforme apresentado na **Tabela 7-1**.

TABELA 7-1: Cronograma de atividades do Subprograma de Monitoramento de Fauna das áreas sob influência da Barragem Pedreira

ATIVIDADES	2019											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamentos de Campo ¹	1				2				3			
Elaboração de Relatórios		1				2				3		

ATIVIDADES	2020											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamentos de Campo ¹									4			5
Elaboração de Relatórios										4		

ATIVIDADES	2021											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamentos de Campo ¹				6				7				8
Elaboração de Relatórios	5				6				7			

ATIVIDADES	2022											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamentos de Campo ¹						9				10		
Elaboração de Relatórios	8						9				10	

¹Em vermelho as atividades já realizadas e em cinza as atividade a serem realizadas ao longo do ano de 2021.

8. EQUIPE TÉCNICA

Neste item é apresentada a relação de profissionais responsáveis pelos estudos de campo e elaboração de relatório relativos às cinco primeiras campanhas de monitoramento de fauna das áreas sob influência da Barragem Pedreira.

COORDENAÇÃO GERAL	
Dr. Fernando Mendonça d'Horta	CREA: 5060444216/D
Dr. José Cassimiro da Silva Júnior	CRBio: 37662/01-D
Dr. Christian Borges Andretti	CRBio: 13500/06-D

9. BIBLIOGRAFIA

AGUIAR, D.M. 2007. A sanidade animal e as zoonoses em sistemas de agricultura familiar: um breve comentário. **Pesquisa & Tecnologia**, 4 (2).

AIDE, T.M., CORRADA-BRAVO, C., CAMPOS-CERQUEIRA, M., MILAN, C., VEGA, G. & ALVAREZ, R. 2013. Real-time bioacoustics monitoring and automated species identification. **PeerJ**, 1, e103.

AZEVEDO, F.C.; LEMOS, F.G.; ALMEIDA, L.B.; CAMPOS, C.B.; BEISIEGEL, B.M.; PAULA, R.C.; CRAWSHAW JR., P.G.; FERRAZ, K.M.P.M.B.; OLIVEIRA, T.G. 2013. Avaliação do risco de extinção da onça-parda *Puma concolor* (Linnaeus, 1771) no Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, n. 1: 107-121.

BEISIEGEL, B.M. & OLIVEIRA, E.N.C. 2012. **Densidade populacional e uso do espaço por onças pintadas e pardas nos Parques Estaduais turístico do Alto Ribeira, Carlos Botelho, Intervalos e Ilha do Cardoso e Estação Ecológica de Xitué, São Paulo**. 4º Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica do ICMBio. Anais do IV Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

BEISIEGEL, B.M. 2009. First camera trap records of bush dogs in the state of São Paulo, Brazil. **Canid News** 12.5 [online].

BERGALLO, H.G.; ESBÉRARD, C.E.L.; MELLO, M.A.R.; LINS, V.; MANGOLIN, R.; MELO, G.G.S.; BAPTISTA, M. 2003. Bat Species Richness in Atlantic Forest: What Is the Minimum Sampling Effort? **Biotropica** 35(2):278-288.

BERTOLUCI, J. (1998) Annual patterns of breeding activity in Atlantic Rainforest anurans. **Journal of Herpetology**, 32, 607-611.

BERTOLUCI, J. & RODRIGUES, M. T. (2002) Seasonal patterns of breeding activity of Atlantic Rainforest anurans at Boracéia, Southeastern Brazil. **Amphibia-Reptilia**, 23, 161-167.

BRAY, J. R. & CURTIS, J. T. (1957) An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. **Ecological Monographs**, 27, 325-349.

BRESSAN, P. M., KIERULFF, M. C. M. & SUGIEDA, A. M. (2009) **Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: Vertebrados**. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, Fundação Parque Zoológico de São Paulo.

BUENO, A. D., & MOTTA, J. C. 2009. **Feeding habits of the maned wolf, *Chrysocyon brachyurus* (Carnivora: Canidae), in southeast Brazil**. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 44, 67-75

CHAO, A.; COLWELL, R.K.; LIN, C.W.; GOTELLI, N.J. 2009. Sufficient sampling for asymptotic minimum species richness estimators. **Ecology**, 90(4), 2009, pp. 1125–1133.

COLWELL, R. K. (2013) **EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples**. Version 9. In, Persistent URL <purl.oclc.org/estimates>.

COSTA, H. C. & BÉRNILS, R. S. (2015) Répteis brasileiros: Lista de espécies 2015. **Herpetologia Brasileira**, 4, 75-93.

COSTA, L.P.; LEITE, Y.L.R.; MENDES, S.L.; DITCHFIELD, A.D. 2005. Conservação de Mamíferos no Brasil. **Megadiversidade. Belo Horizonte, MG.**: 1 (1): 103-112.

CRUMP, M. L. & SCOTT, N. J. (1994) Visual encounter surveys. In: W. R. Heyer, M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L.-A. C. Hayek & M. S. Foster (Eds), **Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Amphibians**. Smithsonian Institution Press, Washington, pp. 84-92.

DELABIE, J.H.C.; FISHER, B.L.; MAJER, J.D.; WRIGHT, I.W. 2000. Sampling effort and choice of methods. **Ants: Standard methods for measuring and monitoring biodiversity**, p. 145-154.

DIRZO, R. & MIRANDA, A. 1990. Contemporary Neotropical Defaunation and Forest Structure, Function, and Diversity—A Sequel to John Terborgh*. **Conservation Biology**, 4: 444–447.

DONATTI, C.I. 2004. **Consequências da defaunação na dispersão de sementes e no recrutamento de plântulas da palmeira brejaúva (*Astrocaryum aculeatissimum*) na Mata Atlântica. 2004**. 89 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Agroecossistemas) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

DOTTA, G. 2005. **Diversidade de Mamíferos de médio e grande porte em relação a paisagem do rio Passa-cinco, São Paulo.** Dissertação de Mestrado. ESALQ/USP – Universidade de São Paulo. 134pgs.

EMMONS, L. 2016. *Cuniculus paca*. The IUCN **Red List of Threatened Species 2016: e.T699A22197347**. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T699A22197347.en>. Downloaded on 07 November 2017.

ESPARTOSA, K. 2009. **Mamíferos terrestres de maior porte e a invasão de cães domésticos em remanescentes de uma paisagem fragmentada de Mata Atlântica: avaliação da eficiência de métodos de amostragem e da importância de múltiplos fatores sobre a distribuição das espécies.** Dissertação (Mestrado em Ciências – área de Ecologia) – Instituto de Biociências, USP, São Paulo.

FARINA, A. **Soundscape Ecology**. (Springer Netherlands, 2014).

FORMAN, R.T.T.; GODRON, M. 1986. **Landscape ecology**. Wiley, New York

FROST, D. R. (2017) **Amphibian Species of the World: an Online Reference**. Version 6.0 (22 February 2017). Electronic Database accessible at <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>. In, American Museum of Natural History, New York, USA.

GALETTI, M.; SAZIMA, I. 2006. Impact of feral dogs in an urban Atlantic forest fragment in southeastern Brazil. **Natureza & Conservação**, 4(1): 146-151.

GARDNER, A.L. **Mammals of South America**, Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats, 669p. University of Chicago Press. 2008.

GRELLE, C.E.V.; PAGLIA, A.P.; SILVA, H.S. 2006. **Análise dos fatores de ameaça de extinção: estudo de caso com os mamíferos brasileiros.** In: ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, H.G.; VAN SLUYS, M.; ALVES, M.A.S. *Biologia da conservação: essências*. São Carlos: RIMA. p. 385-398.

GROSS, J. e LIGGES, U. 2015. **Nortest: Tests for Normality**. R package version 1.0-4. <https://CRAN.R-project.org/package=nortest>

GURGEL-FILHO, N.M., A. FEIJÓ & A. LANGGUTH. 2015. Pequenos mamíferos do Ceará (Marsupiais, Morcegos e Roedores Sigmodontíneos) com discussão taxonômica de algumas espécies. **Revista Nordestina de Biologia** 23(2): 3–150.

HADDAD, C. F. B. & PRADO, C. P. A. (2005) Reproductive modes in frogs and their unexpected diversity in the Atlantic Forest of Brazil. **Bioscience**, 55, 207-217.

HAMMER, Ø., HARPER, D. A. T. & RYAN, P. D. (2001) **PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis**. *Palaeontologia Electronica*, 4, 9 pp.

HEDGES, S. B. & CONN, C. E. (2012) A new skink fauna from Caribbean islands (Squamata, Mabuyidae, Mabuyinae). **Zootaxa**, 3288, 1-244.

HOTHORN, T., HORNIK, K., VAN DE WIEL, M. A., ZEILEIS, A. 2008. Implementing a Class of Permutation Tests: The coin Package. **Journal of Statistical Software** 28(8), 1-23. URL: <http://www.jstatsoft.org/v28/i08/>.

IUCN (2017) **The IUCN Red List of Threatened Species**. <http://www.iucnredlist.org>. Version 2017-2. Available from: <http://www.iucnredlist.org> (10/25/2017).

IUCN. 2012. **IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1**. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp.

JUAREZ, K. M., & MARINHO, J. 2002. **Diet, habitat use, and home ranges of sympatric canids in central Brazil**. *Journal of Mammalogy*, 83, 925-933

KARANTH, U.K., NICHOLS, J.D., KUMAR, N.S. 2004. **Photographic sampling of elusive mammals in tropical Forest**. In: **Sampling Rare or Elusive Species**. Thompson W.L. (ed.). Pp. 229-247. Island Press, Whashington, USA.

KELLY, M.J. & HOLUB, E.L. 2008. Camera Trapping of Carnivores: Trap Success Among Camera Types and Across Species, and Habitat Selection by Species, on Salt Pond Mountain, Giles County, Virginia. **Northeastern Naturalist**, 15(2):249-262.

KRAUSE, B., 1987. Bioacoustics, habitat ambience in ecological balance. **Whole Earth Rev.** 57: 14–18.

MAFFEI, L.; NOSS, A.J.; CUÉLLAR, E.; RUMIZ, D. 2005. Ocelot (*Felis pardalis*) population densities, activity, and ranging behavior in the dry forests of eastern Bolivia: Data from camera trapping. **J. Trop. Ecol.** 21: 349–353.

MCCUNE, B., GRACE, J. B. 2002. **Analysis of Ecological Communities**. MjM Software Design, Oregon: Gleneden Beach.

OLIVEIRA, T.G. DE, KASPER, C.B., TORTATO, M.A., MARQUES, R.V., MAZIM, F.D., SOARES, J.B.G., SCHNEIDER, A., PINTO, P.T., PAULA, R.C.DE, CAVALCANTI, G.N., CAMPOS, C., QUIXABA-VIEIRA, O., 2008. **Aspectos da ecologia e conservação de *Leopardus tigrinus* e outros felinos de pequeno-médio porte no Brasil**, In: Oliveira, T.G.de, (Ed.), Estudos para o manejo de *Leopardus tigrinus*/Plano de ação para conservação de *Leopardus tigrinus* no Brasil. Relatório final, Instituto Pró-Carnívoros/Fundo Nacional do Meio Ambiente, Atibaia, SP, Brazil, pp. 37-105.

OKSANEN, J, BLANCHET, F. G., FRIENDLY, M., KINDT, R., LEGENDRE, P., MCGLINN, MINCHIN, P. R., O'HARA, R. B., SIMPSON, G. L., SOLYMOS, P., STEVENS, M. H. H, SZOECS, E., WAGNER, H. 2017. **Vegan: Community Ecology Package**. R package version 2.4-3. <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>

PAGLIA, A.P.; FONSECA, G.A.B.; RYLANDS, A.B.; HERRMANN, G.; AGUIAR, L.M.S.; CHIARELLO, A.G.; LEITE, Y.L.R.; COSTA, L.P.; SICILIANO, S.; KIERULFF, M.C.M.; MENDES, S.L.; TAVARES, V.C.; MITTERMEIER, R.A. E PATTON J.L. 2012. **Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil / Annotated Checklist of Brazilian Mammals**. 2ª Edição / 2nd Edition. Occasional Papers in Conservation Biology, No. 6. Conservation International, Arlington, VA. 76pp.

PARDINI, R., DITT, E. H., CULLEN JR., L., BASSI, C. C., RUDRAN, R. 2003. **Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre**. In: Cullen Jr, L., Rudran, R., Valladares Pádua, C. (Orgs). Levantamento rápido de mamíferos terrestres de médio e grande porte. Editora da UFPR, Curitiba, 2003, p.181- 201.

PATTON J.L.; PARDIÑAS, U.F.J. AND D'ELÍA, G. 2015. **Mammals of South America, Volume 2 - Rodents**. The University of Chicago Press, Chicago, Illinois.

PATTON, J.L. 2015a. **Family Cuniculidae G.S. Miller and Gidley, 1918.** In: Patton, J.L., Pardiñas, U.F.J. and D'Elía, G. (eds), *Mammals of South America*, pp. 726-733. University of Chicago Press, Chicago and London.

PEDROSA, F.; SALERNO, R.; PADILHA, F.V.B.; GALETTI M. 2015. Current distribution of invasive feral pigs in Brazil: economic impacts and ecological uncertainty. **Natureza & Conservação**, 13(1): 84-87.

PEDROSO, N.M.P.S. 2012. **Otters and dams in mediterranean habitats: a conservation ecology approach.** Tese de doutoramento, Biologia (Ecologia), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências.

PERCEQUILLO, A.R.; KIERULFF, M.C.M. 2009. **Mamíferos.** In: *Fauna Ameaçada De Extinção No Estado De São Paulo: Vertebrados / coordenação geral: Paulo Magalhães Bressan, Maria Cecília Martins Kierulff, Angélica Midori Sugieda.* -- São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2009.

PIANCA, C.C. 2004. **A caça e seus efeitos sobre a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte em áreas preservadas da Mata Atlântica na Serra de Paranapiacaba (SP). 2004.** 74 p. Dissertação de (Mestrado em Ecologia de Agroecossistemas) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

PIJANOWSKI, B. C., L. J. VILLANUEVA-RIVERA, S. L. DUMYAHN, A. FARINA, B. L. KRAUSE, B. M. NAPOLETANO, S. H. GAGE, N. PIERETTI. 2011. The science of sound in the landscape. **BioScience** 61:203-216.

POMBAL, J. P., JR. & HADDAD, C. F. B. (2008) **Estratégias e modos reprodutivos em anuros.** In: L. B. Nascimento & P. M. E. Oliveira (Eds), *Herpetologia no Brasil II*. Sociedade Brasileira de Herpetologia, pp. 101-116.

PYRON, R. A., BURBRINK, F. T. & WIENS, J. J. (2013) **A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes.** *BMC Evolutionary Biology*, 13, 1-53.

R DEVELOPMENT CORE TEAM. 2008. **R: A language and environment for statistical computing.** R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL <http://www.R-project.org>.

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. 2011. **Mamíferos do Brasil** (2^oed.). 439p. Londrina, Paraná, Brasil.

RHEINGANTZ, M.L. & TRINCA, C.S. 2015. ***Lontra longicaudis***. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T12304A21937379. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T12304A21937379.en>. Downloaded on 07 November 2017.

RODRIGUES, F. H. G., HASS, A., LACERDA, A. C. R., GRANDO, R. L. S. C., BAGNO, M. A., BEZERRA, A. M. R., & SILVA, W. R. 2007. **Feeding Habits Of The Maned Wolf (*Chrysocyon Brachyurus*) In The Brazilian Cerrado**. *Mastozoología Neotropical*, 14, 37-51

SÃO PAULO. 2014. **Declara as espécies da fauna silvestre, ameaçadas de extinção as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas Decreto 60133, de 07 de fevereiro de 2014**. Available from <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2014/decreto-60133-07.02.2014.html>.

SMITH, J. W.; PIJANOWSKI, B. C. 2014. Human and policy dimensions of soundscape ecology. **Global Environmental Change** 28: 63-74.

SEGALLA, M. V., CARAMASCHI, U., CRUZ, C. A. G., GRANT, T., HADDAD, C. F. B., GARCIA, P. C. A., *et. al.* (2016) Brazilian Amphibians: List of Species. **Herpetologia Brasileira**, 5, 34-46.

SILVER, S.C.; L.E.T. OSTRO; L.K. MARSH; L. MAFFEI; A.J. NOSS; M.J. KELLY; R.B. WALLACE; H. GOMEZ; G. AYALA. 2004. The use of camera traps for estimating jaguar abundance and density using capture/recapture analysis. **Oryx** 38:148–154.

SRBEK-ARAUJO, A.C.; CHIARELLO, A.G. 2008. Domestic dogs in Atlantic forest preserves of south-eastern Brazil: a camera-trapping study of patterns of entrance and site occupancy rates. **Brazilian Journal of Biology**, 68 (4): 771-779.

STONER, K.E.; VULINEC, K.; WRIGHT, S.J.; PERES, C.A. 2007. Hunting and plant community dynamics in tropical forests: a synthesis and future directions. **Biotropica**, Washington, v. 39, n.3, p. 385-392.

SUNQUIST, M.E. & SUNQUIST, F.C. 2009. FAMILY FELIDAE (CATS). p. 54-186. In: Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. (eds.). **The mammals of the world**. Vol. 1. Carnivores. Lynx Editions. p.727

THEMAG (2015) **Volume III. Diagnóstico do Meio Biótico. Tomo 1 - Texto (Parte 1)**. In: *Estudo de Impacto Ambiental. Barragens Pedreira e Duas Pontes*, p. 350.

TOBLER, M.W.; CARRILLO-PERCASTEGUI, S.E., PITMAN, R.L.; MARES, R. & POWELL, G. 2008. An evaluation of camera traps for inventorying large and medium-sized terrestrial rainforest mammals. **Animal Conservation** 11: 169–178.

TOMAS, W.M.; MIRANDA, G.H.B. 2003. **Uso de armadilhas fotográficas em levantamentos populacionais**. In: Cullen L, Jr.; Rudran, R., Valladares-Pádua, C. (eds) *Métodos de estudo em biologia da conservação e manejo de vida silvestre*. Curitiba: Editora da UFPR, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, pp. 181-202.

TRAAD, R. M.; LEITE, J.C. M.; WECKERLIN, P.; TRINDADE, S. 2012. Introdução das espécies exóticas *Callithrix penicillata* (Geoffroy, 1812) e *Callithrix jacchus* (Linnaeus, 1758) em ambientes urbanos (Primates: Callithrichidae). **Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade**, 2 (1): 9-23.

TROLLE, M; NOSS. J.A.; CORDEIRO, J.L.P; OLIVEIRA, L.F.B. 2008. Brazilian Tapir Density in the Pantanal: A Comparison of Systematic Camera-Trapping and Line-Transect Surveys. **Biotropica** 40(2): 211–217.

TURNER, M.G. 2005. Landscape ecology: what is the state of the science? **Annu Rev Ecol Syst** 36:319–344.

UNDERWOOD, A. J. 1989. The analysis of stress in natural populations. **Biological Journal of the Linnean Society** 37: 51-78.

VANZOLINI, P. E. (1968a) Geography of the South American Gekkonidae (Sauria). **Arquivos de Zoologia, São Paulo**, 17, 85-112.

VANZOLINI, P. E. (1968b) Lagartos brasileiros da família Gekkonidae (Sauria). **Arquivos de Zoologia, São Paulo**, 17, 1-84.

VANZOLINI, P. E., RAMOS-COSTA, A. M. M. & Vitt, L. J. (1980) **Répteis das Caatingas**. Rio de Janeiro, RJ: Academia Brasileira de Ciências.

VERDADE, V. K., DIXO, M. & CURCIO, F. F. (2010) Risks of extinction of frogs and toads as a result of environmental changes. **Estudos Avançados**, 24, 161-172.

VIVO, M.; CARMIGNOTTO, A. P.; GREGORIN, R.; HINGST-ZAHER, E.; IACK-XIMENES, G. E.; MIRETZKI, M.; PERCEQUILLO, A. R.; ROLLO JUNIOR, M. M.; ROSSI, R.V.; TADDEI, V.A. 2011. Checklist dos mamíferos do Estado de São Paulo, Brasil Metodologia. **Biota Neotropica**, 11(1), 111–131.

WICKHAM, H. **ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis**. Springer-Verlag New York, 2016.

WILSON, D.E. & REEDER, D.M. **Mammals Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference**. 3ª Ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2.142pp, 2005.

WRIGHT, S.J.; HERNANDEZ, A.; CONDIT, R. 2007. The bushmeat harvest alters seedling banks by favoring lianas, large seeds, and seeds dispersed by bats, birds and wind. **Biotropica**, Washington, v. 39, p. 363-371.

ANEXOS

**ANEXO 1:
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190156429

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1. Responsável Técnico

FERNANDO MENDONCA DHORTA

Título Profissional: Engenheiro Florestal

RNP: 2606034244

Registro: 5060444216-SP

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **Consórcio BP OAS-CETENCO**

CPF/CNPJ: 29.786.963/0001-44

Endereço: **Avenida FRANCISCO MATARAZZO**

Nº: 1350

Complemento: **1707**

Bairro: **ÁGUA BRANCA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: 05001-100

Contrato:

Celebrado em: **12/03/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **50.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Padre Francisco Salvíno**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **Pedreira**

UF: **SP**

Data de Início: **08/01/2019**

Previsão de Término: **30/07/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Nº:

CEP: 13920-000

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Consultoria					
1	Monitoramento	Estudo Ambiental	Ambiental	700,00000	hora
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

Monitoramento de fauna (aves mamíferos de médio/grande porte, répteis e anfíbios) das áreas sob influência da Barragem Pedreira, Pedreira/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo **8** de *junho* de **2019**

Local

data

FERNANDO MENDONCA DHORTA - CPF: 175.580.278-10

Consórcio BP OAS-CETENCO - CPF/CNPJ: 29.786.963/0001-44

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confrea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessarlink@fate.com.br ou fate.com.br



	LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO	Página	1/1
		Data	02/09/2021
		Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: **Barragem Pedreira**

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: **Crimes ambientais e proteção da fauna silvestres**

Objetivo: Orientar os colaboradores sobre crimes de captura e tráfico de animais silvestres

Conteúdo Programático:
 Apresentação dos motivos
 penalidade interna e externa
 lei de proteção ambiental

Nome do(s) Instrutor(es): **NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA**

Público Alvo: Interno Terceirizado Externo
 Local do Treinamento: **Barragem pedreira.**

Data: **02/12/2022** Horário: **10:30 a 11:00h** Duração (h): **30m**

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	408888	Carlos Alberto P.O.S	SERVENTES	BP	Carlof
2	406681	Levinio S.J. Neto	EST	BP	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			x
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			x
Interação dos participantes no treinamento			x
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			x

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:


 Consórcio KPE-Cetenco
 Noel Eduardo de Oliveira Cintra
 Médico Veterinário
 CRMV/SP: 42.786

Nota: Para treinamentos de integração admissional, o conteúdo programático está descrito no formulário: Informações de Treinamento da Integração Admissional.

	LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO	Página	1/1
		Data	02/09/2021
		Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: **Barragem Pedreira**

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: **Treinamento de manejo e captura de serpentes**





Objetivo: **Capacitar os colaboradores**

Conteúdo Programático:
 Apresentação dos motivos
 perigos e não perigos





Nome do(s) Instrutor(es): **NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA**

Público Alvo: Interno Terceirizado Externo
 Local do Treinamento: **Barragem pedreira.**

Data: **09/12/2022** Horário: **16:00 a 16:30h** Duração (h): **30m**

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	403417	Lucas Aquilino Vieira	Coord. Ambiental	BP	
2	405375	Diego Fernandes	Engenheiro Ambiental	BP	
3	407008	Márcia Campa Rella	Engen. Ambiental	BP	
4	408425	OLAUDEMIRRA F. BUENO	TCC. M. AMB	BP	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			
Interação dos participantes no treinamento			
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:

 Consórcio KPE-Cetenco
 Noel Eduardo de Oliveira Cintra
 Médico Veterinário
 CRMV/SP: 42.786

Nota: Para treinamentos de integração admissional, o conteúdo programático está descrito no formulário: Informações de Treinamento da Integração Admissional.



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: **Barragem Pedreira**

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: **Animais peçonhentos**

Objetivo: **Capacitar os colaboradores**

Conteúdo Programático:
 Apresentação dos motivos
 perigos e não perigos

Nome do(s) Instrutor(es): **NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA**

Público Alvo: Interno Terceirizado Externo **Local do Treinamento:**
 Barragem pedreira.

Data: **19/12/2022** Horário: **14:50 a 14:30h** Duração (h): **30m**

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	406736	marco emaldade W. Junior	servente	BP	marco
2	407077	Josã Vitor A. Teixeira	servente	BP	
3	408342	Rodrigo Perceira	servente	BP	Rodrigo
4	406666	JOÃO DOMINGOS PEREIRA	SERVENTE	BP	
5	40772	Yuliana Fernandes de A.	SERVERT	BP	
6	409257	Dora Souza de M.	ORE moto	BR	
7	403971	Ademilson de C. Araújo	servente	BP	
8	408345	Wagner de A. Pereira	servente	BP	
9	407298	Francisco Fabiano Araujo de Souza	servente	BP	
10	407122	Helio de A. Souza	motorista	BP	Helio
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			4
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			4
Interação dos participantes no treinamento			4
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			4

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:

 Consórcio KPE-Cetenco
 Noel Eduardo de Oliveira Cintra
 Médico Veterinário
 CRMV/SP: 42.786

Nota: Para treinamentos de integração admissional, o conteúdo programático está descrito no formulário: Informações de Treinamento da Integração Admissional.



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: **Barragem Pedreira**

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: **Manejo e Captura de invertebrados peçonhentos**

Objetivo: **Capacitar os colaboradores**

Conteúdo Programático:

Apresentação dos motivos

perigos e não perigos

Nome do(s) Instrutor(es): **NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA**

Público Alvo:

Interno Terceirizado Externo

Local do Treinamento:

Barragem pedreira.

Data: **20/12/2022**

Horário: **13:30 a 14:00h**

Duração (h): **30m**

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	406516	Paulo Sérgio Livellus	TST	consórcio BP	
2	402350	JANAR C. N. MORAES	AUX: SEGURAN	KPE-CONCÓRDO	
3	408364	Carlin A. F. Siqueira	AUX: TI SEGURAN	consórcio BP	Carlin A. F. Siqueira
4	408425	OLAUDENITKA F. DUARTE	TC-M. AMB	BP	
5	405375	Diego Henrique	Engenharia de Segurança	consórcio BP	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			
Interação dos participantes no treinamento			
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:
 Consórcio KPE-Cetenco
 Noel Eduardo de Oliveira Cintra
 Médico Veterinário
 CRMV/SP: 42.786



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: **Barragem Pedreira**

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: **Captura de Invertebrados Peçonhentos**

Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteúdo Programático:

Apresentação dos motivos

Exemplos de situações que podem ocorrer

Nome do(s) Instrutor(es): **NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA**

Público Alvo:

Interno Terceirizado Externo

Local do Treinamento:

Barragem pedreira.

Data: **27/10/2022** Horário: **09:00 a 09:30h** Duração (h): **30m**

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	402034	Luis Alberto de oliveira	Eng Florestal	BP	
2	403417	Lucas Quaiatti vieira	Analista Ambiental	BP	
3		Altamir Pedro de Oliveira Neto	Med. Veterinario	BDP	
4	407008	Matteus Campos Rocha	Resp. Gest Amb	BP	
5	405375	Diego Hernane Freitas Sousa	Analista Ambiental	BP	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			<input checked="" type="checkbox"/>
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			<input checked="" type="checkbox"/>
Interação dos participantes no treinamento			<input checked="" type="checkbox"/>
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			<input checked="" type="checkbox"/>

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: Barragem Pedreira

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: Plano de Ação em Caso de Acidentes com Animais Peçonhentos.

Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteúdo Programático:

Apresentação dos motivos

Exemplos de situações que podem ocorrer

Nome do(s) Instrutor(es): NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA

Público Alvo:

Interno Terceirizado Externo

Local do Treinamento:

Barragem pedreira.

Data: 27/10/2022 Horário: 10:00 a 10:30h Duração (h): 30m

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	402034	Luis Alberto de oliveira	Eng Florestal	BP	
2	403417	Lucas Quaiatti vieira	Analista Ambiental	BP	
3		Altamir Pedro de Oliveira Neto	Med. Veterinario	BDP	
4	407008	Matteus Campos Rocha	Resp. Gest Amb	BP	
5	405375	Diego Hernane Freitas Sousa	Analista Ambiental	BP	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AValiação DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			U
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			U
Interação dos participantes no treinamento			U
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			U

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: Barragem Pedreira

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: Acidentes com animais peçonhentos.

Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteúdo Programático:

Apresentação dos motivos

Exemplos de situações que podem ocorrer

Nome do(s) Instrutor(es): NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA

Público Alvo: Interno Terceirizado Externo
 Local do Treinamento: Barragem pedreira.

Data: 14/09/2022 Horário: 09:00 a 09:30h Duração (h): 30m

Seq.	Matricula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	407077	Pauloilton A. Teixeira	Servente	BP	[assinatura]
2	409255	Fro Jefferson Anazio de Souza	Servente	BP	[assinatura]
3	407729	Juliano de Almeida	SERVENTE	BP	[assinatura]
4	406666	JOÃO GOMES DE ARAÚJO	SERVENTE	BP	[assinatura]
5	409259	Paula Santos da Silva	SERVENTE	BR	[assinatura]
6	406746	Daniel da Silva	BP	BP	[assinatura]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			[assinatura]
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			[assinatura]
Interação dos participantes no treinamento			[assinatura]
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			[assinatura]

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:

Consórcio KPE-Cetenco
 Noel Eduardo de Oliveira Cintra
 Médico Veterinário
 CRMV/SP: 42.786



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: Barragem Pedreira

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Outro: _____
 Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal

Nome do Treinamento: Acidentes com animais peçonhentos.

Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteúdo Programático:

Apresentação dos motivos

Exemplos de situações que podem ocorrer

Nome do(s) Instrutor(es): NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA

Público Alvo: Interno Terceirizado Externo
 Local do Treinamento: Barragem pedreira.

Data: 14/09/2022 Horário: 09:00 a 09:30h Duração (h): 30m

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	404976	Maíel F Sella	EBT	KPE Cetenco	
2	406382	Arthur Gabriel de Sampaio Lima	ADN	KPE Cetenco	
3	403971	Adelmar de Souza Gonçalves	Servente	BP	
4	406736	Marcos Espinaldo de O. Júnior	Servente	BP	
5	407689	Carlos Junior do C. Alves	Servente	BP	
6	407497	Amely Luz dos Santos	Servente	BP	
7	407498	Walter Felipe de Souza	Servente	BP	
8	403228	Eulário de Castro P	Servente	BP	
9	406755	Wely Brito's Conden	Servente	BP	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			
Interação dos participantes no treinamento			
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:

Consórcio KPE-Cetenco
 Noel Eduardo de Oliveira Cintra
 Médico Veterinário
 CRMV/SP: 42.786

LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO

Página	1/1
Data	02/09/2021
Numeração	BP-FR-DP-0015-R02

Obra: **Barragem Pedreira**

Tipo de Treinamento: Integração Admissional Específico Campanha Execução de Serviço Reciclagem Requisito Legal Outro: _____

Nome do Treinamento: Como identificar as corais verdadeira.

Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteúdo Programático:

Apresentação dos motivos





Exemplos de situações que podem ocorrer

Nome do(s) Instrutor(es): NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA





Público Alvo: Interno Terceirizado Externo

Local do Treinamento:
Barragem pedreira.

Data: 07/11/2022 Horário: 11:30 a 12:00h Duração (h): 30m

Seq.	Matrícula	Nome	Função	Empresa	Visto
1	402034	Luis Alberto de oliveira	Eng Florestal	BP	
2	403417	Lucas Quaiatti vieira	Analista Ambiental	BP	
3	407008	Matteus Campos Rocha	Resp. Gest Amb	BP	
4	405375	Diego Hernane Freitas Sousa	Analista Ambiental	BP	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

Avaliação realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado	Insatisfeito	Regular	Satisfeito
Conhecimento e interesse dos participantes sobre o tema			
Atitudes (postura) dos participantes durante o treinamento			
Interação dos participantes no treinamento			
Avaliação do aproveitamento geral do treinamento realizado			

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamento:

Consórcio KPE-Cetenco
Noel Eduardo de Oliveira Cintra
Médico Veterinário
CRMV/SP: 42.786

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.03-PMCF

REGISTRO		DETALHAMENTO DA ORIGEM/REGISTRO DE OCORRÊNCIA		IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA				DETALHAMENTO DO ATENDIMENTO/DESTINO							INFORMAÇÕES SOBRE O TAXON	OBSERVAÇÕES				
ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMÍLIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.653/2018	Informações adicionais
-	AF	-	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Onça Parda	-	Não	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	Vulnerável	Avistamento de pegadas
1	RE	14/01/2019	1	AVIFAUNA	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Periquitão	S	Sim	F	ND	Não	Não	Óbito	22/02/2019	-	-	-	-
2	RE	14/01/2019	1	AVIFAUNA	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Periquitão	S	Sim	F	ND	Não	Não	Óbito	22/02/2019	-	-	-	-
3	RE	14/01/2019	1	AVIFAUNA	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Periquitão	S	Sim	F	MA	Não	Não	Óbito	22/02/2019	-	-	-	-
4	RE	16/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	-	305445	7477358	-	-
5	RE	17/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikarii</i>	Dormideira	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	-	305536	7477493	-	-
-	AF	18/01/2019	2	AVIFAUNA	Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	S	Não	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	18/01/2019	3	AVIFAUNA	Passeriformes	Icteridae	<i>Chrysomus ruficapilus</i>	Garibaldi	S	Não	A	MA	Não	Não	-	-	-	-	-	-
8	RE	18/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	-	305544	7477537	-	-
-	AF	21/01/2019	2	AVIFAUNA	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga auricapillus</i>	Jandaia-de-testa-vermelha	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	22/01/2019	1	AVIFAUNA	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Tapera naevia</i>	Saci	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	22/01/2019	3	AVIFAUNA	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guirá guirá</i>	Anu-branco	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	22/01/2019	4	AVIFAUNA	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i>	Periquito-de-encontro-amarelo	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
13	RE	22/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella schneideri</i>	Sapo-curu	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	-	304133	7481071	-	-
-	AF	22/01/2019	1	AVIFAUNA	Strigiformes	Strigidae	<i>Athene curucularia</i>	Coruja buraqueira	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	22/01/2019	1	MASTOFAUNA	Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasyops novemcinctus</i>	Tatu-galinha	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
16	RE	22/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella schneideri</i>	Sapo-curu	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	-	304133	7481071	-	-
-	AF	23/01/2019	1	AVIFAUNA	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	Maria-facelira	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/01/2019	3	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Sagui-de-tufo-preto	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/01/2019	2	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	Sagui-de-tufo-branco	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/01/2019	1	AVIFAUNA	Furnariiformes	Furnariidae	<i>Automolus leucophthalmus</i>	Barranqueiro-de-olho-branco	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/01/2019	4	AVIFAUNA	Craciformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Jacuguacu	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Telidae	<i>Salvator merianae</i>	Lagarto-teiú	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Mabuvidae	<i>Notomabuya frenata</i>	lagartixa	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
24	RE	30/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella schneideri</i>	Sapo-curu	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	-	304245	7481133	-	-
25	RE	30/01/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella schneideri</i>	Sapo-curu	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	-	304245	7481133	-	-
26	RE	30/01/2019	1	AVIFAUNA	Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	Corujinha-do-mato	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	-	304219	7481102	-	-
27	RE	01/02/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	M	Sim	A	FE	Não	Não	Óbito	22/02/2019	-	-	-	-
28	RE	02/02/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	-	303895	7480854	-	-
-	AF	02/02/2019	3	AVIFAUNA	Craciformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Jacuguacu	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	02/02/2019	2	AVIFAUNA	Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
31	RE	06/02/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	-	304102	7480895	-	-
-	AF	07/02/2019	1	AVIFAUNA	Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	Cabeça-seca	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	07/02/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Gavião-de-rabo-branco	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	07/02/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	-	J	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	08/02/2019	5	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
36	RE	11/02/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	-	304095	7480895	-	-
37	RE	13/02/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	F	Sim	J	MA	Não	Não	Soltura	-	304108	7480890	-	-
38	RE	13/02/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	Sagui-de-tufo-branco	M	Sim	A	FE	Não	Sim	Óbito	22/02/2019	-	-	-	-
39	RE	14/02/2019	1	MASTOFAUNA	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti	S	Sim	F	ND	Não	Sim	Óbito	22/02/2019	-	-	-	Dados Insuficientes
40	RE	14/02/2019	1	MASTOFAUNA	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti	S	Sim	F	ND	Não	Sim	Óbito	22/02/2019	-	-	-	Dados Insuficientes
-	AF	14/02/2019	3	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	15/02/2019	5	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufo-branco	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
-	AF	16/02/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Telidae	<i>Salvator merianae</i>	Lagarto-teiú	S	-	A	ND	Não	Não	-	-	-	-	-	-
44	RE	21/02/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304090	7480922	-	-
45	RE	11/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303987	7480763	-	-
47	RE	12/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax perereca</i>	Perereca	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	304282	7481186	-	-
48	RE	14/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus nattereri</i>	Rã-de-quatro-olhos	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304283	7481204	-	-
49	RE	14/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303943	7480831	-	-
50	RE	15/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	303956	7480851	-	-
51	RE	16/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304145	7480974	-	-
52	RE	18/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa - coral	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303974	7480580	-	-
54	RE	19/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303847	7480696	-	-
-	AF	20/03/2019	7	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufo-branco	S	-	A	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
56	RE	21/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra d'água	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	304046	7480559	-	-
58	RE	21/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	305657	7482278	-	-
59	RE	21/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303846	7480641	-	-

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMILIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
60	RE	22/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304029	7480904	-	-
62	RE	25/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra d'água	S	Sim	F	ND	Não	-	Soltura	-	304048	7480562	-	-
63	RE	26/03/2019	1	MASTOFAUNA	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	304150	7480754	-	-
64	RE	27/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304152	7480778	-	-
65	RE	27/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	304101	7480743	-	-
66	RE	27/03/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	304047	7480751	-	-
67	RE	01/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	304059	7480833	-	-
69	RE	01/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	MA	Sim	-	Óbito	22/02/2019	-	-	-	-
70	RE	02/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304180	7480901	-	-
71	RE	03/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufo	<i>Rhinella schneideri</i>	sapo-cururu	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304281	7481192	-	-
-	AF	03/04/2019	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i>	Gato-mourisco	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	Quase Ameaçada	-
73	RE	04/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304052	7480876	-	-
74	RE	04/04/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i>	Sai-azul	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304259	7481194	-	-
75	RE	04/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Sim	-	Soltura	04/04/2019	304209	7481049	-	-
76	RE	07/04/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	304287	7481145	-	-
-	AF	08/04/2019	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	Vulnerável	-
78	RE	09/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax perereca</i>	Perereca	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304290	7481162	-	-
-	AF	10/04/2019	1	AVIFAUNA	Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
80	RE	10/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303905	7480628	-	-
81	RE	16/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	304120	7480875	-	-
82	RE	16/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304094	7480754	-	-
83	RE	16/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303897	7480733	-	-
84	RE	16/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufo	<i>Rhinella icterica</i>	sapo-cururu	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304285	7481158	-	-
-	AF	16/04/2019	6	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufo-branco	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
87	RE	17/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303972	7480513	-	-
88	RE	14/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303894	780755	-	-
89	RE	22/04/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	304115	7480873	-	-
-	AF	27/04/2019	2	AVIFAUNA	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara ararauna</i>	Arara-carinada	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	Vulnerável	-
-	AF	01/05/2019	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Canidae	<i>Cercopithecus thomasi</i>	Chacorro-do-mato	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
93	RE	02/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303897	7480733	-	-
94	RE	03/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303861	7480395	-	-
95	RE	04/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304186	7480880	-	-
-	AF	05/05/2019	4	MASTOFAUNA	Primates	Cebidae	<i>Sapajus nigritus</i>	Macaco-prego	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
97	RE	07/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	FE	Sim	-	Soltura	07/05/2019	304169	7480883	-	-
98	RE	07/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	MA	Sim	-	Soltura	07/05/2019	304172	7480883	-	-
99	RE	07/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304228	7480910	-	-
100	RE	07/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra d'água	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	304089	7481002	-	-
101	RE	08/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Boana faber</i>	Sapo-ferreiro	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303877	7480718	-	-
-	AF	17/05/2019	6	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufo-branco	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	18/05/2019	2	MASTOFAUNA	Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	Vulnerável	-
104	RE	20/05/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	F	Sim	A	FE	Sim	-	Soltura	20/05/2019	304139	7480891	-	-
105	RE	30/05/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	F	Sim	A	ND	Sim	-	Soltura	-	304213	7480903	-	-
106	RE	01/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304095	7480890	-	-
107	RE	03/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304201	7480896	-	-
108	RE	07/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304229	7480905	-	-
-	AF	07/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Philedryas ofersi</i>	Cobra-cipó	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
110	RE	07/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304099	7480895	-	-
111	RE	10/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304105	7480902	-	-
112	RE	11/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Leiosauridae	<i>Urosthophus vauitleri</i>	Camaleãozinho	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304194	7480900	-	-
113	RE	12/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304172	7481028	-	-
114	RE	13/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Leiosauridae	<i>Urosthophus vauitleri</i>	Camaleãozinho	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304135	7480918	-	-
115	RE	14/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa - coral	S	Sim	F	MA	Não	-	Soltura	-	304261	7480983	-	-
-	AF	14/06/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	14/06/2019	2	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	14/06/2019	2	AVIFAUNA	Craciformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Jacuguçu	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	15/06/2019	6	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufo-branco	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	19/06/2019	2	AVIFAUNA	Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
121	RE	19/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304210	7480996	-	-
122	RE	20/06/2019	1	MASTOFAUNA	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Eptesicus sp.</i>	Morcego	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	304283	7481103	-	-
123	RE	20/06/2019	1	MASTOFAUNA	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis sp.</i>	Morcego	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	304283	7481103	-	-
124	RE	20/06/2019	1	MASTOFAUNA	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis sp.</i>	Morcego	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	304283	7481103	-	-

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMILIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
125	RE	28/06/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304088	7480880	-	-
-	AF	03/07/2019	7	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	-	-	A, J, F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/07/2019	6	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix sp.</i>	Sagui	-	-	A, J, F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
128	RE	11/07/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Mabuyidae	<i>Notomabuya frenata</i>	lagartixa	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304197	7480893	-	-
-	AF	16/07/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Urubitinga coronata</i>	águia-cinzenta	S	Não	J	ND	Não	-	-	-	-	-	-	Criticamente em Perigo
-	AF	16/07/2019	1	AVIFAUNA	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	Quase Ameaçada
131	RE	17/07/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibolia	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304182	7480905	-	-
132	RE	17/07/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibolia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304188	7480909	-	-
133	RE	17/07/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	J	FE	Não	-	Soltura	-	304169	7480904	-	-
134	RE	19/07/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibolia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304188	7480909	-	-
135	RE	22/07/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Pholidryas affersi</i>	Cobra-cipó	M	Não	A	FE	Sim	-	Óbito	22/02/2019	*	*	-	-
136	RE	08/08/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	Cobra d'água	F	Sim	A	MA	Sim	-	Soltura	11/11/2019	303969	7480341	-	-
137	RE	08/08/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibolia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304210	7480906	-	-
138	RE	12/08/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Sagui-de-tufo-preto	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304216	7480903	-	-
139	RE	12/08/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	Sagui-de-tufo-branco	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304216	7480903	-	-
140	RE	12/08/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	Sagui-de-tufo-branco	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304216	7480903	-	-
141	RE	14/08/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304187	7480885	-	-
142	RE	19/08/2019	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-roxa	S	Sim	F	MA	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
143	RE	19/08/2019	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-roxa	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	303989	7480971	-	-
144	RE	23/08/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	Sim	F	FE	Não	-	Soltura	-	303892	7480409	-	-
145	RE	28/08/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibolia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304179	7480894	-	-
-	AF	28/08/2019	1	AVIFAUNA	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	Quase Ameaçada
-	AF	28/08/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albigollis</i>	bacurau	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	3	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas pacazuro</i>	pomba-asa-branca	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	2	AVIFAUNA	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevisinho	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	2	AVIFAUNA	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i>	sai-azul	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	29/08/2019	2	AVIFAUNA	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	31/08/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	31/08/2019	1	AVIFAUNA	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	Quase Ameaçada
157	RE	02/09/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Sagui-de-tufo-preto	F	Sim	A	MA	Não	-	Óbito	27/11/2019	*	*	-	-
-	AF	02/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	02/09/2019	1	AVIFAUNA	Piciformes	Picidae	<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-ano-barrado	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	02/09/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter sp.</i>	gavião	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	02/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albigollis</i>	bacurau	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	02/09/2019	4	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	-	-	A, J	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	03/09/2019	2	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix sp.</i>	Sagui	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	03/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrhamphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	-	-	A	FE	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	03/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	03/09/2019	3	AVIFAUNA	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	socozinho	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	03/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia sp.</i>	Euphonia	-	-	A	FE	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	03/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis sp.</i>	Hydropsalis	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
169	RE	03/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Boana faber</i>	sapo-ferreiro	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
-	AF	04/09/2019	3	AVIFAUNA	Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-pelto-azul	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Apodiformes	Trochilidae	<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Gavião-de-rabo-branco	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	2	AVIFAUNA	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiúri	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	3	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	-	-	A, F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Stingiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	suiandara	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
179	RE	04/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella cfr. ornata</i>	sapo-curuzinho	S	Sim	J	ND	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	04/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albigollis</i>	bacurau	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	05/09/2019	2	AVIFAUNA	Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	06/09/2019	3	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufo-branco	-	-	A, J	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
184	RE	07/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella icterica</i>	sapo-cururu	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
185	RE	07/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Boana faber</i>	Sapo-ferreiro	S	Não	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMILIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
186	RE	09/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304092	7480882	-	-
-	AF	09/09/2019	2	AVIFAUNA	Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo chivi</i>	Juruviara	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
188	RE	10/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella schneideri</i>	sapo-curu	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
189	RE	11/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	J	MA	Não	-	Soltura	-	304204	7480897	-	-
-	AF	11/09/2019	2	AVIFAUNA	Anseriformes	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pê-vermelho	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	11/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	-	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
192	RE	12/09/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303892	7480409	-	-
193	RE	13/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibola	S	Não	F	FE	Não	-	Soltura	-	304240	7480899	-	-
194	RE	13/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis parvula</i>	Bacurau-chintã	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	-	304204	7480897	-	-
-	AF	13/09/2019	1	MASTOFAUNA	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca	-	-	J	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
196	RE	13/09/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304185	7480894	-	-
-	AF	16/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	lagartixa	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
198	RE	17/09/2019	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Avoante	-	Sim	O	-	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
199	RE	17/09/2019	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Avoante	-	Sim	O	-	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
-	AF	17/09/2019	2	AVIFAUNA	Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	17/09/2019	1	AVIFAUNA	Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	17/09/2019	1	AVIFAUNA	Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	caracará	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	17/09/2019	1	AVIFAUNA	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande	-	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
204	RE	17/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella sp. (girinos)</i>	Sapo	-	Sim	L	ND	Não	-	Soltura	-	303979	7480351	-	60 nº aproximado
205	RE	17/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella sp. (girinos)</i>	Sapo	S	Sim	F	ND	Não	-	Soltura	-	303979	7480351	-	-
206	RE	17/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Boana laber</i>	sapo-ferrêiro	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
207	RE	17/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus mystacinus</i>	Rã-de-bigodes	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
209	RE	18/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella icterica</i>	sapo-curu	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
210	RE	19/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibola	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303843	7480406	-	-
211	RE	19/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella sp. (girinos)</i>	Sapo	S	Não	L	ND	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	310 nº aproximado
212	RE	19/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella sp. (girinos)</i>	Sapo	S	Sim	F	ND	Não	-	Soltura	-	303979	7480351	-	21 nº aproximado
213	RE	19/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
214	RE	19/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
-	AF	20/09/2019	3	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	-	-	A, J	-	Não	-	-	-	-	-	-	-
216	RE	20/09/2019	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albigollis</i>	Bacurau	S	Não	A	MA	Não	-	Soltura	-	304204	7480897	-	-
217	RE	20/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	303967	7480349	-	-
218	RE	21/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibola	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304227	7480897	-	-
219	RE	21/09/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibola	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304234	7480901	-	-
220	RE	25/09/2019	1	AVIFAUNA	Craciformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Jacuguacu	M	Sim	A	ND	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
221	RE	26/09/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria Cavaleira de Rabo Enferrujado	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	-	303989	7480971	-	-
222	RE	26/09/2019	3	AVIFAUNA	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria Cavaleira de Rabo Enferrujado	S	Não	O	ND	Não	-	Soltura	-	303989	7480971	-	-
223	RE	28/09/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	Sim	J	MA	Não	-	Soltura	-	304231	7480898	-	-
225	RE	02/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus quibei</i>	Falsa - coral	D	Sim	J	FE	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
226	RE	02/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibola	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304231	7480898	-	-
227	RE	03/10/2019	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-roxa	F	Sim	J	MA	Não	-	Soltura	-	303989	7480971	-	-
228	RE	05/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	-
229	RE	07/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	-
230	RE	07/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	FE	Sim	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
231	RE	08/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella icterica</i>	sapo-curu	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	-
232	RE	08/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	-
233	RE	09/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibola	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304108	7480899	-	-
234	RE	09/10/2019	1	AVIFAUNA	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-queiro	S	Sim	O	ND	Não	-	Descarte	18/11/2019	-	-	-	-
235	RE	09/10/2019	1	AVIFAUNA	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-queiro	S	Sim	O	ND	Não	-	Descarte	18/11/2019	-	-	-	-
236	RE	09/10/2019	1	AVIFAUNA	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-queiro	S	Sim	O	ND	Não	-	Descarte	18/11/2019	-	-	-	-
237	RE	09/10/2019	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	-	304112	7480893	-	-
238	RE	09/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus nattereri</i>	Rã-de-quatro-olhos	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	-
239	RE	10/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	Lagarto-leiú	F	Sim	A	FE	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
240	RE	10/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella sp. (girinos)</i>	Sapo	S	Não	L	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	100
241	RE	11/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	F	Sim	A	FE	Sim	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
242	RE	11/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	-	303966	7480356	-	-
243	RE	14/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	cobra-verde	F	Sim	A	MA	Sim	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
244	RE	15/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Pholidryas olerisi</i>	Cobra-cipó	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	-	304177	7480905	-	-
-	AF	15/10/2019	1	AVIFAUNA	Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
246	RE	21/10/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
247	RE	21/10/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
248	RE	21/10/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMILIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
249	RE	21/10/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
-	AF	21/10/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	21/10/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	-	A	FE	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	22/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	24/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas olfersi</i>	Cobra-cipó	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
254	RE	29/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	31/10/2019	304087	7480899	-	-
255	RE	29/10/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	31/10/2019	304140	7480895	-	-
256	RE	06/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa - coral	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	08/11/2019	304206	7480900	-	-
257	RE	08/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella schneideri</i>	sapo-cururu	S	Não	F	ND	Não	-	Soltura	08/11/2019	303966	7480356	-	-
258	RE	08/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	MA	Sim	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
-	AF	11/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	Lagarto-teiú	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
260	RE	13/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	13/11/2019	304220	7481053	-	-
-	AF	14/11/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Sagu-de-tufu-preto	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	14/11/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Sagu-de-tufu-preto	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	14/11/2019	1	MASTOFAUNA	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Sagu-de-tufu-preto	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	14/11/2019	1	AVIFAUNA	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	Quase Ameaçada
265	RE	18/11/2019	1	MASTOFAUNA	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca	M	Sim	A	FE	Sim	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
-	AF	19/11/2019	1	AVIFAUNA	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	Quase Ameaçada
267	RE	22/11/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	Fim-fim	S	Sim	F	FE	Não	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
268	RE	25/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	-	Soltura	26/11/2019	304083	7480884	-	-
269	RE	26/11/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	F	Sim	A	FE	Sim	-	Óbito	27/11/2019	-	-	-	-
-	AF	27/11/2019	1	AVIFAUNA	Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	S	-	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	27/11/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	-	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	27/11/2019	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	-	A	FE	Não	-	-	-	-	-	-	-
270	RE	02/12/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	02/12/2019	303969	7480341	-	-
271	RE	02/12/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	02/12/2019	304269	7481199	-	-
272	RE	09/12/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	NA	A	FE	Não	-	Soltura	09/12/2019	304060	7481302	-	-
273	RE	13/12/2019	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	NA	A	FE	Não	-	Soltura	13/12/2019	304012	7482012	-	-
274	RE	06/01/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	06/01/2020	303969	7480341	-	-
275	RE	07/01/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	FE	Sim	-	Óbito	08/01/2020	*	*	-	-
276	RE	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	M	Sim	F	ND	Sim	-	Óbito	13/01/2020	-	-	-	-
277	RE	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	M	Sim	F	ND	Sim	-	Óbito	13/01/2020	-	-	-	-
278	RE	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	M	Sim	F	ND	Sim	-	Óbito	13/01/2020	-	-	-	-
279	RE	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	M	Sim	F	ND	Sim	-	Óbito	13/01/2020	-	-	-	-
280	RE	20/01/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra d'água	S	Sim	J	FE	Não	-	Soltura	20/01/2020	303966	7480356	-	-
281	RE	24/01/2020	1	AVIFAUNA	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bulbucos ibis</i>	Garça-vaqueira	F	Sim	A	ND	Não	-	CRAS	24/01/2020	-	-	-	-
282	RE	29/01/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	-	Soltura	31/01/2020	303923	7480346	-	-
283	RE	30/01/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	J	FE	Não	-	Soltura	31/01/2020	303924	7480352	-	-
284	RE	04/02/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Não	A	MA	Não	-	Soltura	05/02/2020	303923	7480348	-	-
285	RE	05/02/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Não	A	MA	Não	-	Soltura	06/02/2020	303923	7480343	-	-
286	RE	27/02/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	CRAS	27/02/2020	X	X	-	-
287	RE	27/02/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	CRAS	27/02/2020	X	X	-	-
288	RE	27/02/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruira	S	Sim	F	ND	Não	-	CRAS	27/02/2020	X	X	-	-
289	RE	03/03/2020	1	AVIFAUNA	Nyctibiformes	Nyctibidae	<i>Nyctibius griseus</i>	Mãe-da-lua	S	Sim	J	ND	Não	-	Óbito	05/03/2020	-	-	-	-
290	RE	05/03/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	05/03/2020	304108	7480893	-	-
291	RE	10/03/2020	1	AVIFAUNA	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Bacurau	F	Sim	A	ND	Não	-	Óbito	10/03/2020	-	-	-	-
292	RE	12/03/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	MA	Não	-	Soltura	12/03/2020	304143	7480878	-	-
293	RE	27/03/2020	1	MASTOFAUNA	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Philander Opossum</i>	Cuíca	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	27/03/2020	304002	7480872	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	J	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	A	FE	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	A	MA	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	A	FE	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	13/01/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	S	Não	F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	15/01/2020	1	AVIFAUNA	Crociformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Jacuguape	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	25/01/2020	1	AVIFAUNA	Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	Carrapateiro	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	02/03/2020	3	AVIFAUNA	Passeriformes	Thraupidae	<i>S. ardesiaca</i>	Papa capim	S	Não	F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	06/03/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i>	Asa Branca	S	Não	F	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	24/03/2020	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Canidae	<i>Cerdocoyon thous</i>	Cachorro-do-mato	S	Não	J	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMILIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
294	RE	01/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Não	A	MA	Não	-	Soltura	01/04/2020	304145	7480881	-	-
295	RE	01/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	01/04/2020	304143	7480888	-	-
296	RE	03/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Não	A	FE	Não	-	Soltura	03/04/2020	304102	7480894	-	-
297	RE	03/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	MA	Não	-	Soltura	04/04/2020	304096	7480897	-	-
298	RE	08/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	J	MA	Não	-	Soltura	08/04/2020	304089	7480895	-	-
299	RE	16/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Hyla fabes</i>	Sapo ferreiro	S	Não	A	MA	Não	-	Soltura	16/04/2020	303982	7480631	-	-
300	RE	21/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Não	J	ND	Não	-	Soltura	21/04/2020	304109	7480887	-	-
301	RE	23/04/2020	1	AVIFAUNA	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	Curruira	S	Sim	F	ND	Não	-	Soltura	27/04/2020	304201	7480952	-	-
302	RE	24/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	MA	Não	-	Soltura	25/04/2020	304130	7480890	-	-
-	AF	01/04/2020	4	AVIFAUNA	Psittaciformes	Chordata	<i>Brotogeris chiriri</i>	Periquito-de-encontro-amarelo	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	17/04/2020	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço-cacheiro	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	23/04/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	Lagarto-teiú	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
-	AF	06/04/2020	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão pelada	S	Não	A	ND	Não	-	-	-	-	-	-	-
303	RE	04/05/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	F	Sim	A	FE	Sim	Não	Óbito	04/05/2020	-	-	-	-
304	RE	07/05/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Não	F	ND	Não	Não	Soltura	07/05/2020	304013	7480277	-	-
305	RE	08/05/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Não	A	FE	Não	Não	Soltura	09/05/2020	304143	7480892	-	-
306	RE	05/06/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	J	MA	Não	Não	Soltura	05/06/2020	305306	7477980	-	-
307	RE	16/06/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	16/06/2020	304628	7480299	-	-
308	RE	24/06/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	FE	Não	Não	Soltura	24/06/2020	304151	7480881	-	-
309	RE	24/06/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	M	Sim	F	ND	Não	Não	Óbito	02/12/2020	-	-	-	-
310	RE	06/07/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	06/07/2020	304165	7480891	-	-
311	RE	10/07/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	10/07/2020	304153	7480872	-	-
312	RE	21/07/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	21/07/2020	304117	7480892	-	-
313	RE	28/07/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	28/07/2020	304108	7480898	-	-
314	RE	30/07/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	30/07/2020	304122	7480889	-	-
315	RE	27/08/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	FE	Sim	Sim	Mata Ciliar	28/07/2020	-	-	-	-
316	RE	23/09/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	F	Sim	F	FE	Não	Não	Óbito	02/12/2020	-	-	-	-
317	RE	24/09/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	cobra-verde	S	Sim	F	FE	Não	Não	Soltura	24/09/2020	304088	7480909	-	-
318	RE	11/10/2020	1	HERPETOFAUNA	Testudines	Chelididae	<i>Hydromedusa tectifera</i>	Çagado-pescoco-de-cobra	S	Não	A	FE	Não	Não	Soltura	11/10/2020	304306	7481291	-	-
319	RE	14/10/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas olfersi</i>	Cobra-Cipó-Verde	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	14/10/2020	305309	7478033	-	-
320	RE	17/10/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas olfersi</i>	Cobra-Cipó-Verde	S	Sim	A	FE	Não	Sim	Soltura	19/10/2020	304110	7480947	-	-
321	RE	03/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Reptilia	<i>Salvator merianae</i>	Teiú	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	03/11/2020	304102	7480086	-	-
322	RE	04/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Lophis typhlus</i>	Cobra-verde	S	Sim	J	FE	Não	Não	Soltura	04/11/2020	304101	7480779	-	-
323	RE	04/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Anura	Rachophoridae	<i>Polypedates leucomtax</i>	Perca-dourada	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	04/11/2020	305771	7477049	-	-
324	RE	07/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	07/11/2020	305767	7477040	-	-
325	RE	11/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	11/11/2020	305771	7477044	-	-
326	RE	17/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	J	FE	Não	Sim	Soltura	18/11/2020	305756	7477053	-	-
327	RE	30/11/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	F	Sim	F	FE	Não	Não	Óbito	02/12/2020	-	-	-	-
328	RE	02/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Não	F	ND	Não	Não	Soltura	02/12/2020	305790	7477002	-	-
329	RE	07/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	08/12/2020	305794	7477011	-	-
330	RE	08/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	08/12/2020	305796	7477013	-	-
331	RE	08/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	J	FE	Não	Não	Soltura	08/12/2020	305796	7477015	-	-
332	RE	22/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	23/12/2020	304012	7482012	-	-
333	RE	28/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	28/12/2020	304106	7480891	-	-
334	RE	28/12/2020	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	28/12/2020	304206	7480900	-	-
335	RE	04/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	04/01/2021	304146	7480889	-	-
336	RE	05/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	05/01/2021	304089	7480895	-	-
337	RE	05/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	F	ND	Sim	Não	Óbito	14/06/2021	-	-	-	-
338	RE	08/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	08/01/2021	305801	7477088	-	-
339	RE	08/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	F	MA	Não	Não	Soltura	12/01/2021	305742	7477109	-	-
340	RE	09/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	12/01/2021	305735	7477106	-	-
341	RE	20/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	23/01/2021	305796	7477046	-	-
342	RE	20/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	ND	Não	Não	Não	Soltura	23/01/2021	305762	7477071	-	-
343	RE	22/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	23/01/2021	305782	7477092	-	-
344	RE	23/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	27/01/2021	305793	7477016	-	-
345	RE	26/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	27/01/2021	305777	7477024	-	-
346	RE	26/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	27/01/2021	305790	7477011	-	-
347	RE	26/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	27/01/2021	305777	7477024	-	-
348	RE	28/01/2021	1	HERPETOFAUNA	Anura	Bufoinidae	<i>Rhinella sp.</i>	Sapo	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	28/01/2021	304165	7480891	-	-
349	RE	11/02/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Columbidae	<i>Helicops angulatus</i>	Cobra d'água	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	12/02/2021	305307	7478030	-	-
350	RE	11/02/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	15/02/2021	304170	7480991	-	-

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMILIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
351	RE	12/02/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	13/01/2021	305281	7479989		
352	RE	15/02/2021	1	MASTOFAUNA	Carnivora	Canidae	<i>Cerdocoyon thous</i>	Cachorro-do-mato	F	Sim	J	MA	Não	Não	Obito	14/06/2021	X	X		
353	RE	02/03/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	03/03/2021	304105	7481159		
354	RE	12/02/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	12/03/2021	305289	7479992		
355	RE	12/03/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	12/03/2021	304150	7481154		
356	RE	19/03/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa-coral	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	20/03/2021	305791	7477015		
357	RE	22/03/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viveperidae	<i>Lophis typhlus</i>	cobra do capim	S	Sim	A	ND	Não	Não	soltura	23/03/2021	304106	7480891		
358	RE	23/03/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	soltura	23/03/2021	304106	7480891		
359	RE	31/03/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	31/03/2021	305289	7479992		
360	RE	08/04/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	08/04/2021	304007	7480972		
361	RE	12/04/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	J	MA	Não	Sim	Soltura	13/04/2021	304139	7480883		
362	RE	15/04/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	17/04/2021	304091	7480892		
363	RE	22/04/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	24/04/2021	304044	7480875		
364	RE	22/04/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	24/04/2021	304117	7480876		
365	RE	23/04/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	J	MA	Não	Não	Soltura	24/04/2021	304158	7480871		
366	RE	17/05/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	17/05/2021	303949	7480921		
367	RE	21/05/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa-coral	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	22/05/2021	304089	7480948		
368	RE	28/05/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	29/05/2021	303968	7480984		
369	RE	01/06/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	02/06/2021	303848	7480968		
370	RE	18/06/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	F	Sim	J	MA	Sim	Sim	Soltura	30/06/2021	304089	7480948		
371	RE	19/06/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	21/06/2021	303930	7480862		
372	RE	21/07/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa-coral	F	Não	F	ND	Sim	Não	Obito	x	x	x		
373	RE	24/07/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	30/07/2021	304021	7480945		
374	RE	29/07/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	31/07/2021	303990	7480947		
375	RE	03/08/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	04/08/2021	304105	7480869		
376	RE	04/08/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	04/05/2021	304091	7480853		
377	RE	04/08/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	05/08/2021	305790	7777013		
378	RE	05/08/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	07/08/2021	304069	7480891		
379	RE	30/08/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	31/08/2021	304118	7480879		
380	RE	31/08/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	31/08/2021	304157	7480869		
381	RE	02/09/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	03/09/2021	303985	7480887		
382	RE	03/09/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Dormideira	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	04/09/2021	303892	7480936		
383	RE	09/09/2021	1	HERPETOFAUNA	Chelonia	Emyidae	<i>Trachemys dorbigni</i>	Tigre d'água	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	09/09/2021	304302	7481299		
384	RE	10/09/2021	1	AVIFAUNA	Craciformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Jacuguagu	S	Sim	F	ND	Não	Sim	Mata Ciliar	18/11/2021	x	x		
385	RE	14/10/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas oellersi</i>	Cobra-Cipó-Verde	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	15/10/2021	314114	7480001		
386	RE	16/10/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	cobra-verde	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	16/10/2021	304059	7481000		
387	RE	20/10/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	26/10/2021	304022	7481041		
388	RE	25/10/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	26/10/2021	303966	7481098		
389	RE	27/10/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	28/10/2021	303944	7481178		
390	RE	29/10/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	MA	Não	Não	Soltura	29/10/2021	303889	7480997		
391	RE	03/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	03/11/2021	304049	7480862		
392	RE	09/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	10/11/2021	304031	7480933		
393	RE	10/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	J	ND	Sim	Sim	Obito	12/11/2021	x	x		
394	RE	17/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	17/11/2021	303916	7481198		
395	RE	25/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	26/11/2021	304122	7480883		
396	RE	25/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	26/11/2021	304138	7480877		
397	RE	27/11/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	ND	Sim	Sim	Obito	28/11/2021	x	x		
398	RE	07/12/2021	1	MASTOFAUNA	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti	S	Sim	F	FE	Não	Não	Soltura	07/12/2021	304689	7479838		
399	RE	16/12/2021	1	HERPETOFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina tabacoti</i>	Rolinha-roxa	S	Sim	F	ND	Não	Sim	Soltura	18/12/2021	305151	7480366		
400	RE	27/12/2021	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	28/12/2021	303951	7481041		
401	RE	03/01/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Falsa-coral	F	Não	F	ND	Sim	Não	Soltura	04/01/2022	303951	7481041		
402	RE	07/01/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	J	ND	Sim	Sim	Soltura	12/01/2022	303951	7481041		
403	RE	07/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	Cobra-de-jardim	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	07/02/2022	305280	7477983		
404	RE	07/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas mikanii</i>	Jararaquinha dormideira	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	07/02/2022	305280	7477983		
405	RE	08/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	09/02/2022	305249	7478007		
406	RE	09/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	09/02/2022	305249	7478008		
407	RE	17/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	J	FE	Sim	Não	Obito	18/02/2022	x	x		
408	RE	24/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	F	FE	Não	Não	Soltura	26/02/2022	303919	7480366		
409	RE	24/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	J	FE	Não	Não	Soltura	26/02/2022	303918	7480363		
410	RE	25/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas mikanii</i>	Papa Ilesma	S	Sim	F	FE	Não	Não	Soltura	26/02/2022	305077	7480064		
411	RE	25/02/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas-cabeças	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	26/02/2022	303888	74803556		

ID	Tipo	Data	NÚMERO DE INDIVÍDUOS	GRUPO	ORDEM	FAMÍLIA	Nome científico	Nome popular	Cond. do Animal	Base de Fauna	Estágio de desenvolvimento (no resgate)	Sexo	Acidentada em decorrência da obra	Quarentena	Destino	Data de destinação	Coordenada Soltura X	Coordenada Soltura Y	Espécies categorizadas pelo Decreto 63.853/2018	Informações adicionais
412	RE	04/03/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	jararaca	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	04/02/2022	305306	7477993		
413	RE	07/03/2022	1	MASTOFAUNA	Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	F	Sim	A	FE	Não	Sim	Obito	05/04/2022	x	x		
414	RE	11/03/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas-cabeças	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	11/03/2022	303889	74803555		
415	RE	16/03/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	23/03/2022	305306	7477993		
416	RE	23/03/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	23/03/2022	305280	7477993		
417	RE	23/03/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	23/03/2022	305306	7477993		
418	RE	25/03/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas-cabeças	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	26/03/2022	303918	7481137		
419	RE	01/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	01/04/2022	303829	7480377		
420	RE	08/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	08/04/2022	303829	7480377		
421	RE	08/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	Cobra-de-jardim	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	08/04/2022	305280	7477993		
422	RE	12/04/2022	1	AVIFAUNA	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garça-branca-grande	F	Sim	A	ND	Não	Não	Mata ciliar	12/04/2022	x	x		
423	RE	12/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	MA	Sim	Sim	Obito	28/04/2022	x	x		
424	RE	12/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	12/04/2022	303829	7480377		
425	RE	22/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	FE	Sim	Sim	Quarentena	X	X	X		
426	RE	28/04/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas-cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	28/04/2022	303920	7481138		
427	RE	06/05/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	Cobra-de-jardim	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	06/05/2022	305283	7477992		
428	RE	03/06/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	A	MA	Não	Não	Soltura	03/06/2022	303931	7480431		
429	RE	14/06/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	F	MA	Não	Não	Soltura	14/06/2022	303829	7480377		
430	RE	22/06/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	22/06/2022	303857	7480831		
431	RE	29/06/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	29/06/2022	303857	7480831		
432	RE	29/06/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas mikanii</i>	Papa lesma	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	29/06/2022	303857	7480831		
433	RE	18/07/2022	1	AVIFAUNA	Apodiformes	Trochilidae	<i>Chionomesa lactea</i>	Beija-flor-de-peito-azul	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	18/07/2022	305280	7477993		
434	RE	11/08/2022	1	AVIFAUNA	Psittaciforme	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Periquitão	F	Sim	A	ND	Sim	Sim	Mata ciliar	11/07/2022	x	x		
435	RE	15/08/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas mikanii</i>	Papa lesma	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	15/08/2022	303852	7480836		
436	RE	16/08/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus reginae</i>	Jabutibóia	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	16/08/2022	303852	7480837		
437	RE	17/08/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	17/08/2022	303931	7480438		
438	RE	23/08/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	TEIU	F	Sim	A	ND	Sim	Sim	Soltura	28/10/2022	303829	7480377		
439	RE	10/09/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	10/09/2022	303919	7480366		
440	RE	14/09/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	Falsa-coral	S	Sim	A	FE	Não	Não	Soltura	14/09/2022	303904	7480374		
441	RE	06/10/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas mikanii</i>	Papa lesma	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	06/10/2022	303851	7480837		
442	RE	07/11/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Elaipidae	<i>Micrurus frontalis</i>	Coral-verdadeira	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	07/11/2022	303894	7480367		
443	RE	12/11/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	Cobra-de-jardim	S	Sim	J	ND	Não	Não	Soltura	12/11/2022	303852	7480837		
444	RE	21/11/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Elaipidae	<i>Micrurus frontalis</i>	Coral-verdadeira	S	Sim	F	ND	Não	Não	Soltura	21/11/2022	303895	7480378		
445	RE	28/11/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-duas-cabeças	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	28/11/2022	303894	7480398		
446	RE	29/11/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	F	Sim	A	ND	Sim	Sim	Base de fauna	-	-	-		
447	RE	30/11/2022	1	HERPETOFAUNA	Squamata	Viperidae	<i>Helicops sp.</i>	Cobra d'água	S	Sim	A	ND	Não	Não	Soltura	01/12/2022	304117	7480392		
448	RE	05/12/2022	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila sp.</i>	Pomba	F	Sim	A	ND	Não	Não	Mata ciliar	05/12/2022	x	x		
449	RE	05/12/2022	1	AVIFAUNA	Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila sp.</i>	Pomba	F	Sim	A	ND	Não	Não	Mata ciliar	05/12/2022	x	x		


Legenda: Tipo de registro: AF = Afugentamento (incluindo espontâneo), RE = Resgate; Fitofisionomia/ambiente: AA = Antropizado, PA = Pasto, TR = Trilha, CA = Canteiro de Obras; CUP = Cupinzeiro, FES = Floresta Estacional Semidecidual, AQ = Ambiente aquático; Condições meteorológicas: AB = Aberto, CH = Chuvoso, NU = Nublado; Etapa da supressão: NI = Não iniciada, AP = Após a supressão, DU = Durante, RS = Remoção de solo, NA = Não se aplica; Condições do Animal: F = Ferido, M = Morto, S = Saudável; Estágio de desenvolvimento: A = Adulto, J = Jovem, F = Filhote, L = Larva (girino), O = Ovo; Sexo: FE = Fêmea, MA = Macho, ND = Não determinado.

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.04-PMCF



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	439	DATA	10/09/2022	LOCAL / ÁREA	Lote 5
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Crotalus durissus</i>		Nome popular	cascavel	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	78(cm)	14(cm)	1,1(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304424	747814	REALOCAÇÃO	303919	7480366
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO ADULTO, NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO NO LOTE 5.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL ADULTO, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				10/09/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	440	DATA	10/09/2022	LOCAL / ÁREA	Lote 6
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Oxyrhopus guibei</i>		Nome popular	Falsa coral	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	60(cm)	19(cm)	0,286(kg)	ND	Higido
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304376	7479958	REALOCAÇÃO	303904	7480374
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	Soltura
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO ADULTO, SEXO NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO NO LOTE DE 6					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL ADULTO, SE ENCONTRAVA ATIVO E APTO, A SOLTURA.					
Pedreira/SP				10/09/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	441	DATA	15/10/2022	LOCAL / ÁREA	PLANTIO
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Dipsas mikanii</i>		Nome popular	Papa lesma	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	23(cm)	08(cm)	0.002(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304914	7478229	REALOCAÇÃO	303851	7480837
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Filhote	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO FILHOTE, NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO NO FUNDO DA BASE DE FAUNA.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL FILHOTE, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				15/11/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	442	DATA	07/11/2022	LOCAL / ÁREA	Eixo
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Micrurus frontalis</i>		Nome popular	Papa lesma	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	26(cm)	2,5(cm)	0.011(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304795	7480811	REALOCAÇÃO	303894	7480367
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Filhote	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO FILHOTE, SEXO NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO AO LADO DA PAREDE DO EIXO DA BARRAGEM.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL FILHOTE, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				07/11/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	443	DATA	12/11/2022	LOCAL / ÁREA	FERRAGEM
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>		Nome popular	Cobra-de-jardim	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	60(cm)	10(cm)	0.150(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	305220	7480724	REALOCAÇÃO	303852	7480837
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Filhote	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO JUVENIL, SEXO NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO NA AREA DE DOBRA DA FERRAGEM.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL JUVENIL SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				12/112022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	444	DATA	21/11/2022	LOCAL / ÁREA	EIXO
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Micrurus frontalis</i>		Nome popular	Cobra capim	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	26(cm)	2(cm)	0.10(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304856	7481006	REALOCAÇÃO	303894	7480367
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Filhote	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO FILHOTE, SEXO NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO PROXIMO A SALA DA SEGURANÇA NO EIXO DA BARRAGEM.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL FILHOTE, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				21/11/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	445	DATA	28/11/2022	LOCAL / ÁREA	EIXO
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Amphisbaena alba</i>		Nome popular	Cobra de duas cabeças	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	52(cm)	3(cm)	0.103(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304908	7480938	REALOCAÇÃO	303894	7480367
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO ADULTO, SEXO NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO PROXIMO AO EIXO DA BARRAGEM.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				02/11/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	446	DATA	29/11/2022	LOCAL / ÁREA	EIXO
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Crotalus durissus</i>		Nome popular	Cascavel	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	26(cm)	2(cm)	0.10(kg)	ND	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	305018	7480549	REALOCAÇÃO	303894	7480367
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO ADULTO, SEXO NÃO IDENTIFICADO, RESGATADO NO LOTE 9 DO PLANTIO, PROXIMO A CARPINTARIA.					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL ADULTO, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				21/11/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	447	DATA	30/11/2022	LOCAL / ÁREA	ESTRADA
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Helicops sp.</i>		Nome popular	Cobra d'agua	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	71(cm)	23(cm)	0.359(kg)	FEMEA	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304874	7480045	REALOCAÇÃO	303894	7480367
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	SOLTURA
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO ADULTO, SEXO FEMEA, RESGATADO PROXIMO A PONTE QUE LIGA PEDREIRA CAMPINAS					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL ADULTO, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. APTO A SOLTURA.					
Pedreira/SP				01/12/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES


RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	448	DATA	05/12/2022	LOCAL / ÁREA	EIXO BARRAGEM
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Leptotila sp.</i>		Nome popular	pomba	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	11(cm)	3(cm)	0.52(kg)	INDEFINIDO	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304774	7480809	REALOCAÇÃO	Mamta ciliar	mata ciliar
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	mata ciliar
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO FILHOTE SEXO INDEFINIDO, RESGATADO NO EIXO DA BARRAGEM					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL FILHOTES, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. ENCAMINHADO PARA MATA CILIAR					
Pedreira/SP				01/12/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		



PRONTUÁRIO DE ANIMAIS SILVESTRES

RESGATE E REALOCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE

FICHA ID	449	DATA	05/12/2022	LOCAL / ÁREA	EIXO BARRAGEM
ESPÉCIE NATIVA					
Nome Científico	<i>Leptotila sp.</i>		Nome popular	pomba	
DADOS BIOMÉTRICOS	CORPO	CAUDA	PESO	SEXO	ESTADO FÍSICO
	10(cm)	4(cm)	0.050(kg)	INDEFINIDO	HIGIDO
COORDENADAS UTM - FUSO 23 S:					
RESGATE	304774	7480809	REALOCAÇÃO	Mata ciliar	Mata ciliar
MARCAÇÃO:	Não	IDADE	Adulto	DESTINAÇÃO:	Mata ciliar
					
HISTÓRICO DO RESGATE: MANEJO					
INDIVÍDUO FILHOTE SEXO INDEFINIDO, RESGATADO NO EIXO DA BARRAGEM					
ANAMNESE E OBSERVAÇÕES					
ANIMAL FILHOTES, SE ENCONTRAVA ATIVO E SEM LESÕES APARENTES. ENCAMINHADO PARA MATA CILIAR					
Pedreira/SP				01/12/2022	
MÉDICO VETERINÁRIO			COORDENADOR GERAL		
NOEL EDUARDO DE OLIVEIRA CINTRA CRMV/SP 42.786			Luis Alberto de Oliveira CREA - 5063209653-SP 2		

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.05-PMCF

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	SEXO	IDADE	RG
<i>Leptodactylus sp.</i>	<i>Belinha</i>		J	41553
<i>Leptodactylus sp.</i>	<i>Belinha</i>		J	41554

DATA DA ENTRADA

RETENÇÃO DEPÓSITO

PROCEDÊNCIA

- | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ATROPELAMENTO | <input type="checkbox"/> TRÁFICO | <input type="checkbox"/> CAÇA | <input type="checkbox"/> DOENTE |
| <input type="checkbox"/> ELETROCUÇÃO | <input type="checkbox"/> ÓRFÃO | <input type="checkbox"/> LINHA DE PIPA | <input type="checkbox"/> AGREDIDO |
| <input type="checkbox"/> QUEIMADA | <input type="checkbox"/> ATAQUE DE CÃO | <input type="checkbox"/> RESGATE URBANO | <input type="checkbox"/> OUTROS |

Detalhar procedência: *Estação Souza Pedreira Fazenda Ingatuba*

Cidade/Estado: *Pedreira* Trazido por: *Prisioneiro pedreira*

HISTÓRICO / tempo de cativeiro, tipo de alimentação, comportamento, condições em que foi encontrado, método de captura e transporte.

Não há relato de construção ou de...

ESTADO DE SAÚDE NA ENTRADA E ALTERAÇÕES EVIDENTES

Sua saúde...

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Luiz Renato de Jesus

Nome legível

[Assinatura]

Assinatura

DECLARAÇÃO

Eu, *Nod edna do O Cinto*, portador do RG/RE *40359760-2*, do(a) (instituição/corporação) *Barragem pedreira* situado/residente à *Estação Souza Pedreira* no município de *Pedreira*, estado de *SP*, entrego à Associação Mata Ciliar o(s) espécime(s) biológico(s) acima identificado(s), ficando a critério desta instituição dar o destino que julgar mais adequado ao(s) mesmo(s).

Jundiaí, *8* de *Dezembro* de *2022*

Assinatura:

[Assinatura]

Telefone: *15 996570360*

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.06-PMCF



Formulário para o Registro de Atropelamento de Espécimes da Fauna

Nome do empreendimento:		Barragem Pedreira								
Nome do coletor:		Noel Eduardo de Oliveira Cintra			Nº do formulário:		59			
Data da coleta:		01/10/2022	Horário:		09:00	Tipo de coleta:		manual		
Trecho:		Estrada		Município:		Pedreira	UF:	SP		
Coordenada UTM	ZONA:	23 S	Norte	305124		Este	7482145	Km:	-	
Tipo de rodovia:		Não pavimentada		Número de pistas:		Simples		Número total de faixas:		1
Tipo de pavimento:		Terra		Se outro, qual?		-				
Divisão entre as pistas:		Não		Se outro, qual?		-				
Velocidade máxima permitida no trecho:		40 km/h								
Trecho com alguma intervenção:		-		Se sim, qual?		-				
Vazamento de granel alimentício na pista:		Não		Se sim, qual?		-				
Grupo taxonômico:				Tipo de registro:		Fotográfico				
Nome científico:		<i>Salvator merianae</i>		Nome comum:		Teiu				
Valor biológico:		Encaminhado para intuição								
Se ameaçado, qual(is) lista(s)/graus(s) de ameaça:		Não								
Sexo:		ND		Se fêmea, informar:		*		Estágio de maturação:		Adulto
Observações gerais:		Animal resgatado em óbito								
Destinação:		Instituição		Se encaminhado À Instituição, qual?		Unifaj				

Registros fotográfico:



Foto 01 - Registro do animal no local.



Formulário para o Registro de Atropelamento de Espécimes da Fauna

Nome do empreendimento:		Barragem Pedreira					
Nome do coletor:		Noel Eduardo de Oliveira Cintra			Nº do formulário:		60
Data da coleta:		Horário:		Tipo de coleta:		manual	
24/10/2022		09:00		manual			
Trecho:		Estrada		Município:		Pedreira	
Coordenada UTM		ZONA:		Norte		304890	
		23 S		Este		7480073	
						Km: -	
Tipo de rodovia:		Não pavimentada		Número de pistas:		Simples	
						Número total de faixas: 1	
Tipo de pavimento:		Terra		Se outro, qual?		-	
Divisão entre as pistas:		Não		Se outro, qual?		-	
Velocidade máxima permitida no trecho:						40 km/h	
Trecho com alguma intervenção:		-		Se sim, qual?		-	
Vazamento de granel alimentício na pista:		Não		Sem sim, qual?		-	
Grupo taxonômico:				Tipo de registro:		Fotográfico	
Nome científico:		<i>Micrurus frontalis</i>		Nome comum:		Coral-Verdadeira	
Valor biológico:						Encaminhado para intuição	
Se ameaçado, qual(is) lista(s)/graus(s) de ameaça:						Não	
Sexo:		ND		Se fêmea, informar:		*	
				Estágio de maturação:		Adulto	
Observações gerais:						Animal resgatado em óbito	
Destinação:		Instituição		Se encaminhado À Instituição, qual?		Unifaj	

Registros fotográfico:



Foto 01 - Registro do animal no local.



Formulário para o Registro de Atropelamento de Espécimes da Fauna

Nome do empreendimento:		Barragem Pedreira							
Nome do coletor:		Noel Eduardo de Oliveira Cintra			Nº do formulário:		61		
Data da coleta:		08/12/2022	Horário:		14:54	Tipo de coleta:		manual	
Trecho:		Estrada		Município:		campinas	UF:	SP	
Coordenada UTM	ZONA:	23 S	Norte	304604		Este	7479469	Km:	-
Tipo de rodovia:		Não pavimentada	Número de pistas:		Simples	Número total de faixas:		1	
Tipo de pavimento:		Terra			Se outro, qual?		-		
Divisão entre as pistas:		Não			Se outro, qual?		-		
Velocidade máxima permitida no trecho:		40 km/h							
Trecho com alguma intervenção:		-			Se sim, qual?		-		
Vazamento de granel alimentício na pista:		Não			Sem sim, qual?		-		
Grupo taxonômico:		Tipo de registro:			Fotográfico				
Nome científico:		<i>Salvator merianae</i>			Nome comum:		Teiu		
Valor biológico:		Animal sem aproveitamento de carcaça							
Se ameaçado, qual(is) lista(s)/graus(s) de ameaça:		Não							
Sexo:	ND	Se fêmea, informar:		*	Estágio de maturação:		Adulto		
Observações gerais:		Animal resgatado em óbito							
Destinação:		Animal sem aproveitamento de carcaça			Se encaminhado À Instituição, qual?				

Registros fotográfico:



1 - FOTO DO ANIMAL NO MOMENTO DO RESGATE

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.07-PMCF

MONITORAMENTO/MAJEIO DE FAUNA EM RODOVIAS																							
Ocorrência	ANO	Mês	Data	Hora	Características da Via	Características do Entorno	Rodovia	km	Sentido	Coordenadas Geográficas (UTM) Resgate			Identificação taxonômica				Detalhamento da fauna impactada			Coordenadas Geográficas (UTM) destino			Observações
										UTM-X	UTM-Y	Fuso	Classificação	Grupo	Nome científico	Popular	Quantidade	Situação do animal	Destinação	UTM - X	UTM - Y	Fuso	
Atropelamento	2019	FEV	11/02/2019	7:30	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304637	7479519	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra D'agua	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	FEV	13/02/2019	8:16	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304637	7479524	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra D'agua	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	FEV	13/02/2019	10:50	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304402	7481358	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Callitrix jacchus</i>	Saguí-do-tufo branco	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	MAR	07/03/2019	12:03	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304723	7480784	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Phyllorhynchus olfersii</i>	Cobra-cipó	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	MAR	11/03/2019	07:50	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304542	7478861	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Lyophis Percolloryx</i>	Cobra-de-capim	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	MAR	11/03/2019	10:35	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304822	7479661	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-cega	2	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	MAR	26/03/2019	07:20	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304234	7481395	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu-galinha	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	ABR	01/04/2019	19:35	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305020	7480098	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	ABR	05/04/2019	11:30	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	303814	7478268	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	ABR	10/04/2019	08:09	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304818	7480232	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Coral-falsa	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	JUN	11/06/2019	13:30	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304716	7487620	23	Silvestre	Avifauna	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	JUN	21/06/2019	18:45	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304734	7480734	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	Jararquinha dormideira	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	JUL	23/07/2019	08:03	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	30408	7480087	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Didelphis albiventris</i>	Gamba da orelha branca	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	JUL	27/07/2019	20:27	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305092	7479952	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Didelphis albiventris</i>	Gamba da orelha branca	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	AGO	10/08/2019	19:30	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304933	7480131	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Coral-falsa	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	OUT	10/10/2019	10:10	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304806	7480206	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Salvator mianae</i>	teíu	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	OUT	11/10/2019	18:00	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304406	7480885	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Amphisbaena alba</i>	cobra-cega	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	OUT	14/10/2019	08:00	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304170	7480561	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	Cobra-verde	1	Ferido	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	OUT	18/10/2019	09:15	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304922	7480135	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Phyllorhynchus olfersii</i>	Cobra-cipó	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	OUT	29/10/2019	01:10	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305003	7480117	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu-galinha	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	NOV	07/11/2019	07:32	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304810	7482091	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Didelphis sp.</i>	Gamba	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	NOV	05/11/2019	09:27	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304521	7481517	23	Silvestre	Herpetofauna - anfíbios	<i>Rhinella sp.</i>	Sapo cururu	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	NOV	06/11/2019	10:19	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304401	7479188	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Didelphis aurita</i>	Gamba da orelha preta	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	NOV	22/11/2019	11:27	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304983	7480131	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Helicopsis modestus</i>	Cobra D'agua	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	NOV	26/11/2019	23:50	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304751	7480749	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	jararquinha dormideira	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	NOV	27/11/2019	16:28	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305156	7479831	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Oxyrhopus gubei</i>	Coral-falsa	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	DEZ	03/12/2019	20:57	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304594	7481791	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	jararquinha dormideira	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	DEZ	09/12/2019	21:13	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304960	7480399	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Oxyrhopus Gubei</i>	Coral-falsa	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	DEZ	13/12/2019	08:20	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305802	7477586	23	Silvestre	Avifauna	<i>Coragyps atratus</i>	Urubu-de-cabeça-preta	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2019	DEZ	17/12/2019	11:07	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304794	7480376	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Pholidryas Olfersii</i>	Cobra-cipó	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	JAN	24/01/2020	10:00	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304913	7480284	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	jararquinha dormideira	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	JAN	08/02/2020	10:30	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305003	7480489	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	jararquinha dormideira	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	MAR	14/03/2020	11:30	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304806	7480206	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Amphisbaena</i>	Cobra-cega	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	MAR	19/03/2020	12:40	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304406	7480885	23	Silvestre	Avifauna	<i>Penelope obscura</i>	lacu	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	ABR	13/04/2020	19:07	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304332	7481222	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	1	Morto	Instituições científicas	252952.17	7403640.79	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	JUL	30/07/2020	09:08	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304881	7479529	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Crotalus durissus</i>	Cascavel	1	Morto	Instituições científicas	292924.73	7486385.12	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	AGO	14/08/2020	10:00	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304804	7480607	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Cercopithecus thomasi</i>	Cachorro-do-mato	1	Morto	Instituições científicas	292924.73	7486385.12	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	AGO	27/08/2020	07:00	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304350	7480240	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Capivara	1	Morto	Instituições científicas	292924.73	7486385.12	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	SET	14/09/2020	08:20	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304841	7480562	23	Silvestre	Mastofauna	<i>Cercopithecus thomasi</i>	Cachorro-do-mato	1	Morto	Instituições científicas	292924.73	7486385.12	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	OUT	20/10/2020	07:02	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305139	7482089	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-Duas-Cabeças	1	Morto	Instituições científicas	292924.74	7486385.13	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	OUT	20/10/2020	10:45	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305332	7481659	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra-de-Duas-Cabeças	1	Morto	Instituições científicas	292924.75	7486385.14	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	OUT	26/10/2020	08:24	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304970	7480359	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Dipsas mikanii</i>	jararquinha dormideira	1	Morto	Instituições científicas	292924.76	7486385.15	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	NOV	26/11/2020	20:36	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	305036	7480457	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Micrurus frontalis</i>	Coral-verdadeira	1	Morto	Instituições científicas	292924.76	7486385.15	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	DEZ	01/12/2020	08:17	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304846	7480000	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Pholidryas Olfersii</i>	Cobra-cipó	1	Morto	Instituições científicas	292924.76	7486385.15	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	DEZ	16/12/2020	11:15	Estrada de terra	Pastagem	*	*	*	304487	7480426	23	Silvestre	Herpetofauna - répteis	<i>Pholidryas Olfersii</i>	Cobra-cipó	1	Morto	Instituições científicas	292924.76	7486385.15	23	Conforme previsto em licenciamento, o animal encontrado morto será encaminhado para estudo
Atropelamento	2020	DEZ	17/12/2020	09:38	Estrada de terra	Fragmento de mata	*	*	*	304935	7480134	23	S										

BARRAGEM PEDREIRA



ANEXO XIII - Programa de Monitoramento de Biota Aquática

Fevereiro/2023

Período: Setembro a Dezembro 2022



www.daeepedreiraeduaspontes.com.br



PEDREIRA E CAMPINAS – SÃO PAULO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS BARRAGEM PEDREIRA

12º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento de Biota Aquática

0322-01-AS-RQS-0012-R00-PMBA

Contrato: N° 2018/11/00032.2

**Setembro a dezembro
2022**

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	6
2.	CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	7
3.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	8
3.1	EQUIPE TÉCNICA	8
4.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	9
4.1	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS E, INDICADORES DO PROGRAMA	9
4.1.1	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS.....	9
4.1.2	ATENDIMENTO ÀS METAS.....	10
4.1.3	INDICADORES.....	10
4.2	RESUMOS DAS ATIVIDADES ANTERIORES - HISTÓRICO	12
4.3	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO	13
4.3.1	CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA	13
4.4	PLANEJAMENTO DAS PRÓXIMAS ATIVIDADES	19
5.	CRONOGRAMA - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	20
	ANEXOS	26

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Equipe técnica.	8
Quadro 2 – Atendimento aos Objetivos.	9
Quadro 3 – Atendimento às Metas.	10
Quadro 4 – Indicadores.	11
Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.	12
Quadro 6 – Campanhas realizadas no âmbito do programa de monitoramento da biota aquática da Barragem Pedreira.	13
Quadro 7 – Cronograma – Ano 1.	21
Quadro 8 – Cronograma – Ano 2.	22
Quadro 9 – Cronograma – Ano 3.	23
Quadro 10 – Cronograma – Ano 4.	24
Quadro 11 – Cronograma – Ano 5.	25

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADA – Área Diretamente Afetada

AID – Área de Influência Direta

ANA – Agência Nacional de Águas

ANM – Agência Nacional de Mineração

CA – Certificado de Aprovação

CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CBRN – Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica

DEFAU – Departamento de Fauna da Secretaria de Meio Ambiente

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

EPI – Equipamento de Proteção Individual

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo

NR – Norma Regulamentadora

PBA – Plano Básico Ambiental

PGA – Programa de Gestão Ambiental

PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

MMA – Ministério do Meio Ambiente

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental

SMA – Secretaria do Estado de Meio Ambiente

APRESENTAÇÃO

O Consórcio BP OAS-CETENCO apresenta o **12º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ANDAMENTO AMBIENTAL** do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, referente ao contrato de implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas conforme elementos técnicos do Edital de Concorrência Internacional 005/DAEE/2017/DLC.

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa atender à exigência ambiental do Edital de Concorrência **005/DAEE/2017/DLC**, cujo objetivo é a implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiá – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas com eficácia e qualidade requeridas.

O escopo deste **Relatório de Andamento Ambiental do Programa de Monitoramento de Biota Aquática** está baseado nas atividades realizadas no período de **01 de setembro a 31 de dezembro de 2022**.

O principal objetivo deste monitoramento é acompanhar e avaliar possíveis alterações nas comunidades aquáticas (fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas), subsidiando as ações de controle estratégicas preventivas e corretivas para manutenção da qualidade da água nos padrões adequados para abastecimento público.

2. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A seguir apresenta-se os detalhes das condicionantes preconizadas na LI nº 2557, referente ao programa e acompanhamento ambiental da Barragem Pedreira.

Item 2.2 - *Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada, os resultados obtidos, registros fotográficos das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.*

Atendido.

Item 2.43 - *Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.*

Em atendimento, conforme relatório em tela.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.1 Equipe Técnica

Nome	Função Exercida	Formação	Registro
Denis Dorighello Tomás	Responsável de Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Geógrafo	CREA 0601944001
Maria Elena Basilio	Coordenadora dos Programas Ambientais	Engenheira Agrônoma	CREA 5061242441
Luis Alberto de Oliveira	Coordenador dos Programas Bióticos	Engenheiro Florestal	CREA 5063209653
Vilma Maria Cavinatto Rivero	Responsável Técnica	Bióloga	CRBio: 06912-01
Thais Viti	Análises do Zooplâncton	Bióloga	CRBio: 100498/01-D
Giulia Baldaconi da Silva Bispo	Elaboração do Relatório Técnico	Bióloga MSc em Ecologia	CRBio: 100498/01-D
Cristiane Midori Suga	Análises dos Invertebrados Bentônicos	Bióloga	CRBio: 89905/01-D
Leny Célia da Silva Correia	Análises dos Invertebrados Bentônicos	Biólogo	CRBio: 86499/01-D
Josefa Oliveira dos Santos	Elaboração do Relatório Técnico	Tecnóloga em Gestão Ambiental	CRQ:04265303
Maria Estefânia Fernandes Rodrigues	Elaboração do Relatório Técnico e Amostragem de Macrófitas Aquáticas	Bióloga	CRBio: 082208/01

Quadro 1 – Equipe técnica.

4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA

4.1 Atendimento aos Objetivos e Metas e, Indicadores do Programa

O atendimento aos objetivos, metas e indicadores está sintetizado nos **Quadros 2, 3 e 4**, a seguir.

4.1.1 Atendimento aos Objetivos

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUATICA		
Objetivos	Status	Justificativa
Relacionar os resultados obtidos com os dados de qualidade da água e dos sedimentos	Em atendimento	Estão sendo realizadas as campanhas quadrimestrais para relacionar os resultados obtidos com os dados de qualidade da água e dos sedimentos.
Monitorar o desenvolvimento do fitoplâncton, incluindo a contagem de células de cianobactérias, e sua relação com o nível de trofia do ecossistema aquático	Em andamento	O monitoramento está sendo realizadas nas campanhas quadrimestrais e apresentado em relatório.
Identificar a presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção ou exóticas	Em andamento	Na coleta de amostras busca-se identificar a presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção ou exóticas.
Manter a concentração de células de cianobactérias em níveis condizentes com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces.	Em andamento	É verificado nas campanhas, possíveis alterações na concentração de células de cianobactérias para possível controle.
Acompanhar o crescimento das macrófitas aquáticas, sobretudo na área do manancial projetado;	Em andamento	As alterações são acompanhadas nas campanhas.
Subsidiar medidas de controle e manejo das macrófitas, se necessário;	*	Medida a ser realizada na fase de operação do reservatório.
Identificar as espécies de macrófitas aquáticas presentes no reservatório e subsidiar medidas de controle e manejo das macrófitas, se necessário.	*	Medida a ser realizada na fase de operação do reservatório.
Analisar a eficiência dos mecanismos de controle ambiental adotados pelo empreendimento.	*	Medida a ser realizada na fase de operação do reservatório.

Legenda: * = programado para a fase de operação

Quadro 2 – Atendimento aos Objetivos.

4.1.2 Atendimento às Metas

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA		
Metas	Status	Justificativa
Cumprimento do Cronograma	Em atendimento	O cronograma está sendo atendido.
Realização de campanhas e relatório quadrimestrais de monitoramento para avaliação da biota aquática	Em atendimento	As campanhas estão sendo realizadas com periodicidade quadrimestral.

Quadro 3 – Atendimento às Metas.

4.1.3 Indicadores

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA	
Indicador	Status
Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa.	<p>Fitoplâncton: 62 táxons / Maior riqueza relativa de Bacillariophyceae</p> <p>Zooplâncton: 38 táxons / Maior riqueza relativa de Rotifera</p> <p>Invertebrados Bentônicos: 41 táxons / Maior riqueza relativa de Insecta</p> <p>Macrófitas aquáticas: 75 táxons / Maior riqueza relativa de Cyperaceae</p>
Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência.	<p>Fitoplâncton: bacilariofíceas <i>Navicula</i> sp.1 e <i>Nitzschia</i> sp.1, a clorofíceas <i>Desmodesmus</i> sp.1, uma criptofíceas não identificada., a cianobactéria <i>Phormidium</i> sp.1 e a dinofíceas <i>Peridinium</i> sp.1 observados em todos os locais monitorados</p> <p>Zooplâncton: protozoários <i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i> foram registrados em 100% das amostras, sendo considerados muito frequentes</p> <p>Invertebrados Bentônicos: dípteros <i>Polypedilum</i> sp. (tribo Chironomini) e os anelídeos <i>Pristina</i> sp. foram encontrados em todas as amostras.</p> <p>Macrófitas aquáticas: A espécie mais frequente foi <i>Urochloa brizantha</i>, que corresponde macrófitas que apresentam potencial de infestação, além de uso medicinal, ornamental e comestível.</p>
Densidade e Abundância Relativa das Comunidades Planctônicas e Bentônicas.	<p>Fitoplâncton: densidade máxima de 2.735 org./mL (P07).</p> <p>Zooplâncton: densidade máxima de 1.614 org./m³ (P07)</p> <p>Invertebrados Bentônicos: densidade mínima de 74 org./m² (P04) e máxima 1.768 org./m² (P05)</p>
Índice de Cobertura de Macrófitas Aquáticas.	<p>Apesar de ser verificada a presença de espécies infestantes e daninhas nos rios monitorados, as áreas de cobertura dos táxons de macrófitas aquáticas nos pontos de coleta não foram extensas, ou seja, os exemplares observados apresentaram baixo grau de cobertura, sem táxons dominantes, indicando assim um equilíbrio nessa comunidade.</p>

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA	
Índices de Diversidade e Equitabilidade das Comunidades Planctônicas e Bentônicas	<p>Fitoplâncton: alto nível de semelhança entre a comunidade amostrada na décima segunda campanha, mesmo entre os pontos no rio Jaguari que são potencialmente mais afetados pelas obras do empreendimento (P02 e P03) e o ponto P01. O afluente represado do rio Jaguari (P07) evidenciou as maiores distinções dos demais pontos da malha amostral.</p> <p>Zooplâncton: demonstram uma acentuada diferença entre a comunidade do ambiente lântico (P07) e a dos demais pontos lóticos. Entre estes há certo grau de heterogeneidade nos padrões de distribuição espacial e de abundância do zooplâncton, com maior semelhança entre os pontos P05 e P03, no rio Jaguari.</p> <p>Invertebrados Bentônicos: baixo nível de semelhança entre o afluente represado (P07) e o ponto próximo às obras (P02) e os demais pontos.</p>
Índice de Similaridade	(Vide item 4.2 do relatório)
Padrões de qualidade conforme Resolução Conama 357/05 (Contagem de células de cianobactérias).	A densidade de células de cianobactérias atendeu ao padrão estipulado pela Resolução CONAMA 357/05, em todos os pontos, condição verificada também nas amostragens pretéritas deste programa.
Índice da Comunidade Bentônica – ICB Será considerada também a análise do Índice da Comunidade Zooplanctônica (ICZ) para reservatório, quando pertinente	De acordo com os critérios aplicados no Índice da Comunidade Bentônica - ICB, os locais avaliados nessa campanha apresentaram qualidade Boa e Ótima na maioria dos pontos, com exceção dos pontos P01 (Ruim) e P06 (Regular).
Espécies Exóticas, Ameaçadas e Importância	<p>Fitoplâncton: Não apresenta táxons com grau de ameaça. Nenhuma das espécies é considerada exótica.</p> <p>Zooplâncton: Não apresenta táxons com grau de ameaça.</p> <p>Invertebrados bentônicos: Não apresenta táxons com grau de ameaça.</p> <p>Macrófitas aquáticas: não constam espécies exóticas ou ameaçada e protegida por legislação estadual e/ou federal.</p>

Quadro 4 – Indicadores.

4.2 Resumos das Atividades Anteriores - Histórico

O **Quadro 5**, apresenta os relatórios quadrimestrais emitidos até o momento.

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
Julho - 2019	Emissão do 1º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2019	Emissão do 2º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Março - 2020	Emissão do 3º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2020	Emissão do 4º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2020	Emissão do 5º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2021	Emissão do 6º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2021	Emissão do 7º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2021	Emissão do 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2022	Emissão do 9º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2022	Emissão do 10º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2022	Emissão do 11º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.

As campanhas de monitoramento de biota aquática ocorreram conforme apresentado no **Quadro 6**, a seguir.

Campanhas	Datas	Períodos	Étapas do empreendimento
1ªC	24/05 e 01/06/2018	Seco	Pré-implantação
2ªC	01 a 04/10/2018	Transição do período seco para o chuvoso	Pré-implantação
3ªC	07 e 08/02/2019	Chuvoso	Implantação
4ªC	18 e 19/06/2019	Seco	Implantação
5ªC	03 e 04/10/2019	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação
6ªC	19 e 20/02/2020	Chuvoso	Implantação
7ªC	22 e 23/06/2020	Seco	Implantação
8ªC	26 e 27/10/2020	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação
9ªC	24 e 25/02/2021	Chuvoso	Implantação
10ªC	28 e 29/06/2021	Seco	Implantação
11ªC	28 e 29/10/2021	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação
12ªC	09 e 10/03/2022	Chuvoso	Implantação
13ªC	08 e 09/06/2022	Seco	Implantação
14ª C	28/10/2022	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação

Quadro 6 – Campanhas realizadas no âmbito do programa de monitoramento da biota aquática da Barragem Pedreira.

4.3 Atividades Desenvolvidas no Período

4.3.1 Campanha de Monitoramento de Biota Aquática

A seguir, descrevem-se os principais resultados obtidos na avaliação de cada uma das comunidades avaliadas na campanha mais recente do monitoramento da biota aquática, realizada na etapa de implantação do empreendimento, na transição do período seco para o chuvoso (outubro/2022).

Fitoplâncton

A avaliação da comunidade fitoplanctônica, na décima quarta campanha, resultou no registro de 62 táxons no conjunto de pontos monitorados no rio Jaguari, no seu afluente represado e no córrego Entre-Montes. Verificou-se maior riqueza de diatomáceas da classe Bacillariophyceae, seguidas por Conjugatophyceae e Mediophyceae, as quais são componentes comuns do plâncton de ecossistemas aquáticos continentais.

Em termos de frequência se sobressaíram as bacilariofíceas *Cymbella* sp1. e *Navicula* sp1., além do exemplar não identificado de criptofíceas (Cryptophyceae), observados em todos os locais monitorados, o que evidencia alta adaptabilidade destas

algas às condições ambientais locais. No conjunto dos táxons fitoplanctônicos, não foi registrada a ocorrência de espécies exóticas.

A análise quantitativa indicou que a densidade do fitoplâncton se manteve reduzida na maioria dos locais avaliados no rio Jaguari e no córrego Entre-Montes, o que representa um padrão comum em sistemas aquáticos lóticos, devido principalmente à turbulência das águas e à pequena concentração de nutrientes tipicamente verificadas nestes ambientes. Contudo, no afluente represado do rio Jaguari (P07), a densidade foi elevada.

Houve dominância da classe Cryptophyceae, na totalidade dos pontos do rio Jaguari. As criptofíceas são consideradas oportunistas, aumentando sua densidade quando a das demais algas decrescem. Oliveira & Calheiros (2000) associaram a dominância de Cryptophyceae às condições adversas para o desenvolvimento de algas de outros grupos, como baixa disponibilidade de nutrientes.

No afluente represado rio Jaguari, o padrão de dominância se alterou e nestes ocorreu dominância de Mediophyceae, com destaque de *Thalassiosira* sp1.

A densidade de células de cianobactérias atendeu ao padrão estipulado pela Resolução CONAMA 357/05, em todos os pontos, condição verificada também nas amostragens pretéritas deste programa. Esse resultado constitui um aspecto positivo, considerando que esse grupo possui táxons produtores de cianotoxinas, que podem acarretar prejuízos à biota aquática e à qualidade da água destinada ao abastecimento público, quando presentes em grandes quantidades. Esse grupo esteve ausente nas amostras quantitativas dos pontos P01, P02 e P06 do rio Jaguari, do córrego Entre-Montes (P04), e no afluente represado do rio Jaguari (P07), atingindo o máximo de 10 cél./mL no ponto P03 do rio Jaguari.

A barragem particular (P07) representou o local de menor diversidade da malha amostral, enquanto o maior valor foi registrado no rio Jaguari (P06), em comparação aos demais pontos. A equitabilidade foi baixa (<0,5), apenas no ponto do P07, tendo a maioria dos pontos valores superiores a 0,6.

A análise dos padrões de similaridade apontou nível baixo de semelhança entre a comunidade amostrada na décima quarta campanha. O cluster principal, formado pela maioria dos pontos do rio Jaguari (P01, P02, P03 e P05) e o córrego Entre-Montes (P04), sobretudo entre os pontos P02 e P05, sendo esse resultado influenciado pela elevada abundância de Cryptophyceae. O ponto P06 se diferenciou principalmente devido à menor

densidade de organismos amostrados, composta sobretudo por baclariófitas. O afluente represado do rio Jaguari (P07) também esteve distinto, em função das maiores densidades e baixa similaridade aos demais pontos amostrais.

Cabe apontar que mesmo os pontos no rio Jaguari que são potencialmente mais afetados pelas obras do empreendimento (P02 e P03) apresentaram elevada similaridade com o ponto P01, situado a montante das obras, o que denota que não foram observadas interferências relevantes no fitoplâncton que possam ser associadas diretamente ao empreendimento.

Zooplâncton

A análise qualitativa do zooplâncton, em outubro de 2022, apontou a ocorrência de 38 táxons no cômputo das amostras obtidas no rio Jaguari, no seu afluente represado da margem esquerda e no córrego Entre-Montes. A comunidade zooplanctônica foi predominantemente composta por rotíferos, seguidos de protozoários e microcrustáceos Cladocera, o que constitui um resultado comum em ecossistemas aquáticos dulcícolas.

Do conjunto de táxons, apenas o protozoário *Arcella* sp1 foi registrado em 100% das amostras, sendo considerados muito frequentes. Adicionalmente, se destacaram em termos de frequência o protozoário *Centropyxis* cf. *aculeata* estando presentes em 86% dos locais monitorados.

Durante a presente campanha, não foram identificadas espécies exóticas e tampouco espécies consideradas ameaçadas a nível estadual e federal.

Em termos quantitativos, a maior densidade foi verificada no afluente represado do rio Jaguari (P07), em função da abundância de copépodos calanóides, principalmente pela contribuição dos náuplios.

Em todos os pontos do rio Jaguari, houve predomínio de protozoários, o que é indicativo do aporte de material alóctone, o que propicia que espécies oportunistas dos protozoários utilizem rapidamente os recursos disponíveis e atinjam um aumento de densidade. Os exemplares mais abundantes foram o gênero *Centropyxis* e as espécies *Diffugia* sp e *Lecane* sp. Estes gêneros estão entre os protozoários de maior ocorrência nos ambientes aquáticos continentais (LANSAC-TÔHA *et al.*, 2000) e, segundo Silva *et al.* (2020), são comuns em ambientes com elevada taxa de matéria orgânica.

A diversidade do zooplâncton foi mais elevada córrego Entre-Montes (P04), enquanto o menor valor foi obtido no rio Jaguari (P05), a jusante do córrego Entre-Montes,

onde também se observou a menor equitabilidade, resultado que foi influenciado principalmente pela menor riqueza, densidade e abundância apresentada durante a campanha. Nos pontos sob maior influência das obras de implantação da barragem (P02 e P03), a diversidade esteve em torno de 1,5 bits.ind-1, sendo próxima ao trecho sem influência da obra (P01).

Os resultados do índice de Bray-Curtis demonstram uma acentuada diferença entre a comunidade do ambiente lêntico (P07) e a dos demais pontos lóticos. Entre estes há certo grau de heterogeneidade nos padrões de distribuição espacial e de abundância do zooplâncton, com maior semelhança entre os pontos P05 e P06, no rio Jaguari. De maneira geral, não foram encontradas alterações relevantes nesta comunidade que possam ser diretamente atribuídas às obras do empreendimento.

Invertebrados Bentônicos

Na décima quarta campanha de monitoramento, na transição do período seco para o chuvoso, foi registrado um total de 41 táxons de invertebrados bentônicos, com maior riqueza das larvas de insetos, seguidas de moluscos e anelídeos. Dentre os insetos, o grupo mais especioso foi o dos dípteros quironomídeos, que possuem táxons mais tolerantes às alterações ambientais. Porém, também foram identificados táxons de insetos considerados sensíveis às perturbações ambientais, como os efemerópteros e tricópteros.

Dos táxons registrados, nenhum exemplar ocorreu em todos os locais amostrados. Os táxons considerados muito frequentes (86%) os anelídeos da família Glossiphoniidae e os oligoquetos da família Naididae (com e sem queta capilar), além dos dípteros não identificados da família Chironomidae e os dípteros *Polypedilum* sp. (tribo Chironomini). Foram classificados como frequentes as larvas dos dípteros os dípteros não identificados da tribo Tanytarsini, além dos exemplares de *Chironomus* sp., *Nanocladius* sp., *Ablabesmyia* sp. e *Labrundinia* sp.

Os valores de riqueza específica da comunidade bentônica no rio Jaguari variaram de um mínimo de 6 táxons (P06) a 18 táxons (P05). No córrego Entre-Montes (P04), foi observada riqueza de sete táxons, enquanto que na barragem particular (P07) foram computados 23 táxons.

Na análise quantitativa, observou-se que a densidade dos invertebrados bentônicos foi variável entre os pontos de amostragem, sendo as maiores densidades obtidas no rio Jaguari, a jusante do córrego Entre-Montes (P05).

As larvas de insetos foram as abundantes na maioria dos pontos do rio Jaguari, exceto em P03 e P06 os quais apresentaram as maiores densidades para anelídeos Hirudinea e Oligochaeta. No córrego Entre-Montes (P04), as maiores densidades foram reportadas também para as larvas de díptera, sobretudo os exemplares da tribo Tanytarsini. No afluente represado do rio Jaguari (P07), da mesma forma, os insetos foram o grupo mais abundante, devido principalmente à *Caladomyia* sp.

A maior diversidade foi observada no ponto P07, no afluente barrado, devido à elevada dominância de um único táxon (*Caladomyia* sp). A equitabilidade se mostrou superior a 0,7 na maioria dos pontos da malha amostral, exceto nos pontos P02 e P05 do rio Jaguari.

O índice de Bray Curtis indicou baixo nível de semelhança entre a maioria dos pontos (<40%), tendo maior similaridade entre os pontos P03 e P06 do rio Jaguari. De acordo com os critérios aplicados no Índice da Comunidade Bentônica - ICB, os locais avaliados nessa campanha apresentaram qualidade Boa e Ótima na maioria dos pontos, com exceção apenas do ponto P06 (Regular).

Macrófitas Aquáticas

Na décima quarta campanha de monitoramento da Barragem Pedreira, realizada em outubro de 2022, no período de transição do seco para chuvoso, foram registrados 75 táxons de macrófitas aquáticas nos segmentos monitorados no rio Jaguari, no córrego Entre-Montes e no afluente represado do rio Jaguari. As formas biológicas mais comuns nesta última campanha foram a anfíbia e a emergente, padrão recorrente em sistemas aquáticos tropicais e em amostragens pretéritas deste programa de monitoramento.

As espécies mais frequentes foram *Eclipta prostrata*, *Eichhornia crassipes*, *Ipomoea cairica* e *Urochloa brizantha*, que correspondem macrófitas consideradas infestantes na literatura. Apesar de ser verificada a presença de espécies infestantes e daninhas nos rios monitorados, as áreas de cobertura dos táxons de macrófitas aquáticas nos pontos de coleta não foram extensas, ou seja, os exemplares observados apresentaram baixo grau de cobertura, sem táxons dominantes, indicando assim um equilíbrio nessa comunidade. Porém, cabe destacar que o ponto P02 (próximo à barragem) está se tornando local propício ao desenvolvimento de macrófitas aquáticas merecendo assim atenção ao manejo das espécies com potencial de infestação, principalmente flutuantes livres entre elas a *Eichhornia crassipes* (aguapé), a qual vem apresentando aumento da área de cobertura nas últimas campanhas.

A maioria das espécies de macrófitas aquáticas registrada possui ampla distribuição no Brasil e é nativa não tendo sido observada a presença de espécies exóticas. *Ludwigia myrtifolia* e *Polygonum diospyrifolium* são consideradas endêmicas do Brasil, mas nenhuma espécie é endêmica do local de estudo. A espécie *Hypericum mutilum* registrada na décima quarta campanha (outubro/2022) é considerada vulnerável (VU) na lista vermelha da flora de São Paulo (SMA-SP, 2016) e na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2022).

De forma geral os resultados obtidos nessa campanha são similares aos das amostragens anteriores deste programa de monitoramento, apresentando apenas um aumento de riqueza total e pontual principalmente no ponto P02, além do um leve aumento da área de cobertura das espécies *Eichhornia crassipes* (aguapé) e *Myriophyllum aquaticum* (pinheirinho d'água) nesse mesmo ponto, estando relacionados à formação de zona litorânea com baixa correnteza da água.

Os resultados são apresentados na íntegra **ANEXO 0322-01-RQS-0011.01-PMBA**.

4.4 Planejamento das Próximas Atividades

A próxima campanha de monitoramento da biota aquática está prevista para ser realizada em fevereiro de 2023 (15ª Campanha).

5. CRONOGRAMA - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA

Os quadros abaixo apresentam o cronograma das atividades previstas do Programa de Monitoramento da Biota Aquática para os períodos: Ano 1 a Ano 5.

Atividades	Implantação											
	Ano 1											
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Campanhas de monitoramento		■				■				■		
		■				■				■		
Relatório Mensal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relatório Quadrimestral					■				■			
					■				■			
Relatório Final Consolidado												

Quadro 7 – Cronograma – Ano 1.

↑
Início da Obra

↑
Início das atividades de desvio do rio.

Atividades	Implantação											
	Ano 2											
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Campanhas de monitoramento												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												
Relatório Final Consolidado												

Quadro 8 – Cronograma – Ano 2.

Atividades	Implantação											
	Ano 3											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Campanhas de monitoramento												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												
Relatório Final Consolidado												





Quadro 9 – Cronograma – Ano 3.

Atividades	Implantação											
	Ano 4											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Campanhas de monitoramento			Amarelo			Amarelo				Amarelo		
			Verde			Verde				Verde		
Relatório Mensal	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo		Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo
	Verde	Verde	Verde	Verde		Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Relatório Quadrimestral	Amarelo				Amarelo				Amarelo			
	Verde				Verde				Verde			
Relatório Final Consolidado												


Quadro 10 – Cronograma – Ano 4.

Atividades	Implantação											
	Ano 5											
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Campanhas de monitoramento												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												
Relatório Final Consolidado												

LEGENDA

-  PREVISTO
-  REALIZADO
-  REPROGRAMADO
-  FINALIZADO

Quadro 11 – Cronograma – Ano 5.



Anexos

ANEXO 0322-01-RQS-0012.01-PMBA

14º Relatório de Monitoramento
Barragem Pedreira
PEDREIRA E CAMPINAS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS.....	5
3. REFERENCIAL METODOLÓGICO.....	6
3.1 REDE DE AMOSTRAGEM.....	6
3.2. PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE.....	9
3.2.1. FITOPLÂNCTON	9
3.2.2. ZOOPLÂNCTON.....	11
3.2.3. INVERTEBRADOS BENTÔNICOS.....	12
3.2.4. MACRÓFITAS AQUÁTICAS	13
3.3. ANÁLISE DE DADOS.....	16
4. RESULTADOS OBTIDOS.....	21
4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM	21
4.2. FITOPLÂNCTON	27
4.3. ZOOPLÂNCTON.....	49
4.4. INVERTEBRADOS BENTÔNICOS.....	69
4.5. MACRÓFITAS AQUÁTICAS	91
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	117
5.1. FITOPLÂNCTON	117
5.2. ZOOPLÂNCTON.....	118
5.3. INVERTEBRADOS BENTÔNICOS.....	119
5.4. MACRÓFITAS AQUÁTICAS	120
6. EQUIPE TÉCNICA	122
7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	123
8. RERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	124
9. ANEXOS	132

1. INTRODUÇÃO

No presente relatório estão consolidados os resultados obtidos na décima quarta campanha (14^aC) do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, desenvolvido no âmbito do licenciamento ambiental da Barragem Pedreira, projetada no rio Jaguari, sob a responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. A amostragem foi realizada em 28 de outubro de 2022, durante a transição do período chuvoso, estando associada à fase de implantação do empreendimento, sendo avaliados os seguintes grupos: fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas.

A primeira campanha deste monitoramento (1^aC) foi conduzida entre maio e junho de 2018, na transição do período seco para o chuvoso, na fase prévia à implantação, enquanto a segunda ocorreu em outubro de 2018, na transição do período seco para o chuvoso, no início da implantação. A partir da terceira coleta, efetuada em fevereiro de 2019, no período chuvoso, as amostragens correspondem à implantação da Barragem Pedreira, conforme apresentado no **Quadro 1-1**.

Quadro 1-1. Campanhas Realizadas no Âmbito do Programa de Monitoramento da Biota Aquática da Barragem Pedreira.

Campanhas	Datas	Períodos	Etapas do empreendimento
1 ^a C	24/05 e 01/06/2018	Seco	Pré-implantação
2 ^a C	01 a 04/10/2018	Transição do período seco para o chuvoso	Início da implantação
3 ^a C	07 e 08/02/2019	Chuvoso	Implantação
4 ^a C	18 e 19/06/2019	Seco	Implantação
5 ^a C	03 e 04/10/2019	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação
6 ^a C	19 e 20/02/2020	Chuvoso	Implantação
7 ^a C	22 e 23/06/2020	Seco	Implantação
8 ^a C	26 e 27/10/2020	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação
9 ^a C	24 e 25/02/2021	Chuvoso	Implantação
10 ^a C	28 e 29/06/2021	Seco	Implantação
11 ^a C	28/10 e 29/10/2021	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação
12 ^a C	09 e 10/03/2022	Chuvoso	Implantação
13 ^a C	08 e 09/06/2022	Seco	Implantação
14 ^a C	28/10/2022	Transição do período seco para o chuvoso	Implantação

O referido programa foi proposto no escopo dos estudos ambientais - EIA/RIMA do empreendimento (CONSORCIO HIDROSTUDIO-TEMAG & DAEE, 2015) e segue as diretrizes do Parecer Técnico da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB nº 468/18/IE e atende a condicionante 2.43 da Licença Ambiental de Instalação nº 2557.

De acordo com esses documentos, o empreendimento em foco engloba uma barragem de regularização, visando à ampliação da oferta hídrica na região das bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, incluindo o aprimoramento da operação do Sistema Produtor Cantareira, especialmente nas épocas de estiagem, pois reduzirá o risco de deplecionamento dos reservatórios que compõem este sistema. A implantação da Barragem Pedreira no rio Jaguari possibilitará a regularização de vazão e abastecimento público e formará um reservatório de aproximadamente 202 ha (N.A. máximo normal, incluindo calha do rio) e volume útil de 31,92 hm³).

Do ponto de vista hidrográfico, a área prevista para implantação dessa barragem se insere na bacia do rio Piracicaba. De acordo com a subdivisão do território brasileiro estabelecida pela Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 32/2003, essa bacia compõe o grupo de mananciais pertencentes à Região Hidrográfica do Paraná e integra, no estado de São Paulo, a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Ugrhi 5 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí – PCJ.

O rio Jaguari, formador do rio Piracicaba, nasce ao sul do território mineiro e entra no estado de São Paulo, atravessando inicialmente o município de Vargem. Em território paulista, esse rio contribui para a represa de Jaguari-Jacareí, integrante do Sistema Produtor Cantareira. O rio Jaguari conta com duas Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, uma delas situada imediatamente a montante do futuro reservatório (PCH do Jaguari) e a outra (PCH do Macaco Branco), localizada nas proximidades do córrego Entre-Montes, tributário da margem direita do Jaguari, na área prevista para o reservatório de Pedreira.

No seu baixo curso, o rio Jaguari recebe o rio Camanducaia, seu principal contribuinte da margem direita, e prossegue até o encontro com o rio Atibaia, no município de Americana, nas proximidades da represa da Usina Hidrelétrica - UHE de Salto Grande.

Nessa perspectiva, são apresentados a seguir os objetivos (item 2), o referencial metodológico (item 3), os resultados obtidos (item 4) na décima quarta campanha, além de um comparativo com as amostragens anteriores e as considerações finais (item 5), a equipe técnica (item 6) e o cronograma de atividades (item 7).

2. OBJETIVOS

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática tem como principal objetivo acompanhar e avaliar possíveis alterações nas comunidades aquáticas (fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas), subsidiando as ações de controle estratégicas preventivas e corretivas para manutenção da qualidade da água nos padrões adequados para abastecimento público.

Os objetivos específicos incluem:

- Relacionar os resultados obtidos com os dados de qualidade da água e dos sedimentos e demais programas associados.
- Monitorar o desenvolvimento do fitoplâncton, incluindo a contagem de células de cianobactérias, e sua relação com o nível de trofia do ecossistema aquático, com amostragem em trechos situados a montante e a jusante do reservatório projetado e nos braços tributários.
- Avaliar a concentração de células de cianobactérias comparando com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe 2 e pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5.
- Identificar as espécies de macrófitas aquáticas presentes no ambiente aquático, acompanhar seu desenvolvimento e subsidiar a preposição de medidas de controle e manejo;
- Identificar a presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção ou exóticas;
- Analisar a eficiência dos mecanismos de controle ambiental adotados pelo empreendimento, visando manter o sistema aquático em condições apropriadas para o desenvolvimento da biota aquática e para o abastecimento público.

3. REFERENCIAL METODOLÓGICO

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Programa de Monitoramento da Biota Aquática foram orientados pelas diretrizes do Plano Básico Ambiental – PBA e pelo Parecer Técnico nº468/18/IE. A amostragem da biota aquática, em outubro de 2022, foi realizada conjuntamente com as coletas do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos, o que permite a integração dos resultados. Em atendimento às diretrizes do parecer citado neste relatório consta a avaliação comparativa entre as campanhas, com indicação, quando pertinente, de eventuais não-conformidades identificadas. Na sequência, consta a descrição da rede de amostragem (item 3.1), os procedimentos de coleta e análise (3.2) e as análises de dados (item 3.3).

3.1 Rede de Amostragem

A malha amostral definida para a avaliação da biota aquática na área de influência da Barragem Pedreira compreende um total de sete pontos de coleta, denominados P01 a P07. Nesse conjunto amostral, cinco estão localizados no rio Jaguari (P01, P02, P03, P05 e P06), um deles em seu afluente da margem direita, no córrego Entre Montes (P04), e outro em uma barragem particular (P07), imediatamente a montante de um braço formador da margem esquerda do futuro reservatório. Com exceção deste último, posicionado em ambiente lêntico, os demais pontos são representativos de sistemas lóticos.

A rede de amostragem da biota aquática corresponde à mesma malha adotada no monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos. Sua definição foi baseada no diagnóstico ambiental apresentado no EIA, sendo acrescido o local de captação do SAAE para abastecimento da cidade Pedreira (P06), em atendimento ao Parecer Técnico da CETESB 01/16/IE/ID, além do ponto em barragem particular (P07), conforme solicitação do Parecer Técnico Municipal de Campinas nº 169/2015-I.

No **Quadro 3.1-1** e no **Gráfico 3.1-1** estão listados os pontos de amostragem do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, ordenados de montante para jusante no sistema hídrico, com suas respectivas localizações em relação ao futuro reservatório de Pedreira.

Quadro 3.1-1. Rede de Amostragem do Monitoramento da Biota Aquática – Barragem Pedreira - 14^oC (Outubro/22)

Ponto	Corpo Hídrico	Localização	Coordenadas Geográficas (Fuso 23K)**	
			Norte	Leste
P01	Rio Jaguari	A montante do futuro reservatório	7.476.469	305.572
P05		Corpo principal do futuro reservatório, a jusante do córrego Entre-Montes	7.480.588	304.659
P02		Corpo principal do futuro reservatório, próximo à barragem	7.481.300	304.352
P03		A jusante do futuro reservatório	7.480.084	304.897
P06*		Ponto de captação do abastecimento de Pedreira	7.483.582	305.266
P04	Córrego Entre-Montes	Braço contribuinte da margem direita do futuro reservatório, próximo à foz	7.476.469	305.572
P07	Afluente do Rio Jaguari	Barragem Particular	7.480.588	304.659

Legenda: * Ponto coincidente com o da rede básica de monitoramento da CETESB (JAGR02200). ** Coordenadas em SIRGAS 2000.




Gráfico 3.1-1. Rede de Amostragem do Monitoramento da Biota Aquática – Barragem Pedreira.

3.2. Procedimentos de Coleta e Análise

As coletas e as análises das amostras da biota aquática foram realizadas sob a responsabilidade da empresa Econsult Estudos Ambientais Ltda, cujo laboratório é acreditado segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, conforme exigências estabelecidas pela Resolução SMA 100/2013.

Previamente à tomada de amostras, foram anotadas em cada ponto de coleta as seguintes informações relevantes sobre os corpos d'água avaliados e as condições predominantes do entorno, visando dar subsídios à interpretação dos resultados analíticos: identificação do ponto com os códigos adotados pelo projeto, localização geográfica com GPS, data e hora de coleta, condição predominante do tempo durante a coleta, ocorrência de chuva nas últimas 24 horas, largura aproximada do corpo d'água e estágio de preservação da mata ciliar, além do registro fotográfico.

As coletas e as análises foram realizadas de acordo com os protocolos do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23^a ed. (APHA *et al.*, 2017) e do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB & ANA, 2011).

3.2.1. Fitoplâncton

Em cada ponto de coleta, foi tomada uma amostra quantitativa da comunidade fitoplancônica na superfície, com uso de garrafa de “Van Dorn”. A seguir, a amostra qualitativa foi coletada por meio de arrasto horizontal na coluna d'água, utilizando-se rede de plâncton com abertura de malha de 20 µm (**Fotos 3.2.1-1 e 3.2.1-2**). Conforme recomenda o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB e ANA, 2011), as amostras de clorofila-a, relativas ao Programa de Qualidade da Água, foram obtidas a partir das alíquotas da mesma amostra utilizada para a avaliação quantitativa do fitoplâncton nos respectivos pontos de coleta.

Para preservação das amostras qualitativas, utilizou-se solução de formalina a 2% neutralizada com bicarbonato de sódio. Nas amostras quantitativas, adicionaram-se gotas de lugol. Os frascos de coleta foram homogeneizados, etiquetados e encaminhados ao laboratório.



Fotos 3.2.1-1 e 3.2.1-2. Amostragem qualitativa da comunidade fitoplanctônica.

Em laboratório, a identificação taxonômica do fitoplâncton foi baseada em bibliografia específica para cada grupo de algas e de cianobactérias, como Bicudo & Menezes (2006), Sant'Anna *et al.* (2012), Round & Crawford (1990), entre outros. O processo de identificação ocorreu sempre que possível ao nível de espécie, a partir da análise populacional, utilizando microscópio invertido. Analisou-se, no mínimo, uma lâmina de cada amostra, até atingir 10 campos sem ocorrência de táxons adicionais.

A quantificação do fitoplâncton seguiu o método de sedimentação em câmaras, descrito por Utermöhl (1958). O tempo de sedimentação variou de acordo com a concentração de material na amostra e o volume analisado, adotando-se o procedimento de quantificação por campos aleatórios ou câmara inteira. O limite de contagem foi estabelecido pela enumeração de 100 indivíduos do táxon mais abundante (LUND *et al.* 1958). Cada célula, cenóbio, colônia ou filamento foi considerado como um indivíduo (**Fotos 3.2.1-2 e 3.2.1-3**).

Os resultados de densidade do fitoplâncton são expressos em organismos por mililitro (org./mL). Em atendimento a Resolução CONAMA 357/05 e ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, realizou-se também a contagem de células de cianobactérias, com resultados indicados em células por mililitro (cél./mL). Os relatórios de ensaio do fitoplâncton constam no Anexo I, juntamente com a cadeia de custódia.



Fotos 3.2.1-2 e 3.2.1-3. Amostra na câmara de sedimentação de Utermöhl e contagem do fitoplâncton em microscópio invertido.

3.2.2. Zooplâncton

Em cada ponto, foi realizada a coleta de amostra quantitativa de zooplâncton filtrando-se, na rede com malha de 68 μm , 200 L de água coletada na superfície do corpo hídrico, com auxílio de recipiente (balde de 10L). A seguir, foram tomadas as amostras qualitativas por meio de arrasto horizontal com uso da mesma rede (**Fotos 3.2.2-1 e 3.2.2-2**).

As amostras quantitativas e qualitativas foram acondicionadas em frascos plásticos de 250 mL, sendo preservadas com solução de formalina 4% neutralizada com bicarbonato de sódio. Os frascos de coleta foram etiquetados e encaminhados ao laboratório.



Fotos 3.2.2-1 e 3.2.2-2. Amostragem qualitativa da comunidade zooplanctônica.

Em laboratório, os indivíduos foram identificados com auxílio de microscópio óptico, sempre que possível ao nível de espécie, utilizando-se chaves de identificação e descrições disponíveis em literatura especializada, como Matsumura-Tundisi & Silva (1999), Koste (1978), Lucinda (2003), entre outros.

Para a contagem dos organismos zooplanctônicos, as amostras com pequeno número de organismos foram analisadas integralmente. Aquelas que continham um elevado número de indivíduos foram realizadas por meio de subamostragem, sendo homogêneas e avaliadas a partir de alíquotas de 1 mL em câmara de Sedgewick-Rafter (**Fotos 3.2.2-3 e 3.2.2-4**).

Para determinar a densidade numérica do zooplâncton, os dados de contagem referentes a cada táxon foram multiplicados pelo fator de subamostragem e divididos pelo volume filtrado. Os valores de densidade obtidos são expressos em organismos por metro cúbico (org./m³). Os relatórios de ensaio do zooplâncton constam no **Anexo II**.



Fotos 3.2.2-3 e 3.2.2-4. Amostra na câmara de Sedgewick-Rafter preparada para análise em e identificação do zooplâncton em microscópio óptico.

3.2.3. Invertebrados Bentônicos


Em cada ponto de coleta, as amostras da comunidade bentônica foram tomadas em triplicata, utilizando-se o pegador de fundo do tipo Petersen (0,058 m²). O sedimento coletado foi lavado em campo, utilizando-se peneira de malha de 250 µm (**Fotos 3.2.3-1 e 3.2.3-2**). O material retido na peneira foi acondicionado em sacos plásticos, preservado em álcool 70% e corado com rosa de bengala 0,1%.



Fotos 3.2.3-1 e 3.2.3-2. Lavagem do sedimento coletado para a análise da comunidade bentônica.

Em laboratório, as amostras foram novamente lavadas com uso de peneiras de malha de 250 μm . Em seguida, procedeu-se a triagem e a identificação dos organismos em placas de Petri, com auxílio de estereoscópio (**Fotos 3.2.3-3 e 3.2.3-4**). A identificação taxonômica ocorreu ao menor nível taxonômico possível, preferencialmente até família (exceto para Chironomidae, em nível de tribo), sendo efetuada com auxílio de referências, tais como Trivinho-Strixino & Strixino (1995) e Merritt & Cummins (1984).

A densidade em cada ponto foi calculada pela média da densidade das três réplicas, com resultados indicados em organismos por metro quadrado (org./m^2). Os relatórios de ensaio dos invertebrados bentônicos constam no Anexo III.



Fotos 3.2.3-3 e 3.2.3-4. Triagem dos organismos bentônicos em laboratório e identificação em estereoscópio.

3.2.4. Macrófitas Aquáticas

A amostragem das macrófitas aquáticas compreendeu todos os táxons encontrados nos pontos amostrados, tanto dentro da água, quanto nas margens, até uma distância de 2 m

da lâmina d'água tendo em vista a coleta de vegetais anfíbios. Para identificação das espécies, foram anotados os dados dos espécimes presentes em cada ponto.

O conceito utilizado para macrófitas aquáticas foi o de Irgang & Gastal Jr. (1996), que definem essa comunidade como vegetais visíveis a olho nu, cujas partes fotossintetizantes ativas se encontram total ou parcialmente submersas, ou flutuando sobre a lâmina d'água.

Dada a heterogeneidade taxonômica das macrófitas aquáticas, usualmente esses vegetais são classificados de acordo com sua forma biológica e a disposição de suas estruturas no ambiente aquático, sendo adotada a proposta de Irgang *et al.* (1984), conforme **Figura 3.2.4-1**, descrita a seguir:

1. Submersas fixas: enraizadas no fundo, com caule e folhas submersos; somente as flores permanecem fora d'água.
2. Submersas livres: não enraizadas no fundo, totalmente submersas; somente as flores permanecem fora d'água.
3. Flutuantes fixas: enraizadas no fundo, com caule e/ou ramos e/ou folhas e/ou flores flutuantes.
4. Flutuantes livres: não enraizadas no fundo, com caule e/ou ramos e/ou folhas e/ou flores flutuantes, podendo ser levadas pela correnteza, pelo vento ou até por animais.
5. Emergentes ou Emersas: enraizadas no fundo, parcialmente submersas e parcialmente emersas.
6. Anfíbias ou semi-aquáticas: capazes de viver tanto em área alagada como fora da água nos períodos de estiagem, época em que geralmente modificam sua morfologia, adaptando-se à fase terrestre.
7. Epífitas: são vegetais que se instalam sobre outras plantas aquáticas.




Figura 3.2.4-1. Formas Biológicas de Macrófitas Aquáticas.

Fonte: Irgang *et al.* (1984).

Nos locais monitorados, os táxons presentes tiveram sua respectiva densidade estimada através do índice de cobertura estabelecido por Braun-Blanquet *et al.* (1932), conforme apresentado no **Quadro 3.2.4-1**.

Quadro 3.2.4-1 Índice de Cobertura de Macrófitas Aquáticas.

Característica da Cobertura	Cobertura (%)	Índice
Contínua ou quase contínua	≥ 75	5
Descontínua e em grande número	≥ 50 e < 75	4
Dispersa, com numerosos indivíduos	≥ 25 e < 50	3
Rala, com poucos indivíduos	> 5 e < 25	2
Esporádica, com indivíduos de pequeno porte	< 5	1
Pequena e rara	< 1	R

Legenda: R = Pequena e Rara. Fonte: Braun-Blanquet *et al.* (1932).

As plantas coletadas foram armazenadas em sacos plásticos individuais, sendo dispostas entre folhas de jornal e papelão para prensagem entre ripas de madeira (**Fotos 3.2.4-1 e 3.2.4-2**). A seguir, as prensas foram levadas à estufa para secagem e posterior montagem das exsicatas. Realizou-se a conservação de plantas com estruturas frágeis em álcool 70%, visando posterior análise taxonômica.

Procedeu-se a identificação do material botânico por meio da análise das estruturas dos vegetais a olho nu e sob microscópio estereoscópico, com auxílio de bibliografia especializada, tais como Souza & Lorenzi (2008), Barroso (1991); Cook (1996); Wanderley *et al.*, (2001-2009); Amaral *et al.* (2008). Adotou-se para angiospermas o sistema de classificação indicado pelo APG III -Angiosperm Phylogeny Group III (Bremer *et al.*, 2009) e para samambaias o de Smith *et al.* (2006).

Todo material coletado foi devidamente etiquetado com dados de família, gênero, espécie, coletor, ponto e data da coleta e será destinado ao herbário para tombamento em coleção científica. Os relatórios de ensaio das macrófitas aquáticas constam no Anexo IV.



Fotos 3.2.4-1 e 3.2.4-2. Armazenamento de exemplares de macrófitas aquáticas.

3.3. Análise de Dados

Na avaliação dos resultados adotaram-se os índices detalhados a seguir.

- **Análise Qualitativa**

- **Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa**

A composição taxonômica compreende a caracterização dos táxons presentes nas amostras. A riqueza de táxons é obtida pela contagem do número de táxons registrados em cada ponto. Para a riqueza considera-se ainda a integração dos dados obtidos na amostragem quantitativa. A riqueza relativa, expressa em porcentagem, apresenta a proporção do número de táxons de cada grupo inventariado. Na análise da riqueza, considerou-se cada espécie, morfoespécie e organismo que não puderam ser identificados a nível específico como um táxon.

- **Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência**

A leitura da distribuição espacial dos organismos na rede de amostragem foi realizada com base na presença ou na ausência de determinado táxon nos pontos de coleta.

— **Espécies Exóticas, Ameaçadas e Importância**

Avaliou-se a presença de espécies exóticas nas comunidades planctônicas e bentônicas das áreas amostradas, tendo como principal referência o Informe sobre Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais no Brasil (MMA, 2016).

Adicionalmente, verificou-se ocorrência de táxons da fauna ameaçados, tendo como base a Portaria MMA nº 445/14, a qual elenca as espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção, e Decreto Estadual nº 63.853/18, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no estado de São Paulo.

Para macrófitas aquáticas, foi verificada a distribuição, endemismo e origem de cada táxon através da Lista de Espécies da Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL, no prelo). Foram avaliados também os táxons raros ou descritos nas listas da Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Selvagens (CITES), além das listas de espécies ameaçadas de extinção do Brasil (MMA, 2022) e do estado de São Paulo (SMA, 2016).

Com base em Lorenzi (2008), Kissmann (1997) e Kissmann & Groth (1999 e 2000) foi possível verificar quais táxons são considerados infestantes. Consultou-se Lorenzi e Matos (2008), para verificar os táxons com valor medicinal, Lorenzi e Souza (2001) para os táxons ornamentais e Pott & Pott (2000) para os táxons comestíveis.

- **Análise Quantitativa**

- **Densidade e Abundância Relativa das Comunidades Planctônicas e Bentônicas**

A densidade representa a quantidade de organismos presente nas amostras por volume amostrado. A abundância relativa indica a proporção numérica de cada grupo ou táxon presente na amostra considerada, sendo calculada pela seguinte fórmula:

$$AR = \frac{n \cdot 100}{N}$$

Sendo:

AR = abundância relativa;

n = número total de organismos do grupo ou táxon;

N = número total de organismos na amostra.

— Índice de Cobertura de Macrófitas Aquáticas

As espécies presentes em cada banco de macrófitas tiveram sua respectiva cobertura estimada em campo através do índice de cobertura de Braun-Blanquet *et al.* (1932), conforme anteriormente apresentado no **Quadro 3.2.4-1**.

— Índices de Diversidade e Equitabilidade das Comunidades Planctônicas e Bentônicas

O índice de diversidade de Shannon-Wiener relaciona o número de táxons e a distribuição da abundância entre os diferentes táxons de determinada amostra, sendo calculado pela seguinte fórmula:

$$H' = -\sum p_i \cdot \log_2 p_i$$

e

$$p_i = \frac{n}{N}$$

Sendo:

H' = índice de diversidade de Shannon-Wiener, em bit.ind⁻¹;

p_i = abundância relativa;

n = número de indivíduos coletados de cada táxon;

N = total de indivíduos coletados na amostra.

O índice de equitabilidade se refere à distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo proporcional à diversidade e inversamente proporcional à dominância. A medida de equitabilidade compara a diversidade de Shannon-Wiener com a distribuição das espécies observadas. Este índice é obtido através da equação:

$$J = \frac{H'}{H' \text{ máximo}}$$

Sendo:

J = equitabilidade;

H' = índice de Shannon-Wiener;

H' máximo = diversidade máxima.

— Índice de Similaridade

Para as comunidades planctônicas e bentônicas, o grau de semelhança entre os pontos de coleta foi avaliado com base no índice de Bray-Curtis. A matriz de similaridade foi comparada com uma matriz cofenética, visando aumentar a confiabilidade das conclusões extraídas da interpretação do dendrograma (KOPP *et al.*, 2007). Como critério de fidelidade, foram adotados valores iguais ou superiores a 0,70 (ROHLF, 1970).

Para comparar a composição espacial das comunidades de macrófitas, calculou-se a similaridade a partir de matrizes de presença/ausência entre os bancos de macrófitas. Para tanto, utilizou-se a análise de agrupamento do tipo cluster, com a medida de similaridade de Jaccard para dados qualitativos como coeficiente de associação (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), e método de ligação do tipo UPGMA (média de grupo), o qual atribui o ponto de amostragem ao grupo com o qual este tem a maior similaridade média (VALENTIN, 2000).

— Índice da Comunidade Bentônica - ICB

Na avaliação dos invertebrados bentônicos dos pontos monitorados utilizou-se o Índice da Comunidade Bentônica – ICB para rios, de acordo com os critérios estabelecidos pela CETESB (2020). Na realização dessa análise, empregaram-se os resultados de quatro descritores ecológicos - riqueza de táxons (S), diversidade de Shannon-Wiener (H'), dominância de grupos tolerantes (T/DT) e riqueza de táxons sensíveis (Ssens).

Segundo a Cetesb (2019), são considerados tolerantes os Tubificidae sem queta capilar, Tubificidae com queta capilar (se *Tubifex*), Naididae e *Chironomus*, em rios, e *Limnodrilus hoffmeisteri*, *Bothrioneurum*, *Tubifex*, *Dero*, *Pristina*, *Pristinella* e *Chironomus*, em reservatórios. Na composição da riqueza de táxons sensíveis (Ssens) às perturbações ambientais, considera-se a presença nas amostras de organismos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera e os gêneros *Stempellina*, *Stempellinela* e *Constempellina* de Chironomidae-Tanytarsini, em rios, e as famílias de Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera e os gêneros *Stempellina*, *Stempellinela* e *Constempellina* de Chironomidae-Tanytarsini, em reservatórios.

No **Quadro 3.3-1** e no **Quadro 3.3-2** constam os critérios adotados para a classificação final do ICB para rios e reservatórios, respectivamente. O conjunto desses descritores compõe um índice multimétrico, cuja resultante é expressa pela média aritmética do ranking dos índices parciais. Os valores obtidos, entre 1 e 5, permitem a classificação do ambiente aquático em cinco categorias: Ótima, Boa, Regular, Ruim e Péssima (ambiente azóico, ou seja, que não permite o desenvolvimento das comunidades bentônicas).

Quadro 3.3-1. Índice da Comunidade Bentônica – ICB para rios.

Riqueza de Táxons (S)	Índice de Diversidade (H')	Dominância de grupos tolerantes (T/DT)	Riqueza de Táxons Sensíveis (Ssens)	Pontuação	Classificação
≥21	>2,5	<0,25	≥3	1	Ótima
14 - 20	>1,50 - ≤2,50	≥0,25 - ≤0,50	2	2	Boa
6 - 13	>1,00 - ≤1,50	>0,50 - ≤0,75	1	3	Regular
≤5	≤1,0	>0,75	0	4	Ruim
AZÓICO				5	Péssima

Fonte: CETESB (2019). Nota: T/DT representa o cálculo da densidade dos organismos tolerantes (T) sobre a densidade total (DT) de invertebrados bentônicos coletados no ponto.

Quadro 3.3-2. Índice da Comunidade Bentônica – ICB para a zona sublitoral de reservatório.

Riqueza de Táxons (S)	Índice de Diversidade (H')	Dominância de grupos tolerantes (T/DT)	Riqueza de Táxons Sensíveis (Ssens)	Pontuação	Classificação
≥25	>3,5	<0,10	≥3	1	Ótima
17 - 24	>2,25 - ≤3,50	≥0,10- ≤0,40	2	2	Boa
set/16	>1,50 - ≤2,25	>0,40 - ≤0,70	1	3	Regular
01/ago	≤1,50	≥0,70	0	4	Ruim
AZÓICO				5	Péssima

Fonte: Cetesb (2019). Nota: T/DT representa o cálculo da densidade dos organismos tolerantes (T) sobre a densidade total (DT) de invertebrados bentônicos coletados no ponto.

4. RESULTADOS OBTIDOS

Na sequência, é apresentada a caracterização dos corpos hídricos avaliados e os resultados das comunidades aquáticas monitoradas, tendo como base os dados obtidos na décima quarta campanha, realizada em outubro de 2022, na transição do período seco para o chuvoso.

4.1. Caracterização dos Pontos de Amostragem

Na sequência, consta a descrição dos locais monitorados. Os registros de campo obtidos na décima quarta campanha são sintetizados no **Quadro 4.1-1**. Demais medições “*in situ*” e resultados detalhados da qualidade da água constam no Relatório do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos.

O tempo estava variou entre nublado e bom durante as coletas do dia 28 de outubro de 2022, sendo que no período de 24 horas antecedentes às amostragens houve ocorrência de chuva. A temperatura da água se manteve entre 23,0°C (P04) e 25,0°C (P03, P05 e P07). No geral, essas diferenças se associam ao horário da coleta e ao grau de sombreamento dos corpos hídricos.

Quadro 4.1-1. Registros de Campo e Medições *in situ* – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Registros de Campo	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07
Data da Coleta	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022
Hora da Coleta	09:20	11:49	12:11	12:44	13:26	11:04	10:24
Condição do Tempo Durante a Coleta	Nublado	Bom	Bom	Bom	Bom	Nublado	Nublado
Chuva nas Últimas 24h	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mata Ciliar	Parcialmente Preservada	Parcialmente Preservada	Ausente	Parcialmente Preservada	Parcialmente Preservada	Parcialmente Preservada	Ausente
Temperatura da água (°C)	24,0	24,0	24,0	25,0	25,0	23,0	25,0
Profundidade (m)	3,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,45	0,5
Transparência (m)	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5

A seguir, consta a descrição dos corpos hídricos avaliados com o respectivo registro fotográfico dos pontos de coleta.

— **Rio Jaguari (pontos P01, P05, P02, P03 e P06)**

Este rio foi amostrado em cinco pontos estrategicamente distribuídos de montante para jusante: no trecho entre a PCH do Jaguari e o futuro reservatório Pedreira (P01); no corpo principal do futuro reservatório, a jusante do córrego Entre-Montes (P05); próximo à futura barragem (P02); a jusante do futuro reservatório (P03) e no ponto de captação de abastecimento de Pedreira (P06), ilustrados nas **Fotos 4.1-1 a 4.1-10**.



Fotos 4.1-1 e 4.1-2. Ponto P01 - Rio Jaguari, a montante do futuro reservatório.



Fotos 4.1-3 e 4.1-4. Ponto P05 - Rio Jaguari, no corpo principal do futuro reservatório, a jusante do córrego Entre-Montes.



Fotos 4.1-5 e 4.1-6. Ponto P02 - Rio Jaguari, próximo à futura barragem, no trecho onde estão concentradas as obras de implantação da barragem.



Fotos 4.1-7 e 4.1-8. Ponto P03 - Rio Jaguari, a jusante do reservatório projetado.



Fotos 4.1-9 e 4.1-10. Ponto P06 - Rio Jaguari, na cidade de Pedreira, no local de captação de água para abastecimento.

O rio Jaguari é formado em vale encaixado, contendo inúmeras manchas com remanescentes de vegetação nativa dispersas entre os núcleos rurais, que representam a principal ocupação do entorno dos pontos amostrados, com exceção da captação para abastecimento público de Pedreira (P06), inserida em plena área urbana deste município, onde o entorno é ocupado por residências.

No geral, a mata ciliar nos trechos amostrados se encontra relativamente preservada. Contudo, à altura do ponto P02 são observados trechos onde a vegetação foi suprimida em função das obras para implantação do reservatório e do canteiro de obras do empreendimento, alocado margem direita do rio Jaguari. Em ambas as margens do rio Jaguari, neste ponto, se encontram taludes com solo exposto, sendo este local o potencialmente mais afetado pelas obras, bem como o trecho a jusante (P03).

Previamente à décima quarta campanha (outubro/22), as atividades das obras nesta barragem incluíram a escavação e carga de material, transporte de material e espalhamento em bota fora; na área do vertedouro e na bacia de dissipação: concretagem; na galeria de desvio: montagem de aço, montagem de forma argamassa projetada, concretagem e limpeza rigorosa da fundação em rocha. As atividades das obras se concentram principalmente à altura dos pontos P02 e P03.

No curso do rio Jaguari há inúmeros trechos de corredeiras entremeados por segmentos de águas mais tranquilas. Na campanha de outubro de 2022, o local mais raso, com profundidade de 0,3 m, foi verificado no corpo principal do futuro reservatório onde se observam as atividades das obras no entorno (P02), atingindo o máximo de 3,6 m no ponto a montante do futuro reservatório (P01). A transparência esteve acima de 0,3 m em todos os pontos no rio Jaguari, com máximo de 0,6 m no ponto P01, a montante do futuro reservatório.

— **Córrego Entre-Montes (ponto P04)**

O córrego Entre-Montes, tributário da margem direita do rio Jaguari, constitui um dos principais braços formadores do futuro reservatório de Pedreira (**Fotos 4.1-11 e 4.1-12**). A mata ciliar tende a ser mais preservada na margem direita em relação à margem esquerda, a qual é predominantemente alterada em função de propriedades rurais no entorno.

No segmento amostrado, próximo à foz, as águas são veiculadas em leito conformado em substrato rochoso. Durante a última amostragem no córrego Entre-Montes (P04) observou-se profundidade de 0,45 m e transparência total de 0,3 m, com velocidade de corrente de 0,047 m/s.



Fotos 4.1-11 e 4.1-12. Ponto P04 - Córrego Entre-Montes, em trecho com presença de rochas no leito do curso hídrico.

— **Afluente do rio Jaguari (ponto P07)**

Esse afluente, amostrado em local parcialmente represado por uma barragem particular, forma um ambiente tipicamente lântico (**Fotos 4.1-13 e 4.1-14**). No local monitorado, imediatamente a montante do braço formador do futuro reservatório de Pedreira, a profundidade e a transparência medida foi de 0,5 m.



Fotos 4.1-13 e 4.1-14. Ponto P07 – Afluente do rio Jaguari, parcialmente represado por uma barragem particular.

4.2. Fitoplâncton

• Análise Qualitativa

Na décima quarta campanha de monitoramento da biota aquática, realizada em outubro/2022, na transição do período seco para o chuvoso, foi inventariado um total de 62 táxons de fitoplâncton, pertencentes a 12 classes taxonômicas: Bacillariophyceae (16 táxons), Chlorophyceae (8 táxons), Conjugatophyceae (10 táxons), Coscinodiscophyceae (3 táxons), Cryptophyceae (1 táxon), Cyanophyceae (8 táxons), Dinophyceae (1 táxon), Euglenophyceae (8 táxons), Klebsormidiophyceae (1 táxon), Mediophyceae (3 táxons), Trebouxiophyceae (2 táxons) e Xanthophyceae (1 táxon).

A comunidade fitoplanctônica registrada no rio Jaguari, no córrego Entre-Montes e na barragem particular foi predominantemente formada por diatomáceas bacilariofíceas (classe Bacillariophyceae), com 25,8% da riqueza total (**Gráfico 4.2-1**), o que constitui um resultado recorrente nos ambientes aquáticos monitorados.




Gráfico 4.2-1. Riqueza Relativa do Fitoplâncton por Classe Taxonômica – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

A classe Bacillariophyceae integra o grupo das diatomáceas, que juntamente com Coscinodiscophyceae (coscinodiscofíceas) e Mediophyceae (mediofíceas) somaram 35,5% da riqueza relativa do fitoplâncton.

As diatomáceas agregam espécies que possuem elevada taxa de sedimentação no meio aquático, devido à composição de sua parede celular, constituída por sílica. Esse grupo é bastante representativo em ecossistemas aquáticos continentais, tanto em termos de riqueza de espécies como em abundância (HOEK *et al.* 1995).

Nos corpos hídricos avaliados, na décima quarta campanha, as bacilariofíceas foram representadas por 16 táxons: *Amphipleura* sp1., *Amphora* sp1., *Cocconeis* sp1., *Cymbella* sp1., *Eunotia* sp1., *Fragilaria* sp1., *Gomphonema* sp1., *Gyrosigma* sp1., *Naviculaceae* N.I. 1, *Navicula* sp1., *Nitzschia* sp1., *Pinnularia* sp1, *Sellaphora* sp1, *Surirella linearis*, *Surirella* sp1. e *Ulnaria ulna*.

As coscinodiscofíceas reuniram três táxons (*Aulacoseira granulata*, *Hydrosera whampoensis* e *Melosira varians*), assim como as mediofíceas (*Cyclotella* sp. 1, *Thalassiosira* sp1. e *Terpsinoë musica*).

As conjugatofíceas (Conjugatophyceae), que apresentaram a segunda maior riqueza (16,1%), formam um grupo diverso e predominantemente distribuído em ambientes dulcícolas (GUIRY, 2013), englobando elevado número de espécies típicas de sistemas aquáticos oligotróficos, porém, com representantes relacionados a sistemas eutróficos (COESEL, 1982 apud MELO e SOUZA, 2009; SILVA, 1999). Os exemplares desta classe registrados na décima quarta campanha são integrantes dos gêneros *Closterium*, *Cosmarium*, *Hyalotheca*, *Mougeotia*, *Spirogyra*, *Staurastrum* e *Stauroidesmus*.

As classes Chlorophyceae, Cyanophyceae e Euglenophyceae, durante a presente campanha se caracterizam como o terceiro grupo mais diverso, com 12,9% do total de táxons.

A classe Chlorophyceae, inclui as algas verdes, organismos cosmopolitas que apresentam imensa variedade morfológica. A maioria delas é típica de água doce e pode ter hábito planctônico e bentônico, crescendo em ambientes de amplo espectro de salinidade e de eutrofização. De acordo com Henry (1999), as clorofíceas compõem um dos grupos de maior importância ecológica nos ecossistemas aquáticos continentais. Na malha amostral, essas algas foram representadas por oito gêneros na campanha de outubro de 2022: *Chlamydomonas*, *Coelastrum*, *Desmodesmus*, *Kirchneriella*, *Monoraphidium*, *Scenedesmus* e *Stauridium*.

As cianobactérias (Cyanophyceae) reúne espécies que possuem eficientes estratégias de sobrevivência, propiciadas por suas características ecológicas e fisiológicas. Dentre os fatores-chave para seu sucesso reprodutivo e desenvolvimento, destaca-se a estabilidade da coluna da água pela presença de mucilagem ou vacúolos gasosos (aerótopos) em várias

espécies, permitindo que as células regulem sua flutuação em resposta à disponibilidade de luz e nutrientes.

Algumas espécies desse grupo podem armazenar fósforo no interior de suas células e possuem a capacidade de assimilar o gás nitrogênio diretamente da atmosfera, o que representa uma vantagem em ambientes com menor disponibilidade desses nutrientes. Frequentemente formam esporos de resistência e sofrem relativamente menor pressão de herbivoria pelo zooplâncton e por outros organismos aquáticos.

Essas características atribuem uma vantagem competitiva sobre os demais seres fitoplanctônicos e favorecem seu rápido crescimento, sobretudo em ambientes lênticos e com temperaturas superiores de 25°C. Nessas condições, podem chegar a formar florações e liberar compostos tóxicos no meio aquático.

No rio Jaguari e contribuintes, foram detectadas cianobactérias de oito gêneros, alguns dos quais são potencialmente produtores de toxinas, ao formarem florações, tais como *Oscillatoria* e *Phormidium*.

As euglenofíceas (Euglenophyceae) apresentaram integrantes dos gêneros *Euglena*, *Lepocinclis*, *Phacus* e *Trachelomonas*. As algas dessa classe agrupam seres unicelulares e filamentosos, predominantemente habitantes de sistemas aquáticos continentais, sendo comumente encontradas em sistemas aquáticos poluídos, enriquecidos por materiais orgânicos, onde podem se desenvolver massivamente, resultando em florações. A possibilidade de se movimentarem através dos flagelos constitui uma adaptação deste grupo em ambientes com elevada turbidez, permitindo que utilizem nutrientes acumulados em camadas mais profundas e retornem a seguir para a região eufótica (BRANCO, 1986).

A classe Trebouxiophyceae representou 3,2% da riqueza total amostrada na décima quarta campanha da implantação. As trebouxiófíceas são seres unicelulares e filamentosos, predominantemente em sistemas aquáticos continentais. Nas amostras obtidas no rio Jaguari e seus afluentes foram coletados dois diferentes gêneros: *Chlorella* e *Dictyosphaerium*.

Os demais grupos fitoplanctônicos (classes Cryptophyceae, Dinophyceae, Klebsormidiophyceae e Xanthophyceae) tiveram menor participação relativa na riqueza do fitoplâncton, representando, individualmente, valores iguais a 1,6% do total de táxons coletados.

Em termos espaciais, constatou-se que os valores de riqueza do fitoplâncton, nesta décima quarta campanha, foram relativamente próximos entre os pontos de amostragem situados no rio Jaguari, com mínimo de 17 táxons (P01) e máximo de 23 táxons (P03), com exceção do ponto P05, a jusante do córrego Entre-Montes, que apresentou 32 táxons. O ponto

P02, onde se concentram as obras de infraestrutura, mostrou a segunda menor riqueza dentre os pontos do rio Jaguari (19 táxons), indicando que neste local a riqueza de espécies pode estar sofrendo efeitos negativos intensos da implantação do barramento.

A riqueza amostrada no córrego Entre-Montes (P04) foi a maior observada durante a campanha (35 táxons) e, antagonicamente, foram amostrados apenas 20 táxons no ponto do reservatório Jaguari (P07), único ambiente lêntico da malha amostral (**Gráfico 4.2-2 e Quadro 4.2-1**).

Em termos de distribuição dos grupos taxonômicos foram observadas semelhanças entre os pontos de ambientes lóticos do rio Jaguari e do córrego Entre-Montes com o reservatório Jaguari (P07), único ambiente lêntico da malha amostral. Nestes locais, ocorreu predomínio de diatomáceas, sobretudo da classe Bacillariophyceae, bem como das classes Chlorophyceae e Cyanophyceae. Este resultado corrobora os encontrados nas campanhas anteriores deste programa.

A maior riqueza de diatomáceas observada é comum em vários ecossistemas aquáticos, sendo as Bacillariophyceae frequentemente relatadas como as principais colonizadoras de substratos naturais, como rochas, sedimentos e macrófitas (MOSCHINI-CARLOS, 1996).




Gráfico 4.2-2. Riqueza do Fitoplâncton por Ponto de Amostragem – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

– Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência

O **Quadro 4.2-1** apresenta a distribuição espacial e a frequência de ocorrência do fitoplâncton, registradas na décima quarta campanha de monitoramento, efetuada em outubro de 2022.

Dos 62 táxons inventariados, três ocorreram em todos os pontos de amostragem, com 100% de frequência de ocorrência, sendo considerados muito frequentes segundo a classificação de Souza *et al.* (2009), o que indica alta adaptabilidade às condições ambientais locais. Foram as bacilariofíceas *Cymbella* sp1. e *Navicula* sp1., além do exemplar não identificado de criptofíceas (*Cryptophyceae*).

Dentre essas, a bacilariofíceas *Navicula* agrupa um grande número de espécies, algumas das quais não são dotadas de pedúnculos de adesão, encontrando-se livremente na coluna d'água. Quando presas ao substrato, apresentam uma adesão fraca, podendo ser removidas pela ação de distúrbios frequentes (STEVENSON & PETERSON, 1989).

Tiveram destaque ainda na rede amostral outros cinco táxons que também foram considerados muito frequentes nas amostras (entre 80% e 100%), ocorrendo em seis dos sete pontos monitorados (frequência de 86%), correspondendo as bacilariofíceas *Amphipleura* sp1., *Cocconeis* sp. 1., *Pinnularia* sp1. e *Ulnaria ulna* e a coscinodiscofíceas *Melosira varians*.

A maioria dos táxons registrados como muito frequentes já teve ocorrência verificada em amostragens anteriores deste programa, o que reforça que estão adaptados às condições ambientais no trecho monitorado, além de serem exemplares típicos do plâncton de rios.

Outros oito táxons foram considerados frequentes nas amostras (entre 50 e 80%), porém, a maioria das espécies (46) se enquadrou na categoria pouco frequente (entre 17 e 50%) ou esporádica (<17%).

A comparação entre os táxons que tiveram ocorrência restrita ao ambiente lântico (P07) em relação aos demais pontos lóticos evidencia semelhança em termos de composição, sendo observado sete táxons cuja presença foi exclusiva no ponto P07.

No conjunto dos táxons fitoplancctônicos inventariados, não foi registrada a ocorrência de espécies exóticas, tendo como referência o Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais no Brasil (MMA, 2016).

Nas **Fotos 4.2-1 a 4.2-4** consta o registro fotográfico de alguns táxons do fitoplâncton detectados na malha amostral na campanha em foco. O **Quadro 4.2-1** apresenta a distribuição espacial e a frequência de ocorrência do fitoplâncton registradas na décima quarta campanha de monitoramento, efetuada em outubro de 2022.



Foto 4.2-1. Cianobactéria *Phormidium* sp1.




Foto 4.2-2. Bacilariofícea *Pinnularia* sp1.




Foto 4.2-3. Conjugatofícea *Cosmarium* sp.1.

Fonte: Banco de dados da Econsult (2021).



Foto 4.2-4. Dinofícea *Peridinium* sp.1

Quadro 4.2-1. Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)																																																																																																																																												
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07																																																																																																																																														
Bacillariophyceae																																																																																																																																																					
<i>Amphipleura</i> sp. 1								6	85,7																																																																																																																																												
<i>Amphora</i> sp. 1								2	28,6																																																																																																																																												
<i>Cocconeis</i> sp. 1								6	85,7																																																																																																																																												
<i>Cymbella</i> sp. 1								7	100,0																																																																																																																																												
<i>Eunotia</i> sp. 1								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Fragilaria</i> sp. 1								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Gomphonema</i> sp. 1								5	71,4																																																																																																																																												
<i>Gyrosigma</i> sp. 1								3	42,9																																																																																																																																												
Naviculaceae N.l. 1								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Navicula</i> sp. 1								7	100,0																																																																																																																																												
<i>Nitzschia</i> sp. 1								5	71,4																																																																																																																																												
<i>Pinnularia</i> sp. 1								6	85,7																																																																																																																																												
<i>Sellaphora</i> sp. 1								2	28,6																																																																																																																																												
<i>Surirella linearis</i>								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Surirella</i> sp. 1								3	42,9																																																																																																																																												
<i>Ulnaria ulna</i>								6	85,7	Subtotal	6	12	10	10	9	10	5			Chlorophyceae										<i>Chlamydomonas</i> sp. 1								2	28,6	<i>Coelastrum microporum</i>								1	14,3	<i>Coelastrum reticulatum</i>								2	28,6	<i>Desmodesmus</i> sp. 1								3	42,9	<i>Kirchneriella</i> sp. 1								1	14,3	<i>Monoraphidium arcuatum</i>								2	28,6	<i>Scenedesmus</i> sp. 1								1	14,3	<i>Stauridium tetras</i>								2	28,6	Subtotal	-	5	-	-	1	5	3			Conjugatophyceae										<i>Closterium closterioides</i>								1	14,3	<i>Closterium</i> sp. 1								4	57,1
Subtotal	6	12	10	10	9	10	5																																																																																																																																														
Chlorophyceae																																																																																																																																																					
<i>Chlamydomonas</i> sp. 1								2	28,6																																																																																																																																												
<i>Coelastrum microporum</i>								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Coelastrum reticulatum</i>								2	28,6																																																																																																																																												
<i>Desmodesmus</i> sp. 1								3	42,9																																																																																																																																												
<i>Kirchneriella</i> sp. 1								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Monoraphidium arcuatum</i>								2	28,6																																																																																																																																												
<i>Scenedesmus</i> sp. 1								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Stauridium tetras</i>								2	28,6	Subtotal	-	5	-	-	1	5	3			Conjugatophyceae										<i>Closterium closterioides</i>								1	14,3	<i>Closterium</i> sp. 1								4	57,1																																																																																																				
Subtotal	-	5	-	-	1	5	3																																																																																																																																														
Conjugatophyceae																																																																																																																																																					
<i>Closterium closterioides</i>								1	14,3																																																																																																																																												
<i>Closterium</i> sp. 1								4	57,1																																																																																																																																												

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
<i>Cosmarium</i> sp. 1								5	71,4
<i>Cosmarium</i> sp. 2								1	14,3
<i>Hyalotheca dissiliens</i>								1	14,3
<i>Mougeotia</i> sp. 1								1	14,3
<i>Spirogyra</i> sp. 1								1	14,3
<i>Staurastrum rotula</i>								1	14,3
<i>Staurastrum</i> sp. 1								2	28,6
<i>Staurodesmus</i> sp. 1								1	14,3
Subtotal	1	2	1	3	1	8	2		
Coccinodiscophyceae									
<i>Aulacoseira granulata</i>								4	57,1
<i>Hydrosera whampoensis</i>								3	42,9
<i>Melosira varians</i>								6	85,7
Subtotal	1	3	3	2	1	3	-		
Cryptophyceae									
Cryptophyceae N.I. 1								7	100,0
Subtotal	1	1	1	1	1	1	1		
Cyanophyceae									
<i>Aphanocapsa</i> sp. 1								1	14,3
<i>Geitlerinema</i> sp. 1								1	14,3
<i>Komvophoron</i> sp. 1								3	42,9
<i>Merismopedia</i> sp. 1								2	28,6
<i>Oscillatoria</i> sp. 1								1	14,3
<i>Phormidium</i> sp. 1								5	71,4
<i>Planktolyngbya</i> sp. 1								1	14,3
<i>Pseudanabaena</i> sp. 1								3	42,9
Subtotal	1	3	2	3	4	3	1		
Dinophyceae									
<i>Peridinium</i> sp. 1								5	71,4
Subtotal	1	1	-	1	-	1	1		
Euglenophyceae									
<i>Euglena</i> sp. 1								2	28,6
<i>Lepocinclis</i> sp. 1								4	57,1

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
<i>Phacus longicauda</i> var. <i>tortus</i>								1	14,3
<i>Phacus</i> sp. 1								3	42,9
<i>Trachelomonas armata</i>								2	28,6
<i>Trachelomonas similis</i>								1	14,3
<i>Trachelomonas volvocina</i>								3	42,9
<i>Trachelomonas volvocinopsis</i>								1	14,3
Subtotal	4	4	-	2	2	2	3		
Klebsormidiophyceae									
<i>Elakatothrix</i> sp. 1								1	14,3
Subtotal	-	-	-	-	-	-	1		
Mediophyceae									
<i>Cyclotella</i> sp. 1								1	14,3
<i>Thalassiosira</i> sp. 1								3	42,9
<i>Terpsinoë musica</i>								3	42,9
Subtotal	1	1	1	1	2	-	1		
Trebouxiophyceae									
<i>Chlorella</i> sp. 1								3	42,9
<i>Dictyosphaerium</i> sp. 1								3	42,9
Subtotal	1	-	1	-	-	2	2		
Xanthophyceae									
<i>Isthmochloron</i> sp. 1								1	14,3
Subtotal	-	-	-	-	1	-	-		
Total	17	32	19	23	22	35	20		
Total da Campanha	62								

- **Análise Quantitativa**

- **Densidade e Abundância Relativa**

A análise quantitativa do fitoplâncton, na campanha de monitoramento da biota aquática realizada em outubro de 2022, inclui os resultados de densidade (org./mL) e de abundância relativa (%) das classes taxonômicas (**Quadro 4.2-2**). A densidade fitoplanctônica nos ecossistemas aquáticos é resultado da dinâmica de interações entre as características fisiológicas dos organismos e dos fatores abióticos, que exercem influência na produtividade primária do fitoplâncton, com reflexo na composição e na abundância de seres zooplanctônicos e bentônicos.

A densidade do fitoplâncton apresentou ampla variação no rio Jaguari, predominando baixos valores de densidade, em todos os pontos (<1.000 org./mL).

A condição hidrodinâmica desse rio, determinada pela velocidade de correnteza que promove turbulência de suas águas, associada ao sombreamento promovido pela vegetação ciliar em alguns trechos, que reduz a disponibilidade de luz para os processos fotossintéticos, interferem no estabelecimento das comunidades fitoplanctônicas ao longo do segmento monitorado.

Os maiores valores de densidade observados neste ambiente foram relativos à abundância das algas Cryptophyceae, que registraram apenas 17 org./mL, representando 50%, ou mais, da amostra em todos os pontos amostrais do rio Jaguari. No ponto P01, a abundância foi relativa à totalidade de organismos amostrados (100%).

As criptofíceas são consideradas oportunistas, aumentando sua densidade quando a das demais algas decrescem. Oliveira & Calheiros (2000) associaram a dominância de Cryptophyceae às condições adversas para o desenvolvimento de algas de outros grupos, como baixa disponibilidade de nutrientes. Segundo Klaveness (1988), elas ocorrem em diversos sistemas aquáticos, com picos de desenvolvimento depois de perturbações e misturas ocasionadas por vento ou precipitação. Isaksson (1998) relatou sua capacidade de absorver compostos dissolvidos no meio, podendo crescer em baixas luminosidades.

No córrego Entre-Montes (P04) também foi computada baixa densidade, com 21 org./mL, sendo a ampla maioria dos organismos algas criptofíceas (11 org./mL).

O **Gráfico 4.2-3** ilustra os as diminutas densidades registradas nos pontos do rio Jaguari e do córrego Entre-Montes durante a décima quarta campanha.




Gráfico 4.2-3. Densidade do Fitoplâncton no rio Jaguari e córrego Entre-Montes – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

No afluente represado do rio Jaguari (P07) foi registrada densidade superior aos demais ambientes, com 6.498 org./mL (**Gráfico 4.2-4**). Este resultado foi similar ao encontrado na maioria das campanhas anteriores, onde o ambiente lântico se destacou pela maior densidade de algas em comparação com os ambientes lóticos. Neste afluente, as mediófitáceas *Thalassiosira* sp1. predominaram numericamente, com 3.709 org./mL. De modo geral, a hidrodinâmica de sistemas lânticos, onde é maior o tempo de residência das águas e com a maior estabilidade da coluna d'água e disponibilidade de nutrientes, favorece o crescimento das populações de algas e cianobactérias.




Gráfico 4.2-4. Densidade do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

A baixa densidade do fitoplâncton verificada nos pontos no rio Jaguari e no córrego Entre-Montes é um resultado comum em sistemas lóticos, que geralmente possuem baixas concentrações de nutrientes e acentuada velocidade de corrente. Esta baixa produtividade primária no rio Jaguari foi corroborada pela análise de clorofila-a, cujos valores não atingiram o limite de detecção do método analítico (1 µg/L) na maioria dos pontos do rio Jaguari, exceto em P01, que apresentou concentração inferior ao valor máximo permitido (2,4 µg/L) e no córrego Entre-Montes. No afluente do rio Jaguari, na barragem particular (P07), os valores de clorofila não ultrapassaram o valor máximo permitido, contudo foram superiores aos demais pontos amostrais (9,35 µg/L).

Os resultados do Índice de Estado Trófico – IET, detalhados no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, mostram níveis intermediários de trofia, com classificação Mesotrófica para todos os pontos do rio Jaguari, para o córrego Entre-Montes (P04) e para o efluente represado (P07).

O grupo mais abundante na maioria dos pontos do rio Jaguari foi Cryptophyceae, exceto no ponto P06, onde as Bacillariophyceae fizeram-se abundantes na mesma intensidade, representando cada classe 50% da amostra. No córrego Entre-Montes (P04), Cryptophyceae também se destacou pela maior abundância entre os grupos, representando 52% da comunidade. Na barragem particular (P07), como mencionado anteriormente, as mediófitas totalizaram 57% dos organismos encontrados no fitoplâncton, conforme **Gráfico 4.2-5**.




Gráfico 4.2-5. Abundância Relativa do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

A análise do fitoplâncton compreendeu também a contagem de células de cianobactérias, possibilitando avaliar o atendimento à Resolução CONAMA nº 357/05, que determina o valor máximo de 50.000 cél./mL para águas doces classe 2.

Nesta campanha em foco (outubro/2022) as cianobactérias foram ausentes nas amostras quantitativas dos pontos P01, P02 e P06 do rio Jaguari, do córrego Entre-Montes (P04) e do afluyente represado do rio Jaguari (P07). O grupo foi encontrado em dois pontos do rio Jaguari, onde se detectou 5 cél./mL a jusante do córrego Entre-Montes (P05) e 10 cél./mL, a jusante do futuro reservatório (P03), referente à um único táxon (*Phormidium* sp1). Assim, em todos os pontos houve atendimento ao padrão da legislação (**Gráfico 4.2-6**).

Esse resultado constitui um aspecto positivo, considerando que esse grupo possui táxons produtores de cianotoxinas, que podem acarretar prejuízos à biota aquática e à qualidade da água destinada ao abastecimento público, quando presentes em grande quantidade. A Portaria de Consolidação nº 5 indica a necessidade de monitorar cianotoxinas quando esses organismos atingem densidades elevadas (>20.000 cél./mL).

Dessa forma, sinaliza-se a importância do monitoramento desses organismos nos corpos hídricos avaliados, sobretudo na perspectiva de formação do reservatório de abastecimento, considerando que, de forma geral, o desenvolvimento de cianobactérias é comumente associado à conjunção de quatro fatores principais: concentrações elevadas de

fósforo, temperatura da água acima de 20°C, estabilidade da coluna d’água e populações pré-existentes.




Gráfico 4.2-6. Densidade de Células de Cianobactérias – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

Quadro 4.2-2. Densidade e Abundância Relativa do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Composição Taxonômica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluente do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%
Bacillariophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amphora</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-
<i>Cocconeis</i> sp. 1	<1	-	1	6,7	2	11,1	2	8,7	1	16,7	3	14,3	-	-
<i>Cymbella</i> sp. 1	-	-	<1	-	-	-	<1	-	<1	-	-	-	-	-
<i>Gomphonema</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
<i>Gyrosigma</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-
<i>Navicula</i> sp. 1	-	-	-	-	2	11,1	2	8,7	2	33,3	<1	-	35	0,5
<i>Nitzschia</i> sp. 1	-	-	1	6,7	1	5,6	2	8,7	<1	-	<1	-	-	-
<i>Ulnaria ulna</i>	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	<1	-	-	-
Subtotal	-	-	2	13,3	5	27,8	6	26,1	3	50,0	3	14,3	70	1,1
Chlorophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Desmodesmus</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
Conjugatophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Closterium</i> sp. 1	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Staurastrum</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
Coccinodiscophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Aulacoseira granulata</i>	-	-	3	20,0	2	11,1	<1	-	-	-	7	33,3	-	-
<i>Melosira varians</i>	<1	-	<1	-	1	5,6	-	-	<1	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	3	20,0	3	16,7	-	-	-	-	7	33,3	-	-
Cryptophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	12	100,0	10	66,7	10	55,6	17	73,9	3	50,0	11	52,4	389	6,0
Subtotal	12	100,0	10	66,7	10	55,6	17	73,9	3	50,0	11	52,4	389	6,0

Composição Taxonômica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluentes do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%	org./mL	%
Cyanophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phormidium</i> sp. 1	-	-	<1	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Peridinium</i> sp. 1	<1	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
Euglenophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Euglena</i> sp. 1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,5
<i>Trachelomonas volvocina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	1,6
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	2,2
Klebsormidiophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Elakatothrix</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.084	32,1
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.084	32,1
Mediophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thalassiosira</i> sp. 1	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	3.709	57,1
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.709	57,1
Xanthophyceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Isthmochloron</i> sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	12	100,0	15	100,0	18	100,0	23	100,0	6	100,0	21	100,0	6.498	100,0

Legenda: < 1 = valor inferior ao limite de quantificação do método analítico.

– Índices de Diversidade e Equitabilidade

Os resultados dos índices de diversidade e equitabilidade da comunidade fitoplanctônica amostrada na décima quarta campanha (outubro/22), na etapa de implantação do empreendimento, são apresentados no **Gráfico 4.2-7**.

O trecho monitorado no rio Jaguari apresentou diversidade entre 1,56 bits.ind⁻¹ no ponto a montante do futuro reservatório (P01) e 3,02 bits.ind⁻¹ no ponto de captação do abastecimento de Pedreira (P06).

O córrego Entre-Montes (P04) apresentou diversidade similar (2,15 bits.ind⁻¹), próxima ao registrado no ponto P05, a jusante do córrego (2,25 bits.ind⁻¹). Na barragem à margem esquerda do rio Jaguari (P07), a diversidade apresentou valor similar à mínima registrada no rio Jaguari, com 1,57 bits.ind⁻¹. A equitabilidade foi baixa (<0,5), apenas no ponto do P07, tendo a maioria dos pontos valores superiores a 0,6, com máxima de 0,95 no ponto P06 do rio Jaguari.




Gráfico 4.2-7. Índices de Diversidade e Equitabilidade do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

– Índice de Similaridade

A avaliação dos padrões de semelhança da comunidade fitoplanctônica, amostrada na décima quarta campanha do monitoramento da biota aquática na Barragem Pedreira (outubro/2022), foi embasada no índice de similaridade de Bray-Curtis (**Gráfico 4.2-8**).

Os resultados deste indicador apontam um nível baixo de similaridade, levemente superior a 45% entre os agrupamentos formados. O cluster principal, com similaridade superior a 65%, reuniu a maioria dos pontos do rio Jaguari (P01, P02, P03 e P05) e o córrego

Entre-Montes (P04), tendo maior grau de semelhança os pontos P02 e P05. A formação deste agrupamento foi fortemente influenciada pela elevada abundância de Cryptophyceae.

Há distinção entre os pontos supracitados e a amostra do ponto P06, com similaridade de 48%, a qual teve como particularidade a menor densidade de organismos amostrados durante a décima quarta campanha, sendo composta sobretudo por baciliariofócias e criptofícias. O ponto P07, que apresentou as maiores densidades, apresentou baixa similaridade aos demais pontos amostrais.

Cabe apontar que mesmo os pontos no rio Jaguari que são potencialmente mais afetados pelas obras do empreendimento (P02 e P03) apresentaram elevada similaridade com o ponto P01, situado a montante das obras, o que denota que não foram observadas interferências relevantes no fitoplâncton que possam ser associadas diretamente ao empreendimento.




Gráfico 4.2-8. Similaridade do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Coeficiente cofenético = 0,9874.

– **Evolução dos principais indicadores**

Conforme citado, foram realizadas quatorze campanhas de avaliação da comunidade fitoplanctônica e os resultados apontam que as maiores riquezas tenderam a ser verificadas em maio e junho de 2018, na etapa de pré-implantação do empreendimento, com um total de 122 táxons, e em fevereiro de 2019, já na fase de implantação, com 113 táxons.

Com o avanço da fase da implantação, sobretudo a partir de fevereiro de 2020, os valores de riqueza total se mostraram menores, variando entre 83 táxons (fevereiro/2020) e 60 táxons (junho/2022), sendo a menor riqueza observada, dentre as amostragens. No entanto, essa tendência também foi constatada no ponto P01, a montante da implantação e que não está sob efeito dos impactos da mesma, pelo que não é possível atribuir a perda de riqueza fitoplanctônica diretamente ao empreendimento, embora seja um ponto a ser acompanhado durante o monitoramento.

Foram observadas flutuações na composição e na abundância dessa comunidade na avaliação quantitativa, ora com dominância de diatomáceas (maio/junho/2018, junho/2019, junho/2020, outubro/2020 e outubro/2022), ora com dominância de euglenófitas e fitoflagelados (outubro/2018) e ora com dominância de conjugatófitas (fevereiro/2019), padrão que é esperado em sistemas lóticos com acentuada instabilidade hidrodinâmica.

Na décima quarta campanha, foco do presente relatório, os grupos de maior abundância foram Cryptophyceae, na maioria dos pontos do rio Jaguari e no córrego Entre-Montes, e de Mediophyceae no afluente represado do rio Jaguari.

Dentre os pontos monitorados, sistematicamente as maiores densidades do fitoplâncton foram verificadas no afluente represado da margem esquerda do rio Jaguari, na maioria das coletas, cuja dinâmica lêntica tende a favorecer o crescimento do fitoplâncton, sendo o resultado mais elevado obtido na décima primeira campanha (outubro/2021), com 53.884 org./mL.

No rio Jaguari prevaleceram na maioria das campanhas reduzidas densidades (<1.000 org./mL), o que é comum em sistemas lóticos de acentuada correnteza e com baixo grau de trofia, exceto na décima primeira coleta, onde se observou um pico de densidade no ponto P05, a jusante do córrego Entre-Montes (58.806 org./mL).

A contagem de células de cianobactérias identificou conformidade com o critério estabelecido pela Resolução Conama 357/05 para águas doces classe 2 em todo período amostral, sendo a maior densidade registrada na décima primeira campanha, realizada em outubro de 2021, com um pico de 24.819 cél./mL no ponto P05.

Refletindo os distintos padrões de composição do fitoplâncton, o índice de diversidade variou entre os pontos e as campanhas de amostragem, oscilando de 0,21 bits.ind⁻¹ no ponto P01 na sexta campanha (fevereiro/2020) a 3,84 bits.ind⁻¹ também no P01, na oitava campanha (outubro/2020). Apesar da diminuição da riqueza ao longo do tempo de monitoramento, a mesma tendência não foi observada para a diversidade.

A síntese dos principais indicadores utilizados na avaliação do fitoplâncton durante as campanhas desenvolvidas no âmbito do Programa de Monitoramento da Biota Aquática na área da Barragem Pedreira consta no **Quadro 4.2-3**.

De forma geral, os resultados obtidos não evidenciam interferências relevantes nesta comunidade que possam ser associadas diretamente à instalação do empreendimento, uma vez que, na maioria das campanhas, os pontos sob maior influência das obras (P02 e P03) os resultados apresentaram amplitudes de variação em seus parâmetros descritores relativamente semelhantes em termos de riqueza, densidade e diversidade fitoplanctônicas quando comparados ao ponto P01, a montante das obras.

Quadro 4.2-3. Síntese dos Indicadores do Fitoplâncton – Barragem Pedreira – 1 a 14^oC (Maio-Junho/18 a Outubro/22).

Indicadores	Períodos	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
Riqueza Específica (nº de táxons)									
C1	maio/jun/18	33	36	37	49	37	41	49	122
C2	out/18	18	22	21	29	18	15	38	73
C3	fev/19	51	52	58	73	43	48	38	113
C4	jun/19	33	28	32	30	30	32	NA	69
C5	out/19	49	48	47	42	50	50	42	101
C6	fev/20	46	48	47	44	45	56	NA	83
C7	jun/20	32	36	35	38	30	28	32	70
C8	out/20	42	40	37	54	34	22	38	75
C9	fev/21	24	26	17	25	23	38	31	69
C10	jun/21	22	29	28	25	24	18	44	71
C11	out/21	31	39	24	30	34	24	35	63
C12	mar/22	37	30	34	35	34	22	40	66
C13	jun/22	36	29	35	28	24	27	25	60
C14	out/22	17	32	19	23	22	35	20	62
Densidade (org./mL)									
C1	maio/jun/18	5	19	17	13	7	2.646	1.145	NA
C2	out/18	4	2	5	9	3	2	2.212	
C3	fev/19	42	65	59	45	418	728	13.180	
C4	jun/19	7	13	7	12	7	32	NA	
C5	out/19	513	562	945	539	629	843	6.510	
C6	fev/20	285	236	315	255	253	436	NA	
C7	jun/20	3	15	5	7	5	3	2.899	
C8	out/20	16	22	18	53	8	10	1.552	
C9	fev/21	9	6	9	6	6	32	5.709	
C10	jun/21	10	6	8	10	7	9	4.776	
C11	out/21	676	58.806	804	958	428	718	53.884	

Indicadores	Períodos	Rio Jaguari					Córrego Entre- Montes	Afluente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
C12	mar/22	8	19	7	13	14	24	2.375	
C13	jun/22	17	10	13	8	8	27	2.735	
C14	out/22	12	15	18	23	6	21	6.498	
Células de Cianobactéria (cél./mL)									
C1	maio/jun/18	2	-	5	-	5	-	-	NA
C2	out/18	-	-	-	-	-	-	-	
C3	fev/19	24	147	32	294	42	388	2.996	
C4	jun/19	7	-	-	-	52	6	NA	
C5	out/19	22	54	51	115	58	86	994	
C6	fev/20	-	-	-	40	93	195	NA	
C7	jun/20	-	-	-	-	-	4	572	
C8	out/20	-	6	4	14	17	4	1193	
C9	fev/21	-	-	-	-	-	-	-	
C10	jun/21	-	-	8	-	-	-	-	
C11	out/21	105	24.819	-	525	-	-	2.474	
C12	mar/22	7	-	-	15	-	-	2.894	
C13	jun/22	-	-	-	2	-	-	337	
C14	out/22	-	5	-	10	-	-	-	
Índice de Diversidade (bits.ind⁻¹)									
C1	maio/jun/18	1,92	1,02	1,61	2,2	1,84	0,52	2,23	NA
C2	out/18	1,92	0,92	1,92	2,32	2	1,59	1,77	
C3	fev/19	1,75	2,83	3,12	2,61	2,2	3,15	1,27	
C4	jun/19	1,56	2,19	2,24	1,9	1,66	3,08	NA	
C5	out/19	2,23	1,93	2,89	1,93	1,75	3,13	2,69	
C6	fev/20	0,21	0,58	0,93	1,05	1,17	2,43	NA	
C7	jun/20	0,76	1,12	1,03	0,96	0,86	0,95	0,69	
C8	out/20	3,84	3,65	3,66	3,68	3,46	3,2	2,5	
C9	fev/21	1,28	2,64	1,67	2,16	1,55	2,95	2,66	
C10	jun/21	3,578	3,459	3,393	3,625	2,5	3,078	2,546	
C11	out/21	1,62	1,87	1,08	0,99	1,05	0,96	1,58	
C12	mar/22	2,835	2,696	3,75	3,278	3,432	2,357	2,697	
C13	jun/22	2,143	2,597	2,409	2,835	2,404	2,639	1,695	
C14	out/22	1,557	2,249	2,525	1,797	3,022	2,145	1,572	

Nota (-) não identificado na amostra ou verificado com resultado inferior ao limite e quantificação do método analítico. NA = não se aplica ou não avaliado (P07 - não foi amostrado na quarta e sexta campanhas, pois não houve permissão de acesso para a equipe na respectiva propriedade).

4.3. Zooplâncton

- **Análise Qualitativa**

- **Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa**

Na décima quarta campanha de monitoramento foram inventariados 38 táxons do zooplâncton, pertencentes aos seguintes grupos taxonômicos: filo Rotifera (44 táxons), filo Arthropoda - subfilo Crustacea – classe Branchiopoda – subordem Cladocera (5 táxons), classe Maxillopoda - subclasse Copepoda – ordem Calanoida (3 táxons) - ordem Cyclopoida (3 táxons) - ordem Harpacticoida (2 táxons), classe Ostracoda (1 táxon), filo Protozoa (7 táxons), filo Rotifera – ordem Ploima (12 táxons), além dos filios Chordata, Cnidaria, Mollusca, Nematoda e Tardigrada (1 táxon, cada).

A comunidade zooplanctônica dos pontos monitorados foi predominantemente composta por rotíferos, com 31,6% do total de táxons, seguido por protozoários com 18,4% e crustáceos cladóceros com 13,2%, conforme ilustrado no **Gráfico 4.3-1**, no qual constam os percentuais de riqueza relativa dos grupos amostrados.




Gráfico 4.3-1. Riqueza Relativa do Zooplâncton por Classe Taxonômica – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

O zooplâncton de rios é caracteristicamente menos diverso e abundante em relação aos ambientes lênticos (reservatórios e lagos), sendo composto principalmente por formas pequenas como protistas, rotíferos, cladóceros e formas juvenis de copépodes (WETZEL, 2001).

Na literatura, constam várias pesquisas desenvolvidas na América do Sul que apontam os rotíferos como o grupo de maior riqueza específica do zooplâncton (ROBERTSON & HARDY, 1984; VÁSQUEZ & REY, 1989; PAGGI & JOSÉ DE PAGGI, 1990; LANSAC-TÔHA *et al.*, 1997).

Os rotíferos (filo Rotifera) possuem hábito filtrador, alimentando-se de bactérias, de pequenas algas e de matéria orgânica particulada. Apresentam um ciclo de vida curto, resultando em uma taxa de renovação populacional elevada, o que representa uma vantagem competitiva frente a condições de instabilidade do meio aquático, pois a comunidade se adapta mais rapidamente às mudanças no regime hídrico e às alterações na qualidade da água.

Do conjunto de rotíferos registrados na malha amostral, na décima quarta campanha, a totalidade dos táxons é componente da ordem Ploima (classe Monogonta), que envolve cerca de 90% das espécies de Rotifera conhecidas, compreendendo exemplares de hábitos livre-natantes ou sésseis.

Os Monogonta foram representados por cinco famílias, na campanha em foco, dentre as quais Brachionidae e Lecanidae se sobressaíram pela maior riqueza, com quatro e cinco táxons, respectivamente.

A família Brachionidae, caracterizada pelo hábito planctônico, é considerada uma das mais importantes do zooplâncton, possuindo representantes comumente encontrados em águas enriquecidas por nutrientes (LOUREIRO, 2011). Nesta campanha, foram inventariados integrantes dos gêneros *Brachionus*, *Keratella*, *Plationus* e *Platyias*, os quais compõem uma associação zooplanctônica tipicamente tropical (GANNON & STEMBERGER 1978; LOUREIRO *et al.* 2011). Lecanidae, representada na rede de amostragem pelo gênero *Lecane*, é comum em ambientes aquáticos continentais rasos, alcançando sua maior diversidade nas zonas litorâneas dos corpos d'água, principalmente em locais ricos em vegetação (SEGERS, 1995).

Os protozoários foram o segundo grupo mais expressivos em relação ao número de táxons durante a presente campanha. Os protozoários planctônicos apresentam regime alimentar diversificado e são conhecidos como bacterívoros, podendo também ser detritívoros, herbívoros e carnívoros (ESTEVES, 2011).

Os exemplares amostrados são em totalidade integrantes da ordem Arcellinida e pertencentes à quatro famílias, Arcellidae, Centropyxidae, Diffugiidae e Lesquereusiidae. Esta ordem é comumente encontrada em solos e em ambientes dulcícolas (GOMAA, *et al.*, 2012), sendo consideradas como bons bioindicadores de qualidade do ambiente (WALL *et al.*, 2010). Os exemplares compreendem amebas com citoplasma fechado em uma teca e associadas preferencialmente à vegetação litorânea e ao sedimento, podendo ocorrer também no plâncton (TORRES, 1998; SCHWIND *et al.*, 2013).

Tiveram participação na riqueza do rio Jaguari e afluentes os protozoários dos gêneros *Arcella*, *Centropyxis*, *Diffugia* e *Lesquereusia*. Em geral, *Arcella*, *Centropyxis* e *Diffugia* estão entre os protozoários de maior ocorrência nos ambientes aquáticos continentais (LANSAC-TÔHA *et al.*, 2000). Um levantamento realizado dos protozoários no estado de São Paulo, abrangendo 75 cursos d'água, apontou a presença de espécies destes gêneros em vários reservatórios (REGALI-SELEGHIM, *et al.*, 2011), indicando como um padrão comum o resultado obtido na malha amostral deste monitoramento. Espécies destes gêneros também tiveram ocorrência nas campanhas anteriores deste programa.

Os cladóceros, integrantes do subfilo Crustacea, estão no terceiro grupo com maior número de táxons na décima quarta campanha, reúnem seres de formas e tamanhos muito variados (0,2 a 3,0 mm). A filtração de partículas é a forma principal de alimentação, sendo que somente algumas espécies são consideradas predadoras. Segundo Pennak (1978), os cladóceros tendem a ocorrer em sistemas aquáticos oligotróficos, onde o fitoplâncton é composto por partículas de menor tamanho, adequadas para filtração, e em ambientes nos quais praticamente não há variações bruscas de oxigênio, que são mais bem toleradas por copépodes e rotíferos.

Os cladóceros verificados na malha amostral são integrantes das famílias Bosminidae, Chydoridae, Daphniidae, Ilyocryptidae, Macrothricidae e Sididae, das quais Chydoridae foi a de maior riqueza, com seis táxons, enquanto as demais reuniram apenas um táxon.

Ainda como integrantes do subfilo Crustacea verificou-se a presença de copépodes das ordens Calanoida, Cyclopoida e Harpacticoida, totalizando 21,1% da riqueza, e de um táxon não identificado da classe Ostracoda (2,6%).

Os microcrustáceos das ordens Calanoida e Cyclopoida foram responsáveis por 7,9%, cada, reunindo principalmente as formas juvenis de náuplios e copepoditos. Os calanóides possuem hábito filtrador e contribuem com maior biomassa no meio aquático, servindo de alimento para níveis superiores da cadeia trófica, como alevinos e peixes planctófagos. Os ciclopoídes, quando adultos, geralmente são predadores, de hábitos raptorais, capturando

presas como microcrustáceos, larvas de dípteros, nematódeos e oligoquetos. Algumas espécies suportam déficits de oxigênio e maior grau de trofia (TUNDISI *et al.*, 1988).

Os Harpacticoida, que representaram 5,3% dos táxons, apresentam hábito bentônico e constituem um grupo considerado sensível à poluição dos ecossistemas aquáticos (MUROLO, 2005).

Os demais táxons registrados na presente campanha, que são integrantes dos filos Vertebrata, Cnidaria, Mollusca, Nematoda e Tardigrada, representaram apenas 2,6% da riqueza, cada.

Em termos espaciais, no rio Jaguari, a riqueza do zooplâncton oscilou de seis táxons, no trecho a jusante do córrego Entre-Montes (P05), a 13 táxons, no ponto P01, localizado a montante do futuro reservatório. A riqueza no ponto P02, que se situa junto à barragem e onde se encontra o principal canteiro de obras, foi de 10 táxons.

No córrego Entre-Montes, foi registrada a maior riqueza de espécies (20 táxons). No afluente represado do rio Jaguari (P07), a riqueza se manteve próxima ao córrego Entre-Montes (18 táxons).

O predomínio de rotíferos e de protozoários em relação aos demais grupos, observado nesta campanha nos pontos do rio Jaguari, bem como nos afluentes, é um padrão recorrente na maioria dos ecossistemas aquáticos continentais, inclusive já tendo se repetido em amostragens pretéritas deste programa.




Gráfico 4.3-2. Riqueza do Zooplâncton por Ponto de Amostragem – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

– Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência

O **Quadro 4.3-1** apresenta a distribuição espacial e a frequência de ocorrência do zooplâncton na campanha de outubro de 2022.

Do conjunto de 38 táxons inventariados, apenas o protozoário *Arcella* sp1 foi registrado em 100% das amostras, sendo considerado muito frequente. Adicionalmente, recebeu essa mesma classificação o protozoário *Centropyxis* cf. *aculeata*, estando presentes em 86% dos locais monitorados.

Os protozoários *Centropyxis* são de comum ocorrência no plâncton e, geralmente, associados às macrófitas aquáticas ou ambientes com elevada taxa de matéria orgânica. (SILVA *et al.*, 2020). Esse gênero, juntamente com *Arcella*, está entre os protozoários de maior ocorrência em rios, reservatórios e lagos tropicais, conforme citado anteriormente.

Na campanha em foco, cinco táxons foram considerados frequentes ($50\% \leq$ frequência $< 80\%$); 15 táxons foram categorizados como pouco frequentes ($17\% \leq$ frequência $< 50\%$) e a maioria (16 táxons) como esporádico ($< 17\%$).

Assim como observado para o fitoplâncton, notam-se semelhanças entre os táxons que ocorrem no ambiente lântico amostrado (P07) em relação aos demais pontos lóticos. Dos 18 táxons amostrados no local, verificou-se que apenas quatro foram exclusivos deste

ambiente: os cladóceros *Bosmina* sp., *Ceriodaphnia silvestrii* e *Simocephalus* sp., além do rotífero *Lecane cornuta*.

Cabe apontar que, dentre os táxons zooplancctônicos inventariados na décima quarta campanha, não foram registradas espécies exóticas, tendo como base o Informe sobre Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais no Brasil (MMA, 2016).

Nenhum dos exemplares registrados dessa comunidade consta na lista das espécies ameaçadas a nível federal, segundo a Portaria do Ministério do Meio Ambiente - MMA nº 445/14. Nas fotos a seguir são ilustrados táxons zooplancctônicos que foram registrados na malha amostral nesta última campanha (outubro/2022).



**Foto 4.3-1. Protozoário
Centropyxis aculeata.**



Foto 4.3-2. Rotífero *Lecane bulla*.



**Foto 4.3-3. Náuplio de
Cyclopoida.**

Fonte: Banco de dados da Econsult (2021 e 2022).

Nota: a cor avermelhada dos exemplares ilustrados se deve ao processo de coloração da amostra.

Quadro 4.3-1. Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
Filo ARTHROPODA									
Subfilo CRUSTACEA									
Classe Branchiopoda									
Subclasse Phyllopoda									
Ordem Diplostraca									
Subordem Cladocera									
Infraordem Anomopoda									
<u>Família Bosminidae</u>									
<i>Bosmina</i> sp. 01								1	14,29%
<u>Família Chydoridae</u>									
Chydoridae N.I.								2	28,57%
<u>Família Daphniidae</u>									
<i>Ceriodaphnia silvestrii</i>								1	14,29%
<i>Simocephalus</i> sp. 01								1	14,29%
<u>Família Macrothricidae</u>									
<i>Macrothrix</i> sp. 01								2	28,57%
Subtotal	-	-	2	-	-	-	5		
Classe Maxillopoda									
Subclasse Copepoda									
Ordem Calanoida									
Calanoida N.I.								2	28,57%
Náuplios								3	42,86%
Copepodito								2	28,57%
Subtotal	1	-	-	-	-	3	3		
Ordem Cyclopoida									
Cyclopoida N.I.								2	28,57%
Náuplios								4	57,14%
Copepodito								4	57,14%
Subtotal	2	-	2	-	1	3	2		
Ordem Harpacticoida									
Náuplios								4	57,14%

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
Copepodito								3	42,86%
Subtotal	1	-	1	2	-	1	2		
Classe Ostracoda								3	42,86%
Subtotal	1	-	-	-	-	1	1		
Filo CHORDATA									
Subfilo VERTEBRATA									
Larva de peixe								2	28,57%
Subtotal	1	-	-	-	1	-	-		
Filo CNIDARIA									
Classe Hydrozoa								1	14,29%
Subtotal	-	-	-	-	-	1	-		
Filo MOLLUSCA									
Classe Bivalvia									
Larva								4	57,14%
Subtotal	-	1	1	1	-	1	-		
Filo NEMATODA								2	28,57%
Subtotal	-	-	-	1	-	1	-		
Filo PROTOZOA									
Subfilo SARCODINA									
Superclasse Rhizopoda									
Classe Lobosa									
Ordem Arcellinida									
<u>Família Arcellidae</u>									
<i>Arcella dentata</i>								4	57,14%
<i>Arcella vulgaris</i>								3	42,86%
<i>Arcella</i> sp. 01								7	100,00%
<u>Família Centropyxidae</u>									
<i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i>								6	85,71%
<i>Centropyxis</i> sp. 01								2	28,57%
<u>Família Diffugiidae</u>									
<i>Diffugia</i> sp. 01								2	28,57%
<u>Família Lesquereusiidae</u>									
<i>Lesquereusia</i> sp. 01								2	28,57%

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
Subtotal	2	5	3	3	4	5	4		
Filo ROTIFERA									
Classe Monogonta									
Subclasse Monogononta									
Ordem Ploima									
Família Asplanchnidae									
<i>Asplanchnopus</i> sp. 01								1	14,29%
Família Brachionidae									
<i>Brachionus forficula</i>								1	14,29%
<i>Keratella americana</i>								1	14,29%
<i>Plationus patulus</i>								1	14,29%
<i>Platyias quadricornis</i>								1	14,29%
Família Euchlanidae									
<i>Euchlanis dilatata</i>								1	14,29%
Família Lecanidae									
<i>Lecane bulla</i>								2	28,57%
<i>Lecane cornuta</i>								1	14,29%
<i>Lecane curvicornis</i>								1	14,29%
<i>Lecane prolecta</i>								1	14,29%
<i>Lecane</i> sp. 01								1	14,29%
Família Notommatidae									
<i>Cephalodella</i> sp. 01								1	14,29%
Subtotal	5	-	1	2	1	3	1		
Filo TARDIGRADA								1	14,29%
Subtotal	-	-	-	-	-	1	-		
Total	13	6	10	9	7	20	18		
Total da Campanha	38								

- **Análise Quantitativa**

- **Densidade e Abundância Relativa**

A análise quantitativa do zooplâncton é apresentada por meio dos resultados de densidade (org./m³) e de abundância relativa (%) dos grupos taxonômicos (**Quadro 4.3-2**).

Na décima quarta campanha do monitoramento (outubro/2022), a densidade do zooplâncton no rio Jaguari apresentou variação entre 155 org./m³, a jusante do córrego Entre-Montes (P05), e 1.087 org./m³, no ponto a jusante do futuro reservatório (P03). No córrego Entre-Montes (P04), essa comunidade apresentou densidade de 350 org./m³. Reproduzindo um resultado semelhante ao fitoplâncton, o afluente represado do rio Jaguari (P07), se destacou pela maior quantidade de zooplâncton, com 7.329 org./m³ (**Gráfico 4.3-3**).

No rio Jaguari, a jusante do futuro reservatório (P03), a maior densidade se deve às contribuições dos protozoários, principalmente da espécie *Centropyxis* cf. *aculeata*, com 880 org./m³. De forma geral, os representantes deste gênero apresentaram as maiores densidades dos demais pontos da malha amostral do rio Jaguari, variando entre 60 org./m³ no ponto P05 e 125 org./m³ no ponto P02. No ponto P01 os protozoários do gênero *Arcella* e os rotíferos *Lecane* sp., apresentam densidades similares (123 org./m³). A baixa densidade de organismos zooplanctônicos denota um declínio na qualidade ambiental nos pontos sob influência das atividades de implantação da Barragem Pedreira.

O predomínio de protozoários ocorre geralmente na vegetação marginal e no fundo, tanto em ambientes lóticos como lênticos. Embora se considere que grande parte da biomassa do zooplâncton seja constituída por rotíferos e crustáceos (cladóceros e copépodes), pesquisas têm evidenciado que os protozoários também podem contribuir significativamente para a biomassa como os demais componentes dessa comunidade (PEREIRA *et al.*, 2011).

No córrego Entre-Montes (P04) e na barragem particular, formada pelo afluente da margem esquerda do rio Jaguari (P07), os copépodes calanóides foram mais abundantes (105 org./m³ e 3.649 org./m³, respectivamente), principalmente pela contribuição dos náuplios.

A ocorrência das formas juvenis de microcrustáceos, sobretudo náuplios, é uma condição recorrente em ecossistemas de água doce, geralmente associada à reprodução constante desses organismos, o que constitui uma estratégia adaptativa para compensar a alta mortalidade antes de alcançarem a fase adulta (ESPÍNDOLA *et al.*, 2000).

O resultado obtido na décima quarta campanha para a maioria dos pontos lóticos do rio Jaguari é indicativo do aporte de material alóctone, o que propicia que espécies oportunistas dos protozoários utilizem rapidamente os recursos disponíveis e atinjam um aumento de densidade. Conforme já mencionado, os gêneros *Arcella*, *Centropyxis* e *Difflugia*

estão entre os protozoários de maior ocorrência nos ambientes aquáticos continentais (LANSAC-TÔHA *et al.*, 2000) e, segundo Silva *et al.* (2020), são comuns em ambientes com elevada taxa de matéria orgânica.




Gráfico 4.3-3. Densidade do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Conforme citado, os protozoários se sobressaíram em todos os pontos amostrais do rio Jaguari, com maior abundância no ponto P06 (95%). No córrego Entre-Montes e no afluente represado do rio Jaguari, os copepodes calanóides foram dominantes, representando 34,3% e 65,4%, respectivamente (**Gráfico 4.3-4**).




Gráfico 4.3-4. Abundância Relativa do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Quadro 4.3-2. Densidade e Abundância Relativa do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Composição Taxonômica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluentes do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%
Filo ARTHROPODA														
Subfilo CRUSTACEA														
Classe Branchiopoda														
Subclasse Phyllopoda														
Ordem Diplostraca														
Subordem Cladocera														
Infraordem Anomopoda														
<u>Família Bosminidae</u>														
<i>Bosmina</i> sp. 01													93	1,3%
<u>Família Chydoridae</u>														
Chydoridae N.I.					5	2,2%							309	4,2%
<u>Família Daphniidae</u>														
<i>Ceriodaphnia silvestrii</i>													557	7,6%
<i>Simocephalus</i> sp. 01													31	0,4%
<u>Família Macrothricidae</u>														
<i>Macrothrix</i> sp. 01					5	2,2%							278	3,8%
Subtotal	-	-	-	-	10	4,3%	-	-	-	-	-	-	1.268	17,3%
Classe Maxillopoda														
Subclasse Copepoda														
Ordem Calanoida														
Calanoida N.I.											-	0,0%	31	0,4%
Náuplios	-	0,0%									105	30,0%	3.649	49,8%
Copepodito											15	4,3%	1.113	15,2%
Subtotal	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	120	34,3%	4.793	65,4%
Ordem Cyclopoida														
Cyclopoida N.I.									5	2,5%	5	1,4%		
Náuplios	-	0,0%			-						10	2,9%	278	3,8%
Copepodito	-	0,0%			10	4,3%					30	8,6%	309	4,2%
Subtotal	-	0,0%	-	-	10	4,3%	-	-	5	2,5%	45	12,9%	587	8,0%
Ordem Harpacticoida														
Náuplios	-	0,0%			-		23	2,1%					31	0,4%

Composição Taxonomica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluente do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%
Copepodito							46	4,2%			5	1,4%	62	0,8%
Subtotal	-	0,0%	-	-	-	-	69	6,3%	-	-	5	1,4%	93	1,3%
Classe Ostracoda	123	25,0%									10	2,9%	62	0,8%
Subtotal	123	25,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2,9%	62	0,8%
Filo CHORDATA														
Subfilo VERTEBRATA														
Larva de peixe	-	0,0%							-	0,0%				
Subtotal	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
Filo CNIDARIA														
Classe Hydrozoa											-	0,0%		
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Filo MOLLUSCA														
Classe Bivalvia														
Larva			35	22,6%	70	30,4%	23	2,1%			15	4,3%		
Subtotal	-	-	35	22,6%	70	30,4%	23	2,1%	-	-	15	4,3%	-	-
Filo NEMATODA														
Subtotal	-	-	-	-	-	-	23	2,1%	-	-	15	4,3%	-	-
Filo PROTOZOA														
Subfilo SARCODINA														
Superclasse Rhizopoda														
Classe Lobosa														
Ordem Arcellinida														
<u>Família Arcellidae</u>														
<i>Arcella dentata</i>			5	3,2%	5	2,2%			15	7,5%	5	1,4%		
<i>Arcella vulgaris</i>			15	9,7%					70	35,0%			278	3,8%
<i>Arcella</i> sp. 01	123	25,0%	30	19,4%	5	2,2%	23	2,1%	5	2,5%	20	5,7%	62	0,8%
<u>Família Centropyxidae</u>														
<i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i>	123	25,0%	10	6,5%	125	54,3%	880	81,0%			70	20,0%	155	2,1%
<i>Centropyxis</i> sp. 01			60	38,7%					100	50,0%				
<u>Família Diffugiidae</u>														
<i>Diffugia</i> sp. 01											5	1,4%	-	0,0%
<u>Família Lesquereusiidae</u>														
<i>Lesquereusia</i> sp. 01							23	2,1%			15	4,3%		

Composição Taxonomica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluente do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%	org./m ³	%
Subtotal	246	50,0%	120	77,4%	135	58,7%	926	85,2%	190	95,0%	115	32,9%	495	6,8%
Filo ROTIFERA														
Classe Monogonta														
Subclasse Monogononta														
Ordem Ploima														
<u>Família Asplanchnidae</u>														
<i>Asplanchnopus</i> sp. 01					5	2,2%								
<u>Família Brachionidae</u>														
<i>Brachionus forficula</i>	-	0,0%												
<i>Keratella americana</i>											5	1,4%		
<i>Plationus patulus</i>	-	0,0%												
<i>Platylabus quadricornis</i>	-	0,0%												
<u>Família Euchlanidae</u>														
<i>Euchlanis dilatata</i>							23	2,1%						
<u>Família Lecanidae</u>														
<i>Lecane bulla</i>	-	0,0%							5	2,5%				
<i>Lecane cornuta</i>													31	0,4%
<i>Lecane curvicornis</i>							23	2,1%						
<i>Lecane proiecta</i>											10	2,9%		
<i>Lecane</i> sp. 01	123	25,0%												
<u>Família Notommatidae</u>														
<i>Cephalodella</i> sp. 01											5	1,4%		
Subtotal	123	25,0%	-	-	5	2,2%	46	4,2%	5	2,5%	20	5,7%	31	0,4%
Filo TARDIGRADA											5	1,4%		
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,4%	-	-
Total	492	100%	155	100%	230	100%	1.087	100%	200	100%	350	100%	7.329	100%

– Índices de Diversidade e Equitabilidade

O **Gráfico 4.3-5** apresenta os resultados dos índices de diversidade e equitabilidade da comunidade zooplancônica, registrados na décima quarta campanha de monitoramento (outubro/2022). No rio Jaguari, a diversidade do zooplâncton variou entre 0,92 bits.ind⁻¹ (P05) a 1,56 bits.ind⁻¹ (P01). Nos pontos sob maior influência das obras de implantação da barragem (P02 e P03), a diversidade esteve em torno de 1,5 bits.ind⁻¹, sendo próxima ao trecho sem influência da obra (P01). No córrego Entre-Montes (P04), a diversidade atingiu valor mais elevado que o rio Jaguari, com 1,74 bits.ind⁻¹, enquanto no afluente represado da margem esquerda (P07) a diversidade decaiu para 1,59 bits.ind⁻¹.

O maior índice de diversidade verificado no ponto P04 reflete a maior riqueza (20 táxons). De forma geral, a equitabilidade apresentou valores mais elevados nos pontos de maior influência das obras, P02 (0,51) e P03 (0,49). Em concordância aos valores de diversidade, o ponto a jusante do córrego Entre-Montes (P05) apresentou o menor valor de equitabilidade (0,18), decorrente da menor riqueza, densidade e abundância apresentada durante a campanha.




Gráfico 4.3-5. Índices de Diversidade e Equitabilidade do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

– Índice de Similaridade

A avaliação dos padrões de semelhança da comunidade zooplancônica amostrada foi realizada por meio do índice de Bray-Curtis, cujos resultados são apresentados no **Gráfico 4.3-6**.

A análise de similaridade demonstra o isolamento do ponto localizado na barragem particular (P07) devido à grande diferenciação das demais comunidades, principalmente devido à elevada densidade de organismos.

O agrupamento com maior similaridade (superiore à 45%) reuniu os pontos do rio Jaguari (P05 e P06), possivelmente correlacionado pela maior riqueza de protozoários nestes dois ambientes. Os pontos P01, P02 e P03 do rio Jaguari e o P04 localizado no córrego Entre-Montes apresentaram similaridade, porém, inferior aos demais pontos, em torno de 20% e 30%. Dentre os demias pontos do rio Jaguari, estes locais se distinguem por apresentarem valores de diversidade superiores.

Não é possível afirmar que as distinções verificadas entre os pontos amostrais no rio Jaguari se devem diretamente às obras do empreendimento, podendo ter alguma relação com as atividades do empreendimento como também com as características fisiográficas e hidrológicas de cada local.




Gráfico 4.3-6. Similaridade do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Coefficiente cofenético = 0,7391.

– **Evolução dos principais indicadores**

A avaliação temporal do zooplâncton, considerando a série de campanhas realizadas (maio/junho/2018 a outubro/2022), evidenciou maior riqueza dessa comunidade na décima primeira campanha (78 táxons), conduzida na transição do período seco para o chuvoso. Dentre os pontos da malha amostral, o P07 (afluente represado do rio Jaguari) e P01 (rio Jaguari, a montante da obra) tendem a reunir os maiores valores de riqueza da malha amostral, na maioria das campanhas, não havendo um padrão claro de qual ponto reúne a maior riqueza, com alternância entre as campanhas.

O valor mais elevado de riqueza (36 táxons) foi detectado no ponto P01, em fevereiro de 2019, enquanto o menor (2 táxons) foi registrado nos pontos P04 (córrego Entre-Montes, em junho/2022).

No rio Jaguari e contribuintes, os rotíferos, protozoários e cladóceros tendem a se destacar na riqueza, na maioria das campanhas, o que é um padrão comum em diversos cursos d'água tropicais.

A densidade do zooplâncton, nos pontos do rio Jaguari e no córrego Entre-Montes, representativos de sistema lótico, apresentou variações relevantes entre os pontos e campanhas, ocorrendo tendência de maiores densidades nos meses de fevereiro de 2019 e de outubro de 2021, na maioria dos pontos, enquanto as menores densidades estiveram relacionadas aos meses de junho de 2018, de junho de 2020, de fevereiro de 2021, março e outubro de 2022, não havendo um padrão claro de variação sazonal.

No período monitorado, a menor densidade foi de 80 org./m³, no córrego Entre-Montes, e a máxima de 1.885.569 org./m³, no afluente represado do rio Jaguari, ambos na campanha de fevereiro de 2021.

Dentre os pontos lóticos, as menores densidades estiveram associadas aos pontos P02 e P03, ambos situados no rio Jaguari, na maioria das campanhas, o que pode estar relacionado a algum efeito das obras de implantação da barragem. Contudo, cabe ponderar que o zooplâncton sofre influência de diversos fatores bióticos e abióticos do ambiente, tais como predação, presença de macrófitas, competição, temperatura, pH, qualidade e disponibilidade de nutrientes, o que também pode explicar as variações espaço-temporais verificadas neste monitoramento no decorrer das amostragens.

A densidade do zooplâncton na barragem do afluente do rio Jaguari (P07) se mostrou muito superior à verificada no rio Jaguari e no córrego Entre-Montes, em todas as campanhas em que esse ponto foi avaliado, sobretudo na nona campanha, realizada em fevereiro de

2021, o que é esperado considerando a dinâmica lântica que propicia que esse grupo apresente maiores taxas de crescimento populacional.

Além disso, sistemas aquáticos com altas densidades de fitoplâncton e elevados tempos de residência, como o afluente represado do rio Jaguari (P07), resultam em altas densidades de zooplâncton, as quais podem apresentar acentuada flutuação sazonal, sem que a diminuição na quantidade de zooplâncton seja indicativa de melhoria na qualidade do ambiente.

Em termos de diversidade, houve uma tendência de aumento deste indicador em fevereiro de 2019 (Campanha 3) em relação às demais campanhas, pois seus valores se mantiveram superiores a 3 bits.ind⁻¹, na maioria dos pontos, enquanto nas demais campanhas este índice se manteve em torno de 2 bits.ind⁻¹, com exceção da campanha 7 (junho/20). Nesta campanha, realizada em junho de 2020, foram reportados os valores mais baixos de todo o monitoramento, não alcançando 1,0 bits.ind⁻¹ em nenhum dos pontos amostrais. Na campanha em foco (outubro/2022), este indicador voltou a apresentar valores menores, próximos a 1,5 bits.ind⁻¹ na maioria dos pontos.

Não há um padrão claro de um ponto específico que reúna maior diversidade zooplanctônica, na maioria das campanhas, ocorrendo alternância dos locais mais diversos ao longo do tempo.

A síntese dos principais indicadores utilizados na avaliação do zooplâncton durante as campanhas desenvolvidas no âmbito do Programa de Monitoramento da Biota Aquática da Barragem Pedreira consta no **Quadro 4.2-3**. De forma geral, os resultados obtidos não evidenciam interferências relevantes nesta comunidade que possam ser associadas diretamente à instalação do empreendimento, uma vez que todos os pontos de amostragem do rio Jaguari, inclusive a montante do empreendimento, apresentaram variações acentuadas em termos de riqueza, densidade e diversidade zooplanctônicas ao longo das coletas.

**Quadro 4.2-3. Síntese dos Indicadores do Zooplâncton – Barragem Pedreira – 1 a 14°C
(Junho/18 a Outubro/22).**

Indicadores	Períodos	Rio Jaguari					Córrego Entre- Montes	Aflente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
Riqueza Específica (nº de táxons)									
C1	jun/18	24	18	18	14	17	19	26	57
C2	out/18	20	24	20	24	26	23	18	52
C3	fev/19	36	30	33	33	28	27	21	71
C4	jun/19	22	22	17	17	18	11	NA	38
C5	out/19	16	21	26	21	22	15	18	54
C6	fev/20	20	12	9	18	14	17	NA	34
C7	jun/20	21	14	18	20	20	20	30	58
C8	out/20	19	17	18	14	20	19	19	45
C9	fev/21	21	12	16	15	12	10	25	47
C10	jun/21	12	10	18	13	14	9	21	39
C11	out/21	29	25	21	20	25	30	23	78
C12	mar/22	14	8	8	5	5	5	24	37
C13	jun/22	14	12	14	10	15	2	10	32
C14	out/22	13	6	10	9	7	20	18	38
Densidade (org./m³)									
C1	jun/18	720	495	570	290	3.345	3.065	127.627	NA
C2	out/18	74.875	6.918	4.850	2.326	6.627	17.470	931.845	
C3	fev/19	23.661	17.864	4.656	4.412	9.676	20.639	383.356	
C4	jun/19	3.344	1.918	9.868	2.324	6.149	30.784	NA	
C5	out/19	2.832	8.867	976	2.172	1.936	27.180	100.605	
C6	fev/20	2.569	1.301	822	1.593	8.969	7.001	NA	
C7	jun/20	374	178	145	285	660	6.595	124.701	
C8	out/20	485	505	365	2820	925	525	220.830	
C9	fev/21	335	210	215	175	443	80	1.885.569	
C10	jun/21	1.247	899	475	1.211	675	1.291	538.662	
C11	out/21	9.327	7.906	2.521	245	8.832	4.929	265.148	
C12	mar/22	625	623	205	609	696	195	4.607	
C13	jun/22	1.228	369	1.363	751	1.529	1.614	92.106	
C14	out/22	492	155	2.320	1.087	200	350	7.329	
Índice de Diversidade (bits.ind⁻¹)									
C1	jun/18	3,21	2,06	2,6	2	2,03	2,37	2,35	NA
C2	out/18	1	2,48	2,55	2,29	2,79	2,24	1,79	
C3	fev/19	2,73	2,97	3,79	4,07	3,62	3,2	3,26	
C4	jun/19	2,56	2,7	2,94	2,67	3,29	1,84	NA	
C5	out/19	1,67	1,99	2,8	3,34	3,12	2,27	2,866	
C6	fev/20	3,37	1,92	1,44	2,67	2,9	3,1	NA	
C7	jun/20	0,86	0,28	0,68	0,92	0,87	0,47	0,96	
C8	out/20	2,97	2,65	2,8	1,06	2,18	3,72	1,86	
C9	fev/21	3,15	2,33	2,17	3,45	2,88	2,65	2,45	
C10	jun/21	2,38	2,56	2,74	3,08	2,92	1,96	2,93	
C11	out/21	1,38	3,1	3,33	2,8	3,59	3,72	2,51	
C12	mar/22	1,417	1,49	1,683	1,324	1,506	1,3	3,201	
C13	jun/22	2,476	2,457	2,439	2,016	2,738	NA	0,694	
C14	out/22	1,559	0,9184	1,541	1,455	1,27	1,743	1,592	

4.4. Invertebrados Bentônicos

- Análise Qualitativa

- **Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa**

Na campanha realizada em outubro de 2022, na transição do período seco para o chuvoso, foi registrado um total de 41 táxons de invertebrados bentônicos, pertencentes aos seguintes grupos taxonômicos: filo Annelida – subclasse Hirudinea (1 táxon), subclasse Oligochaeta (3 táxons); filo Arthropoda – subfilo Chelicerata – subclasse Acari (1 táxon), subfilo Crustacea – classe Ostracoda (1 táxon), subfilo Hexapoda – classe Insecta (29 táxons); filo Mollusca – classe Bivalvia (1 táxon), classe Gastropoda (3 táxons); filo Nematoda (1 táxon); e filo Platyhelminthes (1 táxon).

Reproduzindo um padrão observado nos sistemas aquáticos tropicais, os principais representantes dos invertebrados bentônicos foram os insetos (classe Insecta), que reuniram 70,7% do total de táxons inventariados, seguidos dos moluscos (filo Mollusca) e anelídeos (filo Annelida), com 9,8%, cada (**Gráfico 4.4-1**).




Gráfico 4.4-1. Riqueza Relativa de Invertebrados Bentônicos por Grupo Taxonômico – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

No rio Jaguari, córrego Entre-Montes e na barragem particular, os insetos foram representados principalmente pela ordem Diptera (díptera), com 24 táxons. Esse número mais alto de táxons em relação aos demais é justificado em parte pelo nível de resolução

taxonômica utilizada para esse grupo, no qual os organismos da família Chironomidae, quando possível, foram identificados até nível de gênero. Conhecidos popularmente como moscas, mosquitos e pernilongos, os dípteros destacam-se por representarem parte numericamente significativa da fauna bentônica de ambientes aquáticos lênticos e lóticos e por serem utilizados como indicadores de qualidade ambiental.

Os adultos dessa ordem depositam ovos na superfície das águas ou sobre substratos e dão origem a um número elevado de larvas que, em geral, colonizam sedimentos arenosos e lodosos, além da vegetação aquática. Esses organismos passam parte da vida ou seu ciclo completo associado ao substrato de fundo, sendo que para alguns deles a fase larvária é muito mais longa que a adulta.

Na atual campanha (outubro/2022), a ordem Diptera foi representada principalmente por táxons da família Chironomidae, além das famílias Ceratopogonidae e Tipulidae.

As larvas da família Chironomidae (quironomídeos) são, em geral, onívoras oportunistas, alimentam-se de algas, de pequenos animais e de detritos, exercendo importante papel na decomposição da matéria orgânica. Algumas delas possuem órgãos especiais, como brânquias externas, e conseguem sobreviver em águas poluídas e em ambientes com baixas concentrações de oxigênio dissolvido (ROSSARO, 1991 *apud* OLIVEIRA, 2005).

De acordo com Coffman e Ferrington (1996), a família Chironomidae é o grupo de maior riqueza taxonômica, sendo os insetos aquáticos mais amplamente distribuídos e frequentemente os mais abundantes nos ecossistemas de águas continentais.

Os táxons de Chironomidae inventariados na décima quarta campanha (outubro/2022) são integrantes das subfamílias Chironominae (tribos Chironomini e Tanytarsini), Orthoclaadiinae (tribos Corynoneurini e Orthoclaadiini) e Tanypodinae (tribos Pentaneurini e Tanypodini). Essas subfamílias, em geral, são semi-tolerantes às alterações ambientais, porém, destaca-se entre esses o gênero *Chironomus* (tribo Chironomini), que é classificado como tolerante (CETESB, 2019), o qual foi registrado nos pontos P02, P03 P05 e P07.

Ainda no grupo dos insetos, verificou-se nos ambientes monitorados reduzida riqueza de Odonata, Ephemeroptera e de Trichoptera, sendo que os dois últimos, em conjunto, compõe o indicador EPT, que associa a presença de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) aos ambientes com melhor qualidade ambiental.

A ordem Odonata, comumente conhecida como libélulas, é dividida em três subordens, sendo que apenas Anisoptera e Zygoptera ocorrem no Brasil, apresentando conjuntamente

aproximadamente sete mil espécies (MIGUEL *et al.*, 2017). Na presente campanha foram amostrados dois táxons da subordem Anisoptera.

As larvas da ordem Ephemeroptera vivem geralmente em ambientes rasos com águas limpas e bem oxigenadas, sendo, em função de sua sensibilidade à poluição ambiental, utilizadas em programas de biomonitoramento de qualidade da água (ROLDÁN-PÉREZ, 2003).

As larvas de Trichoptera possuem garras anais, que são usadas para se fixar ao substrato e que lhes permite ampla distribuição em distintos micro-habitats. Muitas espécies têm o corpo protegido por um abrigo constituído por grãos de areia ou outros materiais retirados do meio onde habitam. Assim como os efemerópteros, as larvas de tricópteros refletem boa qualidade do sistema aquático, sendo encontradas frequentemente em águas correntes, frias e com alto teor de oxigênio dissolvido (ROLDÁN-PÉREZ, 2003).

O segundo grupo mais diverso no rio Jaguari e afluente foram os anelídeos e os moluscos, responsáveis por 9,8%, cada, dentre os táxons inventariados.

Os anelídeos foram representados por exemplares da classe Clitellata, apresentando um táxon na subclasse Hirudinea e três, Oligochaeta.

Na rede de amostragem, os oligoquetos obtidos são organismos pertencentes à famílias Naididae, abrangendo a subfamília Naidinae e Tubificinae, representada por táxons com queta capilar e sem queta capilar.

Os oligoquetos são um dos mais abundantes organismos na comunidade aquática continental, sendo encontrados em sedimento, na coluna d'água e associados a outros organismos (GORNI & ALVEZ, 2007). Este grupo pode ser utilizado como indicadores de poluição no meio aquático, pois são comumente encontrados em ambientes ricos em matéria orgânica e com baixas concentrações de oxigênio dissolvido, caracterizando uma vantagem competitiva sobre outras espécies da comunidade (DORNFELD *et al.*, 2006; GORNI & ALVEZ, 2015).

Os hirudíneos (subclasse Hirudinea) foram representados pela família Glossiphoniidae. No geral, esses organismos são comuns em águas paradas ou corpos hídricos de correnteza fraca, vivendo preferencialmente nas margens, aderidos aos substratos (troncos, pedras, e outros). Assim como os oligoquetas, os anelídeos Hirudinea suportam condições de baixa concentração de oxigênio, podendo habitar locais com altos teores de matéria orgânica (ROLDÁN, 1992 *apud* PARESCHI, 2008).

Dentre os moluscos, foram amostradas as classes Bivalvia (bivalves) e Gastropoda (gastrópodes). Esse grupo exerce importante papel nas cadeias tróficas, pois, em geral,

possui uma variedade de hábitos em seu ciclo de vida, sendo consumidores primários e servindo de alimento a muitos outros grupos de animais, principalmente peixes, aves e mamíferos.

Os bivalves foram representados na rede amostral por um táxon da família Corbiculidae, a espécie *Corbicula fluminea*. Entre os gastrópodes, registrou-se táxons das famílias Thiaridae, Physidae e Planorbidae.

Entre os grupos de invertebrados bentônicos com elevado potencial de invasão, os moluscos se destacam em ambientes de águas doces, destacando-se na malha amostral *Corbicula* sp., uma vez que esse gênero integra a espécie *Corbicula fluminea*, considerada exótica e invasora, a qual já foi reportada em amostragens anteriores deste programa de monitoramento, conforme detalhado no item de distribuição espacial.

Na rede de amostragem, os artrópodes crustáceos da classe Ostracoda, os aracnídeos da subclasse Acari e os filos Nematoda e Platyhelminthes foram menos representativos em termos de riqueza, contribuindo com um táxon cada (2,4%). Apesar de representarem uma menor proporção da riqueza, esses exemplares contribuem com a diversidade do ambiente monitorado, sobretudo em termos funcionais, ao ocuparem diferentes níveis da teia trófica.

Os valores de riqueza específica da comunidade bentônica no rio Jaguari variaram de um mínimo de 6 táxons (P06) a 18 táxons (P05). A riqueza dos pontos P02 e P03, que constituem os pontos mais próximos às atividades das obras, com 16 e 17 táxons, se manteve na mesma magnitude do ponto a montante da obra (P01), com 15 táxons.

No córrego Entre-Montes (P04), foi observada riqueza inferior ao rio Jaguari, com 7 táxons, enquanto que na barragem particular (P07) foram computados 23 táxons, representando a maior riqueza da campanha. Na totalidade dos pontos da rede de amostragem, os insetos corresponderam ao grupo mais diverso na comunidade bentônica, conforme ilustra o **Gráfico 4.4-2**.




Gráfico 4.4-2. Riqueza dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

– Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência

O **Quadro 4.4-1** apresenta a distribuição espacial e a frequência de ocorrência dos invertebrados bentônicos inventariados na décima quarta campanha (outubro/2022). Dos táxons registrados, nenhum exemplar ocorreu em todos os locais amostrados. Os táxons considerados muito frequentes (86%) foram os anelídeos da família Glossiphoniidae e os oligoquetos da família Naididae (com e sem queta capilar), além dos dípteros não identificados da família Chironomidae e os dípteros *Polypedilum* sp. (tribo Chironomini).

Os oligoquetos são espécies chave em ambientes aquáticos, tendo grande número de espécies cosmopolitas e são bons indicadores de toxicidade no ambiente (CHAPMAN, 2001), bioacumulando toxinas (SMITH *et al.*, 1991).

A família Chironomidae é um importante grupo de microinvertebrados devido à abundância, alta diversidade e presença na maioria dos ecossistemas aquáticos (EPLER, 1992). A tribo Chironomini é uma das mais diversas da família Chironomidae e suas larvas podem explorar os diferentes biótopos dos sistemas lóticos e lênticos. Esse grupo de dípteros é considerado semi-tolerante à poluição (CETESB, 2019), possuindo importância em monitoramentos ambientais. Da mesma forma, a tribo Tanytarsini pode ser considerada semi-tolerante, conforme citado.

Foram classificados como frequentes ($50\% \leq$ frequência $< 80\%$) os dípteros não identificados da tribo Tanytarsini, além dos exemplares de *Chironomus* sp., *Nanocladius* sp., *Ablabesmyia* sp. e *Labrundinia* sp.

Outros 14 táxons de invertebrados bentônicos foram considerados pouco frequentes, ($17\% \leq$ frequência $< 50\%$) e os demais 17 táxons foram de ocorrência esporádica ($< 17\%$).

Nos ambientes monitorados, a maioria dos táxons registrados no ambiente lótico foi verificado também no ponto de sistema lêntico (P07). Dentre os 23 táxons registrados neste ponto, sete tiveram registro exclusivo neste local.

Em relação aos moluscos, conforme já citado anteriormente, foi registrado a espécie invasora *Corbicula fluminea*, nos pontos P02, P03 e P05 do rio Jaguari, padrão previamente verificado em campanhas anteriores. Além disso, nesta campanha e em anteriores, foi reportada o molusco *Melanoides tuberculatus*, capturado no rio Jaguari (P05) e em seu afluente (P07), o qual também é exótico invasor, mostrando que os ambientes monitorados nestes ambientes abrigam exemplares exóticos.

Os gêneros identificados na décima quarta campanha não possuem espécies nas listas das espécies ameaçadas a nível estadual e federal, segundo o Decreto Estadual nº 63.853/18 e a Portaria do Ministério do Meio Ambiente - MMA nº 445 de 17/12/2014. No entanto, a identificação deste organismo a nível específico não foi alcançada, o que não permite constatar a ocorrência de espécie ameaçada no sistema monitorado.

No registro fotográfico a seguir (**Fotos 4.4-1 e 4.4-3**) são ilustrados alguns dos exemplares da comunidade bentônica com ocorrência registrada no rio Jaguari e afluente, na décima quarta campanha.



Foto 4.4-1. Oligoqueta da família Tubificidae.



Foto 4.4-2. Família Chironomidae



Foto 4.4-3. Díptero da família Ceratopogonidae.

Fonte: Banco de dados da Econsult (2021). Nota: A tonalidade avermelhada se deve ao uso de corantes usados no processo de análise.

Quadro 4.4-1. Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes P04	Afluente do Rio Jaguari P07	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06				
Filo ANNELIDA									
Classe Clitellata									
Subclasse Hirudinea									
Ordem Rhynchobdellida									
Família Glossiphoniidae								6	85,7
Subclasse Oligochaeta									
Ordem Tubificida									
Família Naididae									
Subfamília Naidinae								2	28,6
Subfamília Tubificinae									
Tubificinae com queta capilar								6	85,7
Tubificinae sem queta capilar								6	85,7
Subtotal	3	1	2	4	4	3	3		
Filo ARTHROPODA									
Subfilo CHELICERATA									
Classe Arachnida									
Subclasse Acari								1	14,3
Subtotal	1	-	-	-	-	-	-		
Subfilo CRUSTACEA									
Classe Ostracoda								2	28,6
Subtotal	-	-	-	1	-	1	-		
Subfilo HEXAPODA									
Classe Insecta									
Ordem Diptera									
Subordem Nematocera									
Família Ceratopogonidae								3	42,9
Família Chironomidae									
Chironomidae N.I.								6	85,7
Subfamília Chironominae									
Tribo Chironomini									
<i>Asheum</i> sp.								1	14,3

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
<i>Chironomus</i> sp.								4	57,1
<i>Cladopelma</i> sp.								1	14,3
<i>Cryptochironomus</i> sp.								2	28,6
<i>Dicrotendipes</i> sp.								1	14,3
<i>Endotribelos</i> sp.								3	42,9
<i>Fissimentum</i> sp.								1	14,3
<i>Goeldichironomus</i> sp.								1	14,3
<i>Polypedilum</i> sp.								6	85,7
<i>Stenochironomus</i> sp.								1	14,3
<u>Tribo Tanytarsini</u>									
Tanytarsini N.I.								4	57,1
<i>Caladomyia</i> sp.								2	28,6
<u>Subfamília Orthocladiinae</u>									
<u>Tribo Corynoneurini</u>									
<i>Corynoneura</i> sp.								2	28,6
<u>Tribo Orthocladiini</u>									
<i>Cricotopus</i> sp.								2	28,6
<i>Nanocladius</i> sp.								4	57,1
<u>Subfamília Tanypodinae</u>									
Tanypodinae N.I.								1	14,3
<u>Tribo Pentaneurini</u>									
<i>Ablabesmyia</i> sp.								5	71,4
<i>Labrundinia</i> sp.								5	71,4
<i>Larsia</i> sp.								3	42,9
<i>Monopelopia</i> sp.								1	14,3
<u>Tribo Tanypodini</u>									
<i>Tanypus</i> sp.								1	14,3
<u>Família Tipulidae</u>								2	28,6
Ordem Ephemeroptera									
<u>Família Baetidae</u>								1	14,3
<u>Família Leptohyphidae</u>								3	42,9
Ordem Odonata									
Subordem Anisoptera									

Composição Taxonômica	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
Família Gomphidae								1	14,3
Família Libellulidae								2	28,6
Ordem Trichoptera									
Família Polycentropodidae								1	14,3
Subtotal	11	15	12	9	2	3	18		
Filo MOLLUSCA									
Classe Bivalvia									
Subclasse Heterodonta									
Ordem Venerida									
Família Corbiculidae									
<i>Corbicula fluminea</i>								3	42,9
Classe Gastropoda									
Subclasse Caenogastropoda									
Família Thiaridae									
<i>Melanoides tuberculatus</i>								2	28,6
Subclasse Heterobranchia									
Ordem Basommatophora									
Família Physidae								1	14,3
Família Planorbidae									
Subfamília Ancylinae								1	14,3
Subtotal	-	2	1	3	-	-	1		
Filo NEMATODA									
Subtotal	-	-	-	-	-	-	1	1	14,3
Filo PLATYHELMINTHES									
Classe Turbellaria								1	14,3
Subtotal	-	-	1	-	-	-	-		
Total	15	18	16	17	6	7	23		
Total da Campanha				41					

- **Análise Quantitativa**

- **Densidade e Abundância Relativa**

A avaliação quantitativa dos invertebrados bentônicos amostrados na décima quarta campanha de monitoramento considerou a densidade (org./m²) e a abundância relativa (%), conforme resultados apresentados no **Quadro 4.4-2**.

No rio Jaguari, a maior densidade desses organismos foi obtida no ponto a jusante do córrego Entre-Montes (P05), com 9.395 org./m², enquanto o menor foi verificado junto à captação de Pedreira (P06), com 287 org./m², conforme apresentado no **Gráfico 4.4-3**. Na barragem particular (P07) foi registrado 796 org./m² e no córrego Entre-Montes (P04), foram registrados 131 org./m², computando o menor valor de densidade registrado na campanha.

No rio Jaguari, as larvas de Insecta constituíram o grupo mais numeroso na maioria da malha amostral, com máximo de 9.016 org./m², no P05. Constitui exceção apenas os pontos P03 e P06, os quais apresentaram as maiores densidades para anelídeos Hirudinea e Oligochaeta, com 218 org./m² e 275 org./m², respectivamente.

Os insetos mais abundantes no rio Jaguari foram os quironomídeos *Endotribelos* sp. (P01), tribo Tanytarsini (P02) e *Caladomyia* sp. (P05). A ampla abundância de quironomídeos é comum em sistemas aquáticos tropicais e um dos fatores que propiciam o estabelecimento de larvas de Chironomidae nos ambientes aquáticos é a onivoria e a variabilidade de obtenção de alimentos, tendo representantes em diversas categorias tróficas (ARMITAGE *et al.*, 1995).

Embora *Caladomyia* seja um gênero comum na América do Sul, seu estágio imaturo ainda é pouco conhecido em termos de biologia e autoecologia (TRIVINHO-STRIXINO, 2012).

Assim como na maioria dos pontos do rio Jaguari, no córrego Entre-Montes (P04), as maiores densidades foram reportadas para as larvas de dípteras (57 org./m²), sobretudo os exemplares da tribo Tanytarsini (29 org./m). No afluente represado do rio Jaguari (P07), este padrão também foi verificado, sendo os insetos o grupo mais abundante (670 org./m²), devido principalmente à *Caladomyia* sp. (224 org./m²).

Levando em conta os táxons considerados sensíveis, que constituem o EPT, verificou-se nesta campanha baixa densidade (<15 org./m²), com registro apenas nos pontos P02, P03 e P05.




Gráfico 4.4-3. Densidade dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14^oC (Outubro/22).

No **Gráfico 4.4-4** consta a abundância relativa dos grupos inventariados, seguindo os padrões apresentados na avaliação da densidade. Destaca-se a dominância dos insetos em na maioria dos pontos do rio Jaguari, alcançando 96% nos pontos P02 e P05, exceto na captação para abastecimento de Pedreira (P06) e a jusante do futuro reservatório (P03), onde os anelídeos dominaram, com 96% e 45%, respectivamente. No córrego Entre-Montes houve dominância de insetos e anelídeos, representando 44% e 43% da abundância. Como comentado anteriormente, na barragem formada pelo afluente do rio Jaguari, Insecta foi numericamente dominante, compondo 84% de toda a fauna de macroinvertebrados.




Gráfico 4.4-4. Abundância Relativa dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Quadro 4.4-2. Densidade e Abundância Relativa dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Composição Taxonômica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluentes do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%
Filo ANNELIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe Clitellata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subclasse Hirudinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família <i>Glossiphoniidae</i>	63	9,3	6	0,1	-	-	104	21,3	92	32,0	11	8,6	52	6,5
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordem Tubificida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família <i>Naididae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfamília <i>Naidinae</i>	-	-	-	-	-	-	40	8,3	11	4,0	-	-	-	-
Subfamília <i>Tubificinae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubificinae com queta capilar	103	15,3	-	-	6	0,4	63	12,9	92	32,0	23	17,5	46	5,8
Tubificinae sem queta capilar	34	5,1	-	-	17	1,1	11	2,3	81	28,1	23	17,3	6	0,7
Subtotal	201	29,7	6	0,1	23	1,5	218	44,9	275	96,0	57	43,4	103	13,0
Filo ARTHROPODA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfilo CHELICERATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe Arachnida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subclasse Acari	6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfilo CRUSTACEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe Ostracoda	-	-	-	-	-	-	23	4,7	-	-	17	12,9	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	23	4,7	-	-	17	12,9	-	-
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe Insecta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordem Diptera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordem Nematocera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família <i>Ceratopogonidae</i>	-	-	23	0,2	-	-	6	1,2	-	-	-	-	11	1,4
Família <i>Chironomidae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chironomidae N.I.	11	1,7	126	1,3	103	6,5	6	1,2	-	-	6	4,3	34	4,3
Subfamília <i>Chironominae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribo <i>Chironomini</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Asheum</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,7
<i>Chironomus</i> sp.	-	-	247	2,6	75	4,7	11	2,3	-	-	-	-	52	6,5

Composição Taxonômica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluente do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%
<i>Cladopelma</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,7
<i>Cryptochironomus</i> sp.	-	-	-	-	17	1,1	-	-	-	-	-	-	17	2,1
<i>Dicrotendipes</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1,4
<i>Endotribelos</i> sp.	224	33,1	247	2,6	6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Fissimentum</i> sp.	-	-	29	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Goeldichironomus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	7,2
<i>Polypedilum</i> sp.	40	6,0	563	6,0	46	2,9	6	1,2	6	2,0	-	-	69	8,7
<i>Stenochironomus</i> sp.	6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Tribo Tanytarsini</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanytarsini N.I.	40	5,9	1.437	15,3	966	61,1	-	-	-	-	29	21,8	-	-
<i>Caladomyia</i> sp.	-	-	5.282	56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	224	28,1
<u>Subfamília Orthocladiinae</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Tribo Corynoneurini</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corynoneura</i> sp.	-	-	-	-	69	4,3	-	-	-	-	23	17,5	-	-
<u>Tribo Orthocladiini</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cricotopus</i> sp.	17	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,7
<i>Nanocladius</i> sp.	-	-	592	6,3	150	9,5	11	2,3	-	-	-	-	23	2,8
<u>Subfamília Tanypodinae</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanypodinae N.I.	-	-	6	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Tribo Pentaneurini</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ablabesmyia</i> sp.	17	2,5	201	2,1	63	4,0	17	3,5	-	-	-	-	11	1,4
<i>Labrundinia</i> sp.	11	1,7	6	0,1	17	1,1	23	4,7	-	-	-	-	17	2,2
<i>Larsia</i> sp.	92	13,6	247	2,6	-	-	-	-	6	2,0	-	-	-	-
<i>Monopelopia</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	10,1
<u>Tribo Tanypodini</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tanytus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2,9
<u>Família Tipulidae</u>	6	0,8	-	-	6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordem Ephemeroptera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Família Baetidae</u>	-	-	-	-	6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Família Leptohyphidae</u>	-	-	6	0,1	-	-	11	2,3	-	-	-	-	17	2,1
Ordem Odonata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordem Anisoptera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Família Gomphidae</u>	-	-	6	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Família Libellulidae</u>	6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,7

Composição Taxonômica	Rio Jaguari										Córrego Entre-Montes		Afluente do Rio Jaguari	
	P01		P05		P02		P03		P06		P04		P07	
	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%	org./m ²	%
Ordem Trichoptera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família Polycentropodidae	-	-	-	-	-	-	11	2,3	-	-	-	-	-	-
Subtotal	470	69,5	9.016	96,0	1.522	96,4	102	21,0	11	4,0	57	43,7	670	84,2
Filo MOLLUSCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe Bivalvia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subclasse Heterodonta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordem Venerida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família Corbiculidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corbicula fluminea</i>	-	-	356	3,8	29	1,8	109	22,4	-	-	-	-	-	-
Classe Gastropoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subclasse Caenogastropoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família Thiariidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Melanooides tuberculatus</i>	-	-	17	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1,4
Subclasse Heterobranchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordem Basommatophora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Família Physidae	-	-	-	-	-	-	11	2,3	-	-	-	-	-	-
Família Planorbidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfamília Ancylinae	-	-	-	-	-	-	23	4,7	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	374	4,0	29	1,8	143	29,4	-	-	-	-	11	1,4
Filo NEMATODA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1,4
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1,4
Filo PLATYHELMINTHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe Turbellaria	-	-	-	-	6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	676	100,0	9.395	100,0	1.580	100,0	487	100,0	287	100,0	131	100,0	796	100,0

– Índices de Diversidade e Equitabilidade

O **Gráfico 4.4-5** apresenta os resultados dos índices de diversidade e de equitabilidade, calculados para a comunidade bentônica na décima quarta campanha de monitoramento da biota aquática (outubro/2022).

No rio Jaguari, a diversidade variou de 1,98 bits.ind⁻¹ (P06) a 3,41 bits.ind⁻¹ (P03). O córrego Entre-Montes (P04) apresentou diversidade semelhante à do rio Jaguari, com 2,68 bits.ind⁻¹, enquanto na barragem particular (P07), único ambiente lântico da malha amostral, este indicador mostrou um valor maior, de 3,72 bits.ind⁻¹.

A equitabilidade foi superior a 0,7, na maioria dos pontos do rio Jaguari, o que mostra boa distribuição dos táxons, padrão também observado no córrego Entre-Montes (P04, com 0,96) e no afluente represado do rio Jaguari (P07, com 0,82). Os P02 e P05, apresentaram valores inferiores, 0,56 e 0,54, respectivamente, possivelmente correlacionado à alta abundância de um único táxon (Insecta).




Gráfico 4.4-5. Índices de Diversidade e Equitabilidade dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

– Índice de Similaridade

A avaliação dos padrões de semelhança da comunidade de invertebrados bentônicos, amostrada na décima quarta campanha de monitoramento da biota aquática (outubro/2022), foi realizada por meio da análise de similaridade de Bray-Curtis (**Gráfico 4.4-6**).

Com base nesse indicador, foi observada a formação de dois grupos principais, um deles englobando pontos do rio Jaguari (P01, P03 e P06), o afluente represado do

rio Jaguari (P07) e o córrego Entre-Montes (P04) e o outro os pontos P05 e P02 do rio Jaguari. Este índice demonstra baixa similaridade entre os pontos da malha amostral.

Em relação aos pontos sob maior influência das obras (P02 e P03) nota-se que o P03 apresentou similaridade com o setor a montante das obras (P01), porém, o P02 apresentou baixo nível de similaridade (<40%) com o P01.




Gráfico 4.4-6. Similaridade dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 14^ºC (Outubro/22).

Coeficiente cofenético = 0,8983.

– Índice da Comunidade Bentônica - ICB

O **Quadro 4.4-3** apresenta os resultados do ICB, calculados com base nos dados registrados na décima quarta campanha de monitoramento da biota aquática na Barragem Pedreira (outubro/2022).

Nessa campanha, o ICB foi considerado Bom na maioria dos pontos do rio Jaguari (P02, P03 e P05), no córrego Entre-Montes (P04) e na barragem particular (P07), atingindo classificação Ótima no ponto P01 do rio Jaguari, possivelmente correlacionado à maior dominância de grupos tolerantes e do índice de diversidade. O

índice obteve a classificação Regular no ponto P06 do rio Jaguari, devido à ausência de táxons sensíveis neste local e o menor índice de diversidade registrado na campanha.

Em síntese, este indicador denota condições satisfatórias para o estabelecimento da comunidade bentônica na maioria dos locais monitorados.

Quadro 4.4-3. Índice da Comunidade Bentônica (ICB) – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Cursos d'água		Pontuação ICB	Categoria ICB
Rio Jaguari	P01	1	Ótima
	P05	2	Boa
	P02	2	Boa
	P03	2	Boa
	P06	3	Regular
Córrego Entre-Montes	P04	2	Boa
Afluentes do Rio Jaguari	P07	2	Boa

– Evolução dos principais indicadores

Nas campanhas de monitoramento da biota aquática, realizadas entre os meses maio e junho de 2018 (1^aC) e outubro de 2022 (14^aC), a riqueza total da comunidade bentônica se mostrou mais elevada em outubro de 2018 (2^aC), na transição seco/chuvoso, com um total de 66 táxons, enquanto que a menor riqueza foi verificada na sexta campanha (total de 33 táxons), durante o período chuvoso. A riqueza verificada na última campanha foi semelhante a da maioria das campanhas (41 táxons).

Os insetos, seguidos de moluscos e anelídeos, representaram os grupos de maior riqueza em todas as amostragens.

Considerando os distintos pontos de coleta e o conjunto das campanhas, o maior número de táxons (35) foi verificado no rio Jaguari (P03), na oitava e décima campanhas (outubro/2020 e junho/21). Conforme citado o ponto P07, no aflente represado através de barragem particular, não foi amostrado na quarta e na sexta campanhas, uma vez que a equipe não obteve permissão de acesso ao local. Faz-se notar que este local obteve baixos valores de riqueza na nona e décima campanha, comparativamente aos valores obtidos nas demais campanhas amostradas até o momento (outubro/2022).

A menor riqueza foi obtida no ponto P01, com três táxons, em fevereiro de 2019 (3^aC) e março de 2022 (12^aC). Observa-se que, de modo geral, os valores de riqueza do ponto a montante da área do futuro reservatório (P01) são mais baixos do que nos demais pontos. Este resultado implica em que as flutuações observadas neste

parâmetro não estão necessariamente correlacionadas com as obras de implantação do empreendimento, mas existem outros fatores ambientais determinantes para a riqueza da comunidade. Especificamente, na décima primeira campanha, o córrego Entre-Montes se destacou pela maior riqueza (33 táxons).

Na avaliação quantitativa, observa-se ampla variação entre as campanhas. De modo geral, verifica-se um aumento das densidades nos períodos secos, com picos nos períodos de transição do seco para chuvoso, campanhas realizadas nos meses de junho e de outubro, ocorrendo uma diminuição desses valores nos períodos chuvosos, campanhas dos meses de fevereiro. A maior densidade foi obtida no ponto P02 do rio Jaguari em outubro de 2018 (2^aC), com 29.000 org./m².

No entanto, o afluente do rio Jaguari represado na barragem particular (P07) também se destacou nas coletas em que foi amostrado, atingindo um pico de 14.923 org./m² também em outubro de 2018 (2^aC). A menor densidade (51 org./m²) foi verificada a montante do futuro reservatório (P01) em fevereiro de 2019 (3^aC), durante o período chuvoso.

Em todas as amostragens, as maiores densidades foram atribuídas aos insetos, sobretudo das tribos Chironomini e Tanytarsini, na maioria dos pontos, incluindo a coleta de outubro de 2022. De forma geral, os quironomídeos são grupos abundantes dentre os invertebrados bentônicos, sendo as tribos citadas consideradas semi-tolerantes às alterações ambientais, conforme indicado anteriormente.

A diversidade dessa comunidade variou tanto entre pontos da malha amostral quanto nas campanhas de monitoramento, sendo que ao longo de todo o monitoramento, o menor valor de diversidade (0,58 bits.ind⁻¹) foi observado no córrego Entre-Montes (P04), na transição do período seco para o chuvoso (junho de 2020, 7^aC), enquanto que o maior valor (3,95 bits.ind⁻¹) foi registrado em junho/21, no ponto a jusante da futura barragem (P03). No entanto, a amplitude de variação deste parâmetro em cada ponto amostral é semelhante, não se encontrando diferenças expressivas e consistentes entre os pontos ao longo de todo o período amostral.

Na série de campanhas realizadas, o Índice da Comunidade Bentônica – ICB foi considerado Bom ou Ótimo na maioria dos pontos da malha amostral.

Nos pontos do rio Jaguari foram registradas classificação Regular nos pontos: P01, em outubro de 2018 (2^aC), fevereiro de 2019 (3^aC) e junho de 2020 (7^aC); P02, em maio/junho de 2018 (1^aC) e junho de 2020 (7^aC); e P06, em junho de 2020 (7^aC), outubro de 2021 (11^aC), março, junho e outubro de 2022 (12^aC, 13^aC e 14^aC). No ponto P01,

nas campanhas de março e junho de 2022, o ICB teve classificação Ruim, contudo, contrastando à última campanha amostrada (outubro de 2022), a qual apresentou classificação Ótima.

No ponto P04 do córrego Entre-Montes, em junho de 2020 (7^aC), refletindo principalmente as riquezas mais baixas verificadas nessas amostras e ausência de táxons sensíveis às alterações ambientais. Na última campanha prevaleceu ICB Bom.

No afluente represado do rio Jaguari (P07), em fevereiro e outubro de 2021 (9^aC e 11^aC) foi registrada classificação Regular e em junho de 2021 (10^aC), o índice apresentou classificação Ruim. As últimas campanhas realizadas (março, junho e outubro de 2022) apresentaram classificação Boa para este ambiente.

A síntese dos principais indicadores utilizados na avaliação dos macroinvertebrados bentônicos durante as campanhas desenvolvidas no âmbito do Programa de Monitoramento da Biota Aquática da Barragem Pedreira consta no **Quadro 4.4-3**.

De forma geral, os resultados obtidos não evidenciaram interferências relevantes nesta comunidade que possam ser associadas diretamente à instalação do empreendimento, uma vez que na maioria das campanhas os pontos de amostragem do rio Jaguari apresentam-se semelhantes em termos de riqueza, densidade e diversidade zoobentônicas. Contudo, em algumas amostragens, como na campanha de outubro/2020 e fevereiro/20, a comunidade de macroinvertebrados bentônicos no rio Jaguari, à altura do ponto P02, se mostrou depauperado em espécies e em abundância em comparação com os demais locais de amostragem. Como este ambiente se encontra nas proximidades do canteiro de obras, a diminuição da riqueza e densidade pode ter sido reflexo das atividades desenvolvidas no local.

Quadro 4.4-3. Síntese dos Indicadores dos Invertebrados Bentônicos – Barragem Pedreira – 1 a 14^aC (Maio/Junho/2018 a Outubro/2022).

Indicador	Período	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
Riqueza Específica (nº de táxons)									
C1	jun/18	13	21	7	15	20	16	24	44
C2	out/18	9	15	23	34	18	31	34	66
C3	fev/19	3	6	14	15	15	16	26	53
C4	jun/19	9	22	26	16	14	9	NA	34
C5	out/19	16	15	18	21	11	21	22	38
C6	fev/20	12	20	7	14	14	12	NA	33
C7	jun/20	13	23	20	31	13	16	20	50
C8	out/20	21	26	12	35	19	20	19	56

Indicador	Período	Rio Jaguari					Córrego Entre- Montes	Afluente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
Riqueza Específica (nº de táxons)									
C9	fev/21	11	29	13	16	20	14	11	49
C10	jun/21	21	26	22	35	14	12	8	62
C11	out/21	15	17	11	21	8	33	16	51
C12	mar/22	3	22	23	15	8	12	19	45
C13	jun/22	7	23	25	23	12	9	18	60
C14	out/22	15	18	16	17	6	7	23	41
Densidade (org./m²)									
C1	jun/18	338	12.619	933	6.767	4.371	1.769	14.153	NA
C2	out/18	1.068	981	29.000	3.807	1.003	3.779	14.923	
C3	fev/19	51	149	349	257	504	308	4.280	
C4	jun/19	585	8.435	2.377	613	1.649	534	NA	
C5	out/19	3.028	3.758	7.022	8.384	390	3.797	3.424	
C6	fev/20	614	1.831	143	631	568	378	NA	
C7	jun/20	309	3.189	1.320	7.843	246	2.147	1.280	
C8	out/20	1.476	4.641	281	7.429	998	1.136	1.067	
C9	fev/21	142	3.245	412	1.815	3.504	315	314	
C10	jun/21	1.796	5.366	5.131	1.353	309	303	568	
C11	out/21	723	326	430	895	177	2.083	2.861	
C12	mar/22	259	1.308	807	1.389	3.660	240	1.170	
C13	jun/22	126	1.768	802	566	752	74	291	
C14	out/22	676	9.395	1.580	487	287	131	796	
Índice de Diversidade (bits.ind⁻¹)									
C1	jun/18	2,97	2,06	2,21	2,69	2,15	2,97	1,77	NA
C2	out/18	0,74	2,69	2,17	2,46	3,19	3,41	2,39	
C3	fev/19	1,23	1,67	3,19	3,6	2,94	3,37	3,44	
C4	jun/19	1,9	2,4	3,43	3,41	2,08	1,99	NA	
C5	out/19	2,3	1,85	2,91	2,66	2,95	3,36	3,16	
C6	fev/20	3,11	2,98	2,38	2,28	3,15	2,82	NA	
C7	jun/20	0,992	1,015	1,058	1,032	0,961	0,576	1,026	
C8	out/20	3,21	1,7	2,83	3,28	2,9	3,67	3,08	
C9	fev/21	3,15	3,2	2,69	2,07	2,55	3,44	2,7	
C10	jun/21	3,14	2,89	2,28	3,95	3,38	3,02	1,94	
C11	out/21	3,31	3,29	2,24	3,75	2,4	3,57	1,01	
C12	mar/22	0,875	3,394	3,734	2,684	2,1	3,152	3,078	
C13	jun/22	2,418	3,4	4,02	3,766	1,966	2,991	3,451	
C14	out/22	3,055	2,268	2,222	3,409	1,979	2,68	3,716	
ICB – Classificação									
C1	jun/18	Bom	Ótimo	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	NA
C2	out/18	Regular	Bom	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo	
C3	fev/19	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Ótimo	Bom	
C4	jun/19	Bom	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Bom	Bom	NA	
C5	out/19	Bom	Bom	Bom	Ótimo	Bom	Ótimo	Ótimo	
C6	fev/20	Bom	Ótimo	Bom	Bom	Ótimo	Bom	NA	
C7	jun/20	Regular	Bom	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	
C8	out/20	Ótimo	Bom	Bom	Ótimo	Bom	Bom	Bom	
C9	fev/21	Bom	Ótimo	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	
C10	jun/21	Bom	Ótimo	Bom	Ótimo	Bom	Bom	Ruim	
C11	out/21	Bom	Bom	Bom	Ótimo	Regular	Ótimo	Regular	
C12	mar/22	Ruim	Ótimo	Ótimo	Bom	Regular	Bom	Bom	
C13	jun/22	Ruim	Ótimo	Ótimo	Bom	Regular	Bom	Bom	
C14	out/22	Ótimo	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	

Legenda: NA- Não se aplica ou não analisado.

4.5. Macrófitas Aquáticas

a) Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa.

Na avaliação qualitativa das macrófitas aquáticas, realizada em outubro de 2022, no período de transição de seco para chuvoso, foi registrada a presença de 75 táxons desses vegetais, pertencentes a 58 gêneros e 33 famílias, integrantes do grupo das angiospermas e samambaias.

Foram identificadas ao nível específico 69 táxons (92%), enquanto que quatro permaneceram no nível genérico (5%) e dois táxons foram identificados até família (3%), devido a ausência de material reprodutivo para a identificação ou por divergência taxonômica, além de três táxons identificados ao nível específico ou genérico que necessitam de confirmação (apresentado com a abreviação “cf.” antes do epíteto).

No **Quadro 4.5-1** consta a listagem de táxons de macrófitas aquáticas inventariadas na malha amostral, na campanha de outubro de 2022, por família, os respectivos nomes populares, o tipo morfológico dominante e as espécies com potencial de infestação no ambiente aquático. Conforme anteriormente citado, foram caracterizados os mesmos pontos de amostragem adotados para biota aquática e qualidade da água, sendo a maioria representativa de ambientes lóticos (rio Jaguari e córrego Entre-Montes), além de um ponto localizado no afluente represado do rio Jaguari, o qual é considerado ambiente lêntico.

Nesse quadro lista-se, ainda, o potencial econômico das macrófitas aquáticas encontradas nos pontos de amostragem, considerando as plantas de uso medicinal, ornamentais e comestíveis, além das plantas endêmicas, naturalizadas, exóticas e que apresentam distribuição restrita no país..

Quadro 4.5-1 - Composição Taxonômica de Macrófitas Aquáticas – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Táxon	Nome popular	Forma Biológica	Pot. de Infestação	Potencial Econômico			Distribuição Restrita no Brasil
				Medicinal	Ornamental	Comestível	
Monilophytas (Samambaias)							
Blachnaceae							
<i>Blechnum</i> sp.		anfíbia					
Salviniaceae							
<i>Salvinia herzogii</i> de la Sota	salvinia, orelha-de-onça, pasta	flutuante livre					
Thelypteridaceae							
Thelypteridaceae sp.		anfíbia					
Magnoliophytas (Angiospermas)							
Acanthaceae							
<i>Hygrophila costata</i> Ness		emergente					
<i>Ruellia</i> cf. <i>paniculata</i> L.		anfíbia					Nordeste, Tocantins, Goiás, Sudeste
Amaranthaceae							
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	brejo d'água, perpétua	emergente					
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espinho, caruru-bravo	anfíbia					
Apiaceae							
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	pata-de-mula, pata-de-cavalo	anfíbia					naturalizada / Nordeste, Sudeste e Sul
Apocynaceae							
<i>Asclepias curassavica</i> L.	oficial-de-sala, margadinha-leiteira	anfíbia					
Araceae							
<i>Pistia stratiotes</i> L.	alface-d'água	flutuante livre					
Araliaceae							

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA

Táxon	Nome popular	Forma Biológica	Pot. de Infestação	Potencial Econômico			Distribuição Restrita no Brasil
				Medicinal	Ornamental	Comestível	
<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	erva-capitão-do-brejo	flutuante fixa					Mato Grosso do Sul, Sudeste e Sul
Asteraceae							
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	buva, voadeira	anfíbia					
<i>Eclipta prostrata</i> L.	agrião-do-brejo, erva-botão	anfíbia					
<i>Lessingianthus glabratus</i> (Less.) H. Rob.	assa-peixe-roxo	anfíbia					Centro-Oeste, Sudeste e Sul
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	cipó-cabeludo, cipó-catinga	anfíbia					
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	macela	anfíbia					
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	couve-cravinho, erva-fresca	anfíbia					
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	insulina, vedélia	anfíbia					
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	botão-de-ouro	anfíbia					
<i>Thitonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gra	girassol-mexicano, margaridão	emergente					naturalizada
Begoniaceae							
<i>Begonia</i> sp.	begonia	anfíbia					
Brassicaceae							
<i>Cardamine bonariensis</i> Pers.	agrião-bravo, agriãozinho	anfíbia					naturalizada
Caryophyllaceae							
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.	mastruço-de-brejo	emergente					
Commelinaceae							
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	trapoeraba	anfíbia					
<i>Commelina erecta</i> L.	trapoeraba-azul	anfíbia					
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	trapoeraba	anfíbia					
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos	trapoeraba-roxa, marianinha	anfíbia					
Convolvulaceae							
<i>Ipomoea alba</i> L.	dama-da-noite, flor-da-noite	anfíbia					

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA

Táxon	Nome popular	Forma Biológica	Pot. de Infestação	Potencial Econômico			Distribuição Restrita no Brasil
				Medicinal	Ornamental	Comestível	
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	campainha, corda-de-viola	anfíbia					
Cyperaceae							
<i>Cyperus chalaranthus</i> J.Presl & C.Presl	tiririca, junça, capim-agreste	anfíbia					Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul
<i>Cyperus mundtii</i> (Nees) Kunth	junquinho	emergente					naturalizada / Centro-Oeste, Sudeste e Sul
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	tiririca, junça, junquinho	anfíbia					
<i>Cyperus</i> sp.	tiririca	anfíbia					
<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	junco-manso, junco-fino	emergente					
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.	junco-manso	emergente					
<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	navalha-de-macaco, capituva	anfíbia					
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi	navalha-de-mico	anfíbia					
Fabaceae							
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.	angiquinho, corticeirinha	anfíbia					
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC	marmelada-de-cavalo, pega-pega	anfíbia					
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	espinheiro-de-maricá	anfíbia					
<i>Mimosa</i> cf. <i>pudica</i> L.	dormideira, sensitiva	anfíbia					
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	alfafa-do-campo, estilósante	anfíbia					
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	feijão-das-dunas	anfíbia					
Haloragaceae							
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	pinheirinho d'água	flutuante fixa					
Hypericaceae							
<i>Hypericum mutilum</i> L.		anfíbia					Sudeste e Sul
Hydrocharitaceae							

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA AQUÁTICA

Táxon	Nome popular	Forma Biológica	Pot. de Infestação	Potencial Econômico			Distribuição Restrita no Brasil
				Medicinal	Ornamental	Comestível	
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	erva-de-sapo, camalotinho	flutuante livre					
Iridaceae							
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.		anfíbia					Centro-Oeste, Sudeste e Sul
Lythraceae							
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schlecht.	sete-sangrias	anfíbia					Centro-Oeste, Sudeste e Sul
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.	hortelã-brava, fazendeiro	anfíbia					
Malvaceae							
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma, vassoura-tupitixá	anfíbia					
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma, malva-preta	anfíbia					
Melastomataceae							
Melastomataceae sp.		anfíbia					
Onagraceae							
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	emergente					Centro-oeste, Sudeste e Sul
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara	cruz-de-malta	emergente					
<i>Ludwigia myrtifolia</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	emergente					Endêmica do Brasil / Sudeste e Sul
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	cruz-de-malta	emergente					
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven	cruz-de-malta	emergente					Nordeste, Sudeste e Sul
<i>Ludwigia sericea</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	anfíbia					Centro-oeste, Sudeste e Sul
Plantaginaceae							
<i>Callitriche deflexa</i> A.Braun ex Hegelm.	tapete-verde	anfíbia					Sudeste e Sul
<i>Micranthemum umbrosum</i> (Walter ex J.F.Gmel.) S.F.Blake	agriãozinho-tapete	emergente					
<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	tanchagem	anfíbia					Sudeste e Sul
Poaceae							

Táxon	Nome popular	Forma Biológica	Pot. de Infestação	Potencial Econômico			Distribuição Restrita no Brasil
				Medicinal	Ornamental	Comestível	
<i>Ocellochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone		anfíbia					
<i>Panicum repens</i> L.	canarana-rasteira, grama-de-castela	emergente					naturalizada
<i>Urochloa cf adspersa</i> (Trin.) R.D.Webster	tenner-grass	anfíbia					naturalizada / Nordeste, Centro-Oeste e Sul
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	braquiária-do-alto, braquiária-do-morro	anfíbia					naturalizada
Polygonaceae							
<i>Polygonum diospyrifolium</i> Cham.	erva-de-bicho	emergente					Endêmica do Brasil/ Minas Gerais, São Paulo e Paraná
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	erva-de-bicho	emergente					
Pontederiaceae							
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	aguapé	flutuante livre					
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.	pavoa, hortelã-do-brejo	flutuante fixa					
Solanaceae							
<i>Brugmansia cf. suaveolens</i> (Willd.) Sweet	trombeteira, cartucheira	anfíbia					naturalizada
<i>Solanum americanum</i> Mill.	maria-pretinha, erva-moura	anfíbia					
Urticaceae							
<i>Urera caracasa</i> (Jacq.) Griseb.	urtiga, urtiga-branca, urtiga-cipó	anfíbia					
<i>Urtica</i> sp.	urtiga	anfíbia					
Verbenaceae							
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão-azul, chá-do-brasil	anfíbia					
Zingiberiaceae							
<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	lírio-do-brejo	emergente					naturalizada

Legenda: células cinzas = presença da característica citada.

Conforme apresentado no **Gráfico 4.5-1**, destacou-se pela maior representatividade nos ambientes estudados, em outubro de 2022, a família Asteraceae com nove espécies, seguida da família Cyperaceae com oito táxons e Fabaceae e Onagraceae com seis táxons, cada.

Asteraceae possui distribuição cosmopolita, sendo uma das famílias mais expressivas com 1.600-1.700 gêneros e 24.000-34.000 espécies. No Brasil a família é bem representada, ocorrendo aproximadamente 250 gêneros e 2.000 espécies (SOUZA & LORENZI, 2008).

Na maioria das campanhas anteriores, as maiores riquezas foram associadas às famílias Cyperaceae e Poaceae. Em geral, essas duas famílias tendem a apresentar maior riqueza específica em ambientes aquáticos, devido à sua ampla distribuição, com mais de 5.000 e 10.000 espécies, respectivamente (WATSON & DALLWITZ, 1992; GOETGHEBEUR, 1998), estimando-se que 30% e 9% dos gêneros correspondam à vegetação aquática (COOK, 1999; RUTISHAUSER, 2010). Essas famílias possuem sistema subterrâneo complexo formado por rizomas e tubérculos, alguns dotados de estolhos subterrâneos, que permitem eficiente propagação vegetativa e, conseqüentemente, maior competitividade e dominância (GOETGHEBEUR, 1998).

Fabaceae possui distribuição cosmopolita, incluindo cerca de 650 gêneros e 18.000 espécies, representando uma das maiores famílias de Angiospermas e também uma das principais do ponto de vista econômico, com variados tipos de utilização. No Brasil ocorrem aproximadamente 175 gêneros e 1.500 espécies (SOUZA & LORENZI, 2008)

A família Onagraceae possui distribuição cosmopolita, com representantes de quatro gêneros e cerca de 50 espécies no Brasil, dentre as quais *Ludwigia*, registrada na maioria das campanhas deste monitoramento. Esse gênero apresenta ampla ocorrência associada principalmente a locais alagáveis (SOUZA & LORENZI, 2008).

As famílias Commelinaceae e Poaceae apresentaram quatro táxons, cada. Commelinaceae possui distribuição predominantemente pantropical, incluindo cerca de 40 gêneros e 650 espécies. No Brasil ocorrem 14 gêneros e cerca de 60 espécies. A família Plantaginaceae que foi representada por três espécies possui distribuição cosmopolita, incluindo aproximadamente 200 gêneros e 2.500 espécies, tendo no Brasil 16 gêneros e cerca de 120 espécies (SOUZA & LORENZI, 2008).

As demais famílias foram representadas na rede amostral por dois táxons (Acanthaceae, Amaranthaceae, Convolvulaceae, Lythraceae, Malvaceae,

Polygonaceae, Pontederiaceae, Solanaceae, Urticaceae) ou apenas um táxon (Apiaceae, Apocynaceae, Araceae, Araliaceae, Begoniaceae, Blachnaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Melastomataceae, Salviniaceae, Thelypteridaceae, Verbenaceae, Zingiberiaceae).




Gráfico 4.5-1– Riqueza Táxons de Macrófitas Aquáticas por Família – Barragem Pedreira – 14ªC (Outubro/22).

Nota: O grupo “Outros” integra as famílias Apiaceae, Apocynaceae, Araceae, Araliaceae, Begoniaceae, Blachnaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Melastomataceae, Salviniaceae, Thelypteridaceae, Verbenaceae, Zingiberiaceae representadas por um táxon.

– **Formas Biológicas**

Considerando as formas biológicas, verifica-se na malha amostral uma maior representatividade das anfíbias, compreendendo 51 táxons (68%), seguidas das emergentes com 17 táxons (23%), e com menor expressão as flutuantes livres (5%) e flutuantes fixas (4%). Esses resultados corroboram as informações da literatura, que, em geral, relatam a ocorrência de maior número de espécies de macrófitas aquáticas anfíbias e emergentes nos ambientes aquáticos.

O predomínio dessas formas biológicas decorre, principalmente, de suas adaptações morfológicas e fisiológicas que permitem as anfíbias habitarem tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres e as emergentes predominarem nas zonas litorâneas, nas quais são encontradas as maiores concentrações dessas plantas.

As famílias Asteraceae, Commelinaceae e Fabaceae são bem representadas pela forma biológica anfíbia, provavelmente pelo fato destas serem ruderais, ou seja, bem adaptadas a vários tipos de sedimentos e condições climáticas, além de áreas antropizadas.

No **Quadro 4.5-2** e no **Gráfico 4.5-2** constam a riqueza de táxons e a frequência de ocorrência (FO) das macrófitas aquáticas por forma biológica nos pontos monitorados nesta última amostragem (outubro/2022).

Em todos os locais amostrados observou-se a presença de macrófitas aquáticas, assim como na maioria das campanhas anteriores, sendo exceção apenas a quarta campanha (junho/2019) que houve ausência de macrófitas em dois pontos (P01 e P02) e a nona coleta (fevereiro/2021) no ponto P01.

O máximo de riqueza foi computado no ponto P02, situado no rio Jaguari, com 28 táxons, seguido dos pontos P07 (afluente do rio Jaguari represado) e P05 (rio Jaguari) com 22 e 20 táxons, respectivamente. Uma riqueza intermediária foi verificada nos pontos P04 (córrego Entre-Montes), P01 e P06 (ambos no rio Jaguari) com 15, 12 e 11 táxons, respectivamente. A menor riqueza foi registrada no ponto P03 (rio Jaguari) com nove táxons.

Em outubro de 2022 verificou-se um aumento expressivo de macrófitas aquáticas, tanto da riqueza total, quanto da riqueza pontual em relação às amostragens anteriores realizadas no mesmo período. Com destaque para os pontos P02 (rio Jaguari) e P07 (afluente do rio Jaguari represado), onde o aumento de riqueza foi mais expressivo, sendo adicionadas dez novas espécies em relação à coleta de mesmo período (outubro/2021). Cabe mencionar que esse aumento se deve principalmente as espécies anfíbias, principalmente das famílias Asteraceae, Commelinaceae, Cyperaceae e Fabaceae, as quais foram registradas através de indivíduos isolados, não apresentando populações expressivas.

Segundo Wetzel & Likens (2000) as zonas litorâneas são áreas de grande produtividade e diversidade de espécies, devido à produção primária de macrófitas, de perifíton e de fitoplâncton. As maiores taxas de sedimentação nesses trechos reduzem

a profundidade e criam novas áreas propícias à colonização por essas plantas (THOMAZ *et al.*, 2003), o que tem ocorrido no ponto P02.

A forma biológica anfíbia ocorreu em todos os pontos monitorados, obtendo a maior frequência de ocorrência (100%), seguida das formas biológicas emergentes (86%), flutuantes livres (57%) e flutuantes fixas (43%).

Na última campanha (outubro/2022) a forma biológica flutuante livre ocorreu em quatro pontos amostrados do rio Jaguari, obtendo assim um leve aumento da frequência de ocorrência em relação à campanha anterior (junho/2022).

Nessa campanha também houve o registro da forma biológica flutuante fixa através das espécies *Myriophyllum aquaticum* (pinheirinho d'água) no ponto P02, *Hydrocotyle verticillata* (erva-capitão-do-brejo) no ponto P03 e *Heteranthera reniformis* (hortelã-do-brejo) no ponto P05, todos situados no rio Jaguari.

Quadro 4.5-2 – Frequência de Táxons de Macrófitas Aquáticas por Forma Biológica e Riqueza de Táxons – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Formas Biológicas	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
Anfíbia	6	12	15	6	5	11	16	7	100
Emergente	3	7	9	0	3	4	6	6	86
Flutuante livre	3	0	3	2	3	0	0	4	57
Flutuante fixa	0	1	1	1	0	0	0	3	43
Total de táxons por ponto	12	20	28	9	11	15	22	-	-
Total de táxons por curso d' água	58					15	22	-	-
Total de táxons na campanha	75								




Gráfico 4.5-2 - Riqueza de Macrófitas Aquáticas por Forma Biológica – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

– Potencial de infestação

Do conjunto de macrófitas identificadas na malha amostral da Barragem Pedreira, a maioria dos táxons (83%) é considerada infestante ou daninha, de acordo com a literatura consultada (KISSMANN, 1997; KISSMANN & GROTH, 1999 e 2000; LORENZI, 2008). Contudo, nos segmentos monitorados no rio Jaguari e contribuintes, nenhuma espécie apresentou potencial infestante, exibindo todas baixas frequências e/ou coberturas, assim como nas campanhas anteriores deste programa de monitoramento, o que representa um aspecto positivo no contexto da formação do futuro reservatório, pois a maioria dessas plantas podem causar transtornos ao corpo hídrico quando se desenvolvem em excesso.

Porém, cabe destacar, que foi observado um aumento da área de cobertura das espécies flutuante livre *Eichhornia crassipes* (aguapé) e flutuante fixa *Myriophyllum aquaticum* (pinheirinho d'água) no ponto P02, onde foram registradas nas campanhas anteriores (fevereiro e junho/2022) a formação de pequenos bancos nas margens, os quais tiveram um leve aumento da área de cobertura nesta última campanha (outubro/2022). Apesar dessa área ainda não ser expressiva, merece atenção, pois em condições favoráveis, a espécie *E. crassipes* (aguapé), pode duplicar a área coberta em apenas uma semana, formando uma massa vegetativa, interferindo em vias navegáveis, além de prejudicarem plantas e organismos aquáticos submersos, através da decomposição (BOVE & PAZ, 2009).

– **Potencial Econômico**

Entre as espécies identificadas na malha amostral, 23 apresentam valor medicinal (LORENZI & MATOS, 2008), 15 ornamental (LORENZI & SOUZA, 2001), enquanto 11 são utilizadas como alimento (POTT & POTT, 2000), conforme sintetizado a seguir.

Há registros da utilização das espécies comestíveis na área amostrada da Barragem Pedreira como, por exemplo, a espécie *Vigna luteola* (feijão-das-dunas), uma leguminosa nativa de grande valor forrageiro. Os frutos maduros da espécie *Solanum americanum* (maria-pretinha) também são comestíveis, porém, verdes são venenosos, assim como outras partes desta planta. Esta espécie apresenta compostos com efeito narcótico, sedativo e analgésico, motivo pelo qual tem sido usada na medicina popular (KISSMANN & GROTH, 2000). Dos rizomas da espécie *Hedychium coronarium* é possível extrair uma fécula comestível (KISSMANN & GROTH, 2000), esta espécie também é utilizada como planta ornamental.

Diversas espécies dos gêneros *Polygonum* (erva-de-bicho) e *Alternanthera* (apaga-fogo) são amplamente empregadas na medicina caseira em diversas regiões, onde são consideradas adstringentes, estimulantes, diuréticas e vermícidas (LORENZI & MATOS, 2008). Assim como a família Asteraceae que possui muitas espécies com aplicações na medicina caseira, tendo como exemplos *Eclipta prostrata* (agrião-do-brejo), *Elephantopus mollis* (pé-de-elefante), *Galinsoga parviflora* (picão-branco), *Mikania cordifolia* (cipó-cabeludo), *Pluchea sagittalis* (madrecravo), *Porophyllum ruderale* (couve-cravinho) e *Thitonia diversifolia* (girassol-mexicano) registradas na última campanha deste monitoramento.

A espécie *Sida rhombifolia* (guanxuma) é amplamente empregada na medicina caseira em todo o país e até no exterior (LORENZI & MATOS, 2008), assim como as folhas da espécie *Drymaria cordata* que possuem aplicações na medicina caseira, além de serem comestíveis quando jovens (SCHWIRKOWSKI, 2009).

As folhas novas e sementes de *Amaranthus* (caruru) são bastante nutritivas, enquanto as raízes e folhas são usadas na medicina popular como diuréticas (KISSMANN & GROTH, 1999). As folhas da espécie *Ludwigia leptocarpa* são consumidas como hortaliças e através das flores são produzidos corantes amarelos assim como a espécie *L. octovalvis* (cruz-de-malta), essas duas macrófitas também possui alto valor medicinal, sendo as folhas empregadas como cicatrizante.

Muitas espécies da família Convolvulaceae também são empregadas como ornamentais devido as suas flores vistosas, como exemplo na área amostrada temos as espécies *Ipomoea alba* e *I. cairica* registrada na maioria das campanhas. Assim como

as espécies *Asclepias curassavica*, *Sphagneticola trilobata*, *Commelina erecta*, *Thitonia diversifolia*, *Pluchea sagittalis*, *Ruellia paniculata*, as quais também são utilizadas como plantas ornamentais. As espécies *Limnobium laevigatum* e *Myriophyllum aquaticum* são plantas flutuantes utilizadas como ornamentais geralmente em aquários e lagos.

A espécie *Brugmansia suaveolens* também é considerada ornamental devido suas flores vistosas, porém sua utilização paisagística é bastante discutida, visto que é uma planta tóxica e narcótica, pois todas as partes da planta possuem alcalóides que podem provocar várias reações. Em contraponto ao seu efeito tóxico, da planta são extraídas substâncias de utilização farmacêutica, para a produção de medicamentos (PATRO, 2013).

As espécies do gênero *Typha* (taboa), além do uso terapêutico, são consideradas comestíveis e ornamentais (POTT & POTT, 2000). Assim como as flutuantes livres *Pistia stratiotes* (alface d'água) e *Eichhornia crassipes* (aguapé), porém cabe salientar que as duas últimas espécies, além de estarem enquadradas nas três categorias de potencial econômico, são macrófitas flutuantes livres, de caráter infestante, que se proliferam principalmente em ambientes lênticos. Os brotos tenros e a flor de *E. crassipes* são comestíveis, suas folhas são adstringentes e depurativa, além disso devido às suas flores é considerada como ornamental em lagos e tanques (POTT & POTT, 2000).

– Distribuição no Brasil

De acordo com o **Quadro 4.5-2**, verifica-se que a maioria das espécies de macrófitas aquáticas (77%) registradas nesta última campanha (outubro/2022) no rio Jaguari e seus contribuintes apresenta ampla distribuição, sendo 17 espécies consideradas restritas entre uma e três regiões do Brasil. (FLORA DO BRASIL, 2020).

Segundo Flora do Brasil (op. cit.), a maioria (88%) das plantas registradas nesta última campanha é nativa, exceto nove espécies, com a maioria pertencendo a família Poaceae, além das famílias Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Cyperaceae, Solanaceae e Zingiberaceae, as quais são naturalizadas no Brasil, não ocorrendo, portanto, espécies exóticas de macrófitas aquáticas na malha amostral da barragem Pedreira.

São consideradas plantas naturalizadas as espécies vegetais introduzidas em uma determinada região geográfica, que se adaptam às condições locais e estabelecem populações capazes de se reproduzir espontaneamente (sem intervenção humana) e sustentar populações por muitas gerações. Planta exótica tem sua presença em um

determinado local devido à introdução intencional ou acidental, como resultado de atividade humana (SCHNEIDER, 2007).

As espécies *Ludwigia myrtifolia* e *Polygonum diospyrifolium* são consideradas endêmicas do Brasil. A espécie *Hypericum mutilum* é considerada vulnerável (VU) na lista vermelha da flora de São Paulo (SMA-SP, 2016) e na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2022). Segundo a CNCFlora (2012) essa espécie parece ser rara, já que dispõe de apenas nove registros de coleta, o mais recente realizado em 1989. Pelas informações disponíveis nas fichas das coleções, ocorre em somente uma unidade de conservação (SNUC), conseqüentemente, a espécie foi avaliada como "Vulnerável" (VU), demandando estudos populacionais mais detalhados para uma avaliação mais precisa. Provavelmente devido ao seu pequeno porte não é uma planta muito coletada e depositada em herbários, o que dificulta uma avaliação mais precisa. Nenhuma espécie é considerada rara ou descrita nas listas da Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) e da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Selvagens (CITES)

– **Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência na Malha Amostral**

Conforme demonstrado no **Gráfico 4.5-3** e no **Quadro 4.5-3**, a maioria (63%) dos táxons de macrófitas aquáticas foi considerada esporádica segundo classificação de Souza *et al.* (2009), com ocorrência inferior a 17% dos pontos amostrados e 24 táxons (32%) foram classificados como pouco frequentes com presença entre 17 e 50% dos pontos amostrados.

Apenas quatro táxons (5%) foi considerado frequente com presença entre 50 e 80% dos pontos amostrados (*Eclipta prostrata*, *Eichhornia crassipes*, *Ipomoea cairica*, *Urochloa brizantha*) e nenhuma espécie foi considerada muito frequente, com ocorrência superior a 80%. As espécies *E. prostrata*, *I. cairica* e *U. brizantha* são macrófitas anfíbias registradas com pequena área de cobertura nas margens não apresentando potencial de infestação na área amostrada. Enquanto a espécie *E. crassipes* (aguapé) é uma flutuante livre que tem aumentado sua área de cobertura no ponto P02 conforme será detalhado posteriormente, merecendo atenção na área de amostragem.

O mesmo padrão de frequência foi detectado em amostragens pretéritas deste programa de monitoramento.




Gráfico 4.5-3- Frequência de Ocorrência dos Táxons de Macrófitas Aquáticas – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

Nas fotos a seguir são ilustrados alguns dos exemplares registrados na malha amostral da Barragem Pedreira na última campanha realizada em outubro de 2022.



Foto 4.5-5 – Banco de flutuantes livres na margem esquerda do rio Jaguari (P01).



Foto 4.5-6 – Macrófitas anfíbias na margem direita do rio Jaguari (P01).



Foto 4.5-7 – Zona litorânea com diversas macrófitas no rio Jaguari (P02).



Foto 4.5-8 – Bancos de *E. crassipes* (aguapé) e *M. aquaticum* (pinheirinho d'água) no rio Jaguari (P02).



Foto 4.5-9 – Banco *Hydrocotyle verticillata* (erva-capitão-do-brejo) flutuante fixa do rio Jaguari (P03).



Foto 4.5-10 – Flutuantes livres isoladas no rio Jaguari (P03).



Foto 4.5-11 – *Brugmansia suaveolens* (trombeteira) do córrego Entre-Montes (P04).



Foto 4.5-12 – *Commelina obliqua* (trapoeraba) no córrego Entre-Montes (P04).



Foto 4.5-13 – *Hygrophila costata* no rio Jaguari (P05).



Foto 4.5-14 – *Micranthemum umbrosum* (agriãozinho-tapete) no rio Jaguari (P05).



Foto 4.5-15 – Macrófitas anfíbias na margem direita com no rio Jaguari (P06).



Foto 4.5-16 – Macrófitas emergentes no rio Jaguari (P06).



Foto 4.5-17 – *Stylosanthes guianensis* (alfafa-do-campo) no afluente represado do rio Jaguari (P07).



Foto 4.5-18 – *Ludwigia sericea* (cruz-de-malta) no afluente represado do rio Jaguari (P07).

– Índice de Cobertura

A análise da área de cobertura das macrófitas aquáticas demonstrou que a maioria dos táxons (93%) apresentou cobertura pequena e rara (<1%, Índice R). Nove táxons (12%) apresentaram cobertura esporádica (<5%, Índice 1) conforme Quadro 4.5-3.

A área de cobertura máxima registrada foi entre 5 e 24% (índice 2) para sete táxons (9%), dentre as quais se destacam *Eichhornia crassipes* (aguapé) e *Myriophyllum aquaticum* (pinheirinho da'água) no ponto P02 (corpo principal do reservatório) conforme citado anteriormente, tem sido observado um aumento da área de cobertura dessas plantas nas três últimas campanhas (fevereiro, junho e outubro de 2022) nesse ponto. Cabe mencionar que foi observada também nesse ponto um aumento de proliferação da alga *Mougeotia* sp. em associação as macrófitas aquáticas (Foto 4.5-7).

A espécie *Eichhornia crassipes* (aguapé) merece atenção, por ser flutuante livre com potencial de infestação em reservatórios, pois formam grandes tapetes entrelaçados, ligados por estolões, e absorvem nutrientes diretamente da água. É muito vigorosa, aumentando sua área em 15% por dia e dobrando a cada 6-7 dias quando em condições ótimas, além disso, suas raízes abrigam os caramujos transmissores da esquistossomose (LORENZI, 2008).

A espécie *Myriophyllum aquaticum* (flutuante fixa) também é bastante frequente na maioria dos mananciais de água parada, possuem nítida preferência por águas neutras ou levemente alcalinas, vegeta com grande vigor formando densas infestações que chegam a impedir o fluxo normal da água (LORENZI, 2008).

Em todos os pontos, na última campanha (outubro/2022), a área livre de macrófitas aquáticas foi superior a 75% (índice 5), não sendo observados bancos expressivos e homogêneos destes vegetais.

Em síntese, as áreas de cobertura dos táxons de macrófitas aquáticas no rio Jaguari e contribuintes não são extensas, tendo assim um equilíbrio na comunidade, sem a presença de espécies dominantes ou co-dominantes em todos os pontos de coleta, o que está possivelmente relacionado à correnteza observada na maior parte dos pontos amostrados, o que dificulta a formação de bancos expressivos.

Porém, conforme citado anteriormente, no ponto P02 (corpo principal do futuro reservatório, próximo à barragem) tem se formado um ambiente propício para o desenvolvimento de macrófitas com uma zona litorânea com baixa correnteza, merecendo atenção a fim de evitar bancos expressivos.

A área de cobertura seguiu mesmo padrão das coletas anteriores para a maioria dos táxons, com excessão das espécies *Eichhornia crassipes* (aguapé) e *Myriophyllum aquaticum* (pinheirinho d'água) no ponto P02 que apresentaram um leve aumento na área de cobertura.

Quadro 4.5-3 – Índice de Cobertura por Ponto de Coleta e Frequência de Ocorrência – Barragem Pedreira – 14^aC (Outubro/22).

Táxons	Índice de Cobertura							Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluentes do Rio Jaguari		
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.			R				R	2	29
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	1		2					2	29
<i>Amaranthus spinosus</i> L.		R						1	14
<i>Asclepias curassavica</i> L.		R						1	14
<i>Begonia</i> sp.					R			1	14
<i>Blechnum</i> sp.			R				R	2	29
<i>Brugmansia cf. suaveolens</i> (Willd.) Sweet						R		1	14
<i>Callitriche deflexa</i> A. Braun ex Hegelm.		R						1	14
<i>Cardamine bonariensis</i> Pers.		R						1	14
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.			R				R	2	29
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.		R				R		2	29
<i>Commelina erecta</i> L.	R							1	14
<i>Commelina obliqua</i> Vahl				R		R		2	29
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist			R					1	14
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schlecht.		R				R	R	3	43
<i>Cyperus</i> sp.			R					1	14
<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	R			R				2	29
<i>Cyperus mundtii</i> (Nees) Kunth			1				2	2	29
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.		R						1	14
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC							R	1	14
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.		R	R		1			3	43
<i>Eclipta prostrata</i> L.	R	R	R				R	4	57
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	1		2	R	R			4	57
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.	R	R						2	29
<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth							R	1	14

Táxons	Índice de Cobertura							Frequência	Frequência de Ocorrência (%)
	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari		
	P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07		
<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig						2		1	14
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.		R						1	14
<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.				R				1	14
<i>Hygrophila costata</i> Ness		R	2					2	29
<i>Hypericum mutilum</i> L.				R				1	14
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.			R				R	2	29
<i>Ipomoea alba</i> L.	R		R					2	29
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	R	R		R		R		4	57
<i>Lessingianthus glabratus</i> (Less.) H.Rob.							R	1	14
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine					R			1	14
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara			1		R	R		3	43
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara							R	1	14
<i>Ludwigia myrtifolia</i> (Cambess.) H.Hara			R					1	14
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven		R					R	2	29
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven			R					1	14
<i>Ludwigia sericea</i> (Cambess.) H.Hara							R	1	14
Melastomataceae sp.				R				1	14
<i>Micranthemum umbrosum</i> (Walter ex J.F.Gmel.) S.F.Blake		R						1	14
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.			R					1	14
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze		R						1	14
<i>Mimosa cf. pudica</i> L.							R	1	14
<i>Muriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.			2					1	14
<i>Ocelochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone						R		1	14
<i>Panicum repens</i> L.							R	1	14
<i>Pistia stratiotes</i> L.	1		R		R			3	43
<i>Plantago tomentosa</i> Lam.						R		1	14

Táxons	Índice de Cobertura						Frequência	Frequência de Ocorrência (%)	
	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes			Afluente do Rio Jaguari
	P01	P05	P02	P03	P06	P04			P07
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera			R				R	2	29
<i>Polygonum diospyrifolium</i> Cham.						R		1	14
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott		R	R			R		3	43
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.			R					1	14
<i>Rhyncospora corymbosa</i> (L.) Britton			R				R	2	29
<i>Ruellia cf. paniculata</i> L.					1			1	14
<i>Salvinia herzogii</i> de la Sota	1		2	R				3	43
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi	R							1	14
<i>Sida planicaulis</i> Cav.						R		1	14
<i>Sida rhombifolia</i> L.					R		R	2	29
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.							R	1	14
<i>Solanum americanum</i> Mill.		R						1	14
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski					1	R		2	29
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl						R		1	14
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.							R	1	14
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.						R		1	14
Thelypteridaceae sp.			R				R	2	29
<i>Thitonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gra					R			1	14
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos		R						1	14
<i>Urera caracasa</i> (Jacq.) Griseb.					R			1	14
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	R	R	R				R	4	57
<i>Urochloa cf adpersa</i> (Trin.) R.D.Webster				R				1	14
<i>Urtica</i> sp.			R					1	14
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.			R					1	14

Legenda: R = pequena e rara. 1 = esporádica, com indivíduos de pequeno porte. 2 = Rala, com poucos indivíduos. 3 = Dispersa, com numerosos indivíduos.


– **Análise de Similaridade**

A avaliação dos padrões de semelhança da comunidade de macrófitas aquáticas, amostrada na décima quarta campanha de monitoramento da biota aquática (outubro/2022), foi realizada por meio da análise de similaridade de Jaccard (Gráfico 4.5-4). Com base nesse indicador, foi observado baixo nível de similaridade em todas as associações (<0,5).

Foi possível verificar um agrupamento com a maioria dos pontos localizados no rio Jaguari (P01, P02, P3, P05), no afluente represado dele (P07) e no córrego Entre-Montes (P04) se diferenciando do ponto P06 (captação de água no rio Jaguari), o qual apresentou a menor riqueza de táxons.

Ocorreram agrupamentos dos pontos com riqueza de táxons semelhantes, os pontos P02 (corpo principal do reservatório) e P07 (afluente represado do rio Jaguari) apresentaram as maiores riquezas de táxons. Conforme já mencionado nas últimas campanhas foi observado que o ponto P02 está se tornando ambiente propício para o desenvolvimento de macrófitas aquáticas assim como o ponto P07 que está localizado em um corpo hídrico represado, constituindo um sistema tipicamente lântico. Os pontos P01 e P03, localizados no rio Jaguari, se agrupam por possuírem riquezas intermediárias, além de cinco espécies em comum, entre as quais as flutuantes livres *Eichhornia crassipes* e *Salvinia herzogii*. Os pontos P04 (córrego Entre-Montes) e P05 (rio Jaguari) apresentaram dois táxons restritos a eles (*Cuphea calophylla* e *Commelina diffusa*).

Um padrão diferente ocorreu na terceira (junho/2019), na quinta (outubro/2019), na sexta (junho/2020) e na décima campanha (junho/2021), com agrupamento dos pontos localizados no rio Jaguari se diferenciando dos pontos situados em seus afluentes.



Coeficiente cofenético = 0,7386.

4 - Similaridade de Macrófitas Aquáticas – Barragem Pedreira – 14°C (Outubro/22).

– Evolução dos principais indicadores

O total de táxons de macrófitas aquáticas registrado na última campanha (75 táxons) foi superior ao detectado em todas as coletas pretéritas, dentre as quais a riqueza máxima era de 61 táxons registrada em fevereiro e junho de 2021. Através da análise temporal é possível observar uma diminuição da riqueza de macrófitas no período seco e aumento no período chuvoso.

No geral, as famílias Cyperaceae e Poaceae apresentaram maior representatividade em termos de riqueza na maioria das campanhas nos ambientes avaliados e nas últimas coletas a família Asteraceae também tem se destacado. Em todas as amostragens, a maioria das espécies de macrófitas aquáticas identificadas possui ampla distribuição no Brasil e é nativa, não tendo sido observada a presença de espécies exóticas. As espécies *Ludwigia myrtifolia* e *Polygonum diospyrifolium* são consideradas endêmicas do Brasil. A espécie *Hypericum mutilum* é considerada vulnerável (VU) na lista vermelha da flora de São Paulo (SMA-SP, 2016) e na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2022). Nenhuma espécie é considerada rara ou descrita nas listas da Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) e da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Selvagens (CITES).

Em relação às formas biológicas, detectou-se predomínio de anfíbias seguidas das emergentes na maioria das campanhas, sendo excessão a quarta campanha (junho/2019) que se manteve uma proporção equivalente destes grupos (44%, cada), e a sétima, oitava e nona campanha (junho e outubro/2020 e fevereiro/2021) que obteve-se 86% tanto de anfíbias quanto de emergentes.

Em termos de frequência, a maioria dos exemplares registrada apresenta ocorrência esporádica na rede amostral, no conjunto das 14 campanhas realizadas, sendo 12 espécies classificadas como frequentes (entre 50 e 80%) conforme detalhado no **Quadro 4.5-4**. Apenas na décima primeira campanha (outubro/2021) houve registro de uma espécie muito frequente com ocorrência superior a 80% (*Ludwigia octovalvis*).

Os exemplares observados apresentaram baixo grau de cobertura, sem táxons dominantes em todas as campanhas, indicando assim um equilíbrio nessa comunidade. Foi observado um padrão do aumento da área de cobertura de espécies flutuantes livres nos pontos localizados no rio Jaguari aumentando no período seco (junho/2020, junho/2021, junho/2022) e diminuindo no período chuvoso (outubro/2020, fevereiro/2021, outubro/2021 e fevereiro/2022, outubro/2022), relacionado ao aumento e diminuição da correnteza do rio Jaguari entre os períodos chuvoso e seco, respectivamente.

Destaca-se que, nos segmentos monitorados no rio Jaguari e contribuintes, todas as espécies apresentaram baixas frequências e coberturas, em todas as campanhas, pois apenas um táxon apresentou frequência acima de 80% e nenhum registrou cobertura acima de 75% (índice 5).

Porém, cabe destacar que desde a décima segunda campanha (fevereiro/2022) até a última (outubro/2022) tem sido observado um aumento da riqueza e da área de cobertura de macrófitas flutuantes livres e fixa no ponto P02 (corpo principal do futuro reservatório, próximo a barragem), o qual está se tornando local propício ao desenvolvimento de macrófitas aquáticas, com zona

litorânea e baixa correnteza, merecendo assim atenção ao manejo das espécies com potencial de infestação a fim de evitar problemas para a operação do empreendimento.

No **Quadro 4.5-4** consta a evolução espaço-temporal da riqueza de espécies de macrófitas aquáticas, o valor máximo do índice de cobertura verificado e as espécies mais frequentes em cada campanha de monitoramento entre junho de 2018 e outubro de 2022.

Quadro 4.5-4. Síntese dos Indicadores das Macrófitas Aquáticas – Barragem Pedreira – 1ª a 14ªC (Junho/18 a Outubro/22).

Indicadores	Períodos	Rio Jaguari					Córrego Entre-Montes	Afluente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
Riqueza Específica (nº de táxons)									
C1	jun/18	2	7	6	5	7	7	13	30
C2	out/18	2	5	6	6	6	7	7	24
C3	fev/19	5	10	13	5	8	8	14	42
C4	jun/19	0	6	0	2	6	3	NA	16
C5	out/19	6	9	11	6	7	10	9	36
C6	fev/20	2	17	5	4	9	12	NA	37
C7	jun/20	1	9	15	8	7	7	15	42
C8	out/20	7	10	3	13	9	8	5	32
C9	fev/21	0	9	7	9	8	12	5	40
C10	jun/21	3	8	4	3	9	6	4	28
C11	out/21	12	14	18	13	12	6	12	54
C12	fev/22	5	8	27	18	16	13	17	61
C13	jun/22	7	17	27	14	9	6	14	61
C14	out/22	12	20	28	9	11	15	22	75
Índice Máximo de Cobertura									
C1	jun/18	R	R	R	1	2	2	2	NA
C2	out/18	R	R	1	R	2	1	1	
C3	fev/19	1	1	1	R	2	2	2	
C4	jun/19	-	2	-	R	2	3	NA	
C5	out/19	R	R	R	R	1	1	2	
C6	fev/20	R	2	2	1	2	2	NA	
C7	jun/20	2	1	2	1	1	1	R	
C8	out/20	R	1	R	2	1	1	R	
C9	fev/21	-	1	R	R	1	1	R	
C10	jun/21	1	R	1	R	2	2	R	
C11	out/21	R	1	1	2	1	2	R	
C12	fev/22	R	R	2	1	1	2	2	
C13	jun/22	2	1	2	1	2	1	2	
C14	out/22	1	R	3	R	1	2	2	
Táxons frequentes (entre 50 e 80%)									
C1	jun/18	<i>Ludwigia octovalvis</i> e <i>Polygonum punctatum</i>							
C2	out/18	Ausente							
C3	fev/19	<i>Urochloa adspersa</i>							
C4	jun/19	Ausente							
C5	out/19	<i>Pistia stratiotes</i> e <i>Polygonum punctatum</i>							
C6	fev/20	<i>Ipomoea cairica</i> e <i>Salvinia herzogii</i>							
C7	jun/20	<i>Pistia stratiotes</i>							
C8	out/20	<i>Pistia stratiotes</i> , <i>Salvinia herzogii</i> e <i>Ipomoea cairica</i>							

Indicadores	Períodos	Rio Jaguari					Córrego Entre- Montes	Afluente do Rio Jaguari	Total
		P01	P05	P02	P03	P06	P04	P07	
C9	fev/21	Ausente							
C10	jun/21	<i>Pistia stratiotes</i> e <i>Salvinia</i> sp.							
C11	out/21	<i>Pistia stratiotes</i> , <i>Salvinia</i> sp., <i>Eichhornia crassipes</i> e <i>Eclipta prostrata</i> .							
C12	fev/22	<i>Ipomoea cairica</i> , <i>Pistia stratiotes</i> , <i>Eichhornia crassipes</i> , <i>Ludwigia elegans</i> , <i>L. octovalvis</i> , <i>Polygonum punctatum</i> e <i>Urochloa brizantha</i>							
C13	jun/22	<i>Urochloa brizantha</i>							
C14	out/22	<i>Eclipta prostrata</i> , <i>Eichhornia crassipes</i> , <i>Ipomoea cairica</i> e <i>Urochloa brizantha</i>							

Legenda: R = pequena e rara. 1 = esporádica, com indivíduos de pequeno porte. 2 = Rala, com poucos indivíduos. 3 = Dispersa, com numerosos indivíduos. NA= Não se aplica ou não amostrado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seguir, descrevem-se os principais resultados obtidos na avaliação de cada uma das comunidades avaliadas na campanha mais recente do monitoramento da biota aquática, realizada na etapa de implantação do empreendimento, na transição do período seco para o chuvoso (outubro/2022).

5.1. Fitoplâncton

A avaliação da comunidade fitoplanctônica, na décima quarta campanha, resultou no registro de 62 táxons no conjunto de pontos monitorados no rio Jaguari, no seu afluente represado e no córrego Entre-Montes. Verificou-se maior riqueza de diatomáceas da classe Bacillariophyceae, seguidas por Conjugatophyceae e Mediophyceae, as quais são componentes comuns do plâncton de ecossistemas aquáticos continentais.

Em termos de frequência se sobressaíram as bacilariofíceas *Cymbella* sp1. e *Navicula* sp1., além do exemplar não identificado de criptofíceas (Cryptophyceae), observados em todos os locais monitorados, o que evidencia alta adaptabilidade destas algas às condições ambientais locais. No conjunto dos táxons fitoplanctônicos, não foi registrada a ocorrência de espécies exóticas.

A análise quantitativa indicou que a densidade do fitoplâncton se manteve reduzida na maioria dos locais avaliados no rio Jaguari e no córrego Entre-Montes, o que representa um padrão comum em sistemas aquáticos lóticos, devido principalmente à turbulência das águas e à pequena concentração de nutrientes tipicamente verificadas nestes ambientes. Contudo, no afluente represado do rio Jaguari (P07), a densidade foi elevada.

Houve dominância da classe Cryptophyceae, na totalidade dos pontos do rio Jaguari. As criptofíceas são consideradas oportunistas, aumentando sua densidade quando a das demais algas decrescem. Oliveira & Calheiros (2000) associaram a dominância de Cryptophyceae às condições adversas para o desenvolvimento de algas de outros grupos, como baixa disponibilidade de nutrientes.

No afluente represado rio Jaguari, o padrão de dominância se alterou e nestes ocorreu dominância de Mediophyceae, com destaque de *Thalassiosira* sp1.

A densidade de células de cianobactérias atendeu ao padrão estipulado pela Resolução CONAMA 357/05, em todos os pontos, condição verificada também nas amostragens pretéritas deste programa. Esse resultado constitui um aspecto positivo, considerando que esse grupo possui táxons produtores de cianotoxinas, que podem acarretar prejuízos à biota aquática e à qualidade da água destinada ao abastecimento público, quando presentes em grandes quantidades. Esse grupo esteve ausente nas amostras quantitativas dos pontos P01, P02 e P06 do rio Jaguari, do

córrego Entre-Montes (P04), e no afluente represado do rio Jaguari (P07), atingindo o máximo de 10 cél./mL no ponto P03 do rio Jaguari.

A barragem particular (P07) representou o local de menor diversidade da malha amostral, enquanto o maior valor foi registrado no rio Jaguari (P06), em comparação aos demais pontos. A equitabilidade foi baixa ($<0,5$), apenas no ponto do P07, tendo a maioria dos pontos valores superiores a 0,6.

A análise dos padrões de similaridade apontou nível baixo de semelhança entre a comunidade amostrada na décima quarta campanha. O cluster principal, formado pela maioria dos pontos do rio Jaguari (P01, P02, P03 e P05) e o córrego Entre-Montes (P04), sobretudo entre os pontos P02 e P05, sendo esse resultado influenciado pela elevada abundância de Cryptophyceae. O ponto P06 se diferenciou principalmente devido à menor densidade de organismos amostrados, composta sobretudo por baclariófocias. O afluente represado do rio Jaguari (P07) também esteve distinto, em função das maiores densidades e baixa similaridade aos demais pontos amostrais.

Cabe apontar que mesmo os pontos no rio Jaguari que são potencialmente mais afetados pelas obras do empreendimento (P02 e P03) apresentaram elevada similaridade com o ponto P01, situado a montante das obras, o que denota que não foram observadas interferências relevantes no fitoplâncton que possam ser associadas diretamente ao empreendimento.

5.2. Zooplâncton

A análise qualitativa do zooplâncton, em outubro de 2022, apontou a ocorrência de 38 táxons no cômputo das amostras obtidas no rio Jaguari, no seu afluente represado da margem esquerda e no córrego Entre-Montes. A comunidade zooplancônica foi predominantemente composta por rotíferos, seguidos de protozoários e microcrustáceos Cladocera, o que constitui um resultado comum em ecossistemas aquáticos dulcícolas.

Do conjunto de táxons, apenas o protozoário *Arcella* sp1 foi registrado em 100% das amostras, sendo considerados muito frequentes. Adicionalmente, se destacaram em termos de frequência o protozoário *Centropyxis* cf. *aculeata* estando presentes em 86% dos locais monitorados.

Durante a presente campanha, não foram identificadas espécies exóticas e tampouco espécies consideradas ameaçadas a nível estadual e federal.

Em termos quantitativos, a maior densidade foi verificada no afluente represado do rio Jaguari (P07), em função da abundância de copépodos calanóides, principalmente pela contribuição dos náuplios.

Em todos os pontos do rio Jaguari, houve predomínio de protozoários, o que é indicativo do aporte de material alóctone, o que propicia que espécies oportunistas dos protozoários utilizem rapidamente os recursos disponíveis e atinjam um aumento de densidade. Os exemplares mais abundantes foram o gênero *Centropyxis* e as espécies *Diffugia* sp e *Lecane* sp. Estes gêneros estão entre os protozoários de maior ocorrência nos ambientes aquáticos continentais (LANSAC-TÔHA *et al.*, 2000) e, segundo Silva *et al.* (2020), são comuns em ambientes com elevada taxa de matéria orgânica.

A diversidade do zooplâncton foi mais elevada córrego Entre-Montes (P04), enquanto o menor valor foi obtido no rio Jaguari (P05), a jusante do córrego Entre-Montes, onde também se observou a menor equitabilidade, resultado que foi influenciado principalmente pela menor riqueza, densidade e abundância apresentada durante a campanha. Nos pontos sob maior influência das obras de implantação da barragem (P02 e P03), a diversidade esteve em torno de 1,5 bits.ind-1, sendo próxima ao trecho sem influência da obra (P01).

Os resultados do índice de Bray-Curtis demonstram uma acentuada diferença entre a comunidade do ambiente lêntico (P07) e a dos demais pontos lóticos. Entre estes há certo grau de heterogeneidade nos padrões de distribuição espacial e de abundância do zooplâncton, com maior semelhança entre os pontos P05 e P06, no rio Jaguari. De maneira geral, não foram encontradas alterações relevantes nesta comunidade que possam ser diretamente atribuídas às obras do empreendimento.

5.3. Invertebrados Bentônicos

Na décima quarta campanha de monitoramento, na transição do período seco para o chuvoso, foi registrado um total de 41 táxons de invertebrados bentônicos, com maior riqueza das larvas de insetos, seguidas de moluscos e anelídeos. Dentre os insetos, o grupo mais especioso foi o dos dípteros quironomídeos, que possuem táxons mais tolerantes às alterações ambientais. Porém, também foram identificados táxons de insetos considerados sensíveis às perturbações ambientais, como os efemerópteros e tricópteros.

Dos táxons registrados, nenhum exemplar ocorreu em todos os locais amostrados. Os táxons considerados muito frequentes (86%) os anelídeos da família Glossiphoniidae e os oligoquetos da família Naididae (com e sem queta capilar), além dos dípteros não identificados da família Chironomidae e os dípteros *Polypedilum* sp. (tribo Chironomini). Foram classificados como frequentes as larvas dos dípteros os dípteros não identificados da tribo Tanytarsini, além dos exemplares de *Chironomus* sp., *Nanocladius* sp., *Ablabesmyia* sp. e *Labrundinia* sp.

Os valores de riqueza específica da comunidade bentônica no rio Jaguari variaram de um mínimo de 6 táxons (P06) a 18 táxons (P05). No córrego Entre-Montes (P04), foi observada riqueza de sete táxons, enquanto que na barragem particular (P07) foram computados 23 táxons.

Na análise quantitativa, observou-se que a densidade dos invertebrados bentônicos foi variável entre os pontos de amostragem, sendo as maiores densidades obtidas no rio Jaguari, a jusante do córrego Entre-Montes (P05).

As larvas de insetos foram as abundantes na maioria dos pontos do rio Jaguari, exceto em P03 e P06 os quais apresentaram as maiores densidades para anelídeos Hirudinea e Oligochaeta. No córrego Entre-Montes (P04), as maiores densidades foram reportadas também para as larvas de díptera, sobretudo os exemplares da tribo Tanytarsini. No afluente represado do rio Jaguari (P07), da mesma forma, os insetos foram o grupo mais abundante, devido principalmente à *Caladomyia* sp.

A maior diversidade foi observada no ponto P07, no afluente barrado, devido à elevada dominância de um único táxon (*Caladomyia* sp). A equitabilidade se mostrou superior a 0,7 na maioria dos pontos da malha amostral, exceto nos pontos P02 e P05 do rio Jaguari.

O índice de Bray Curtis indicou baixo nível de semelhança entre a maioria dos pontos (<40%), tendo maior similaridade entre os pontos P03 e P06 do rio Jaguari. De acordo com os critérios aplicados no Índice da Comunidade Bentônica - ICB, os locais avaliados nessa campanha apresentaram qualidade Boa e Ótima na maioria dos pontos, com exceção apenas do ponto P06 (Regular).

5.4. Macrófitas Aquáticas

Na décima quarta campanha de monitoramento da Barragem Pedreira, realizada em outubro de 2022, no período de transição do seco para chuvoso, foram registrados 75 táxons de macrófitas aquáticas nos segmentos monitorados no rio Jaguari, no córrego Entre-Montes e no afluente represado do rio Jaguari. As formas biológicas mais comuns nesta última campanha foram a anfíbia e a emergente, padrão recorrente em sistemas aquáticos tropicais e em amostragens pretéritas deste programa de monitoramento.

As espécies mais frequentes foram *Eclipta prostrata*, *Eichhornia crassipes*, *Ipomoea cairica* e *Urochloa brizantha*, que correspondem macrófitas consideradas infestantes na literatura. Apesar de ser verificada a presença de espécies infestantes e daninhas nos rios monitorados, as áreas de cobertura dos táxons de macrófitas aquáticas nos pontos de coleta não foram extensas, ou seja, os exemplares observados apresentaram baixo grau de cobertura, sem táxons dominantes, indicando assim um equilíbrio nessa comunidade. Porém, cabe destacar que o ponto P02 (próximo à barragem) está se tornando local propício ao desenvolvimento de macrófitas aquáticas merecendo

assim atenção ao manejo das espécies com potencial de infestação, principalmente flutuantes livres entre elas a *Eichhornia crassipes* (aguapé), a qual vem apresentando aumento da área de cobertura nas últimas campanhas.

A maioria das espécies de macrófitas aquáticas registrada possui ampla distribuição no Brasil e é nativa não tendo sido observada a presença de espécies exóticas. *Ludwigia myrtifolia* e *Polygonum diospyrifolium* são consideradas endêmicas do Brasil, mas nenhuma espécie é endêmica do local de estudo. A espécie *Hypericum mutilum* registrada na décima quarta campanha (outubro/2022) é considerada vulnerável (VU) na lista vermelha da flora de São Paulo (SMA-SP, 2016) e na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2022).

De forma geral os resultados obtidos nessa campanha são similares aos das amostragens anteriores deste programa de monitoramento, apresentando apenas um aumento de riqueza total e pontual principalmente no ponto P02, além do um leve aumento da área de cobertura das espécies *Eichhornia crassipes* (aguapé) e *Myriophyllum aquaticum* (pinheirinho d'água) nesse mesmo ponto, estando relacionados à formação de zona litorânea com baixa correnteza da água.

6. EQUIPE TÉCNICA

No **Quadro 6-1**, a seguir, são apresentados os membros da equipe técnica que atuaram na avaliação da biota aquática.

Quadro 6-1. Equipe Técnica – Barragem Pedreira.

Equipe técnica	Formação	Registro profissional	Atuação no projeto
Vilma Maria Cavinatto Rivero	Bióloga. Msc em Ecologia	CRBio: 06912-01	Responsável técnica
Josefa Oliveira dos Santos	Tecnóloga em Gestão Ambiental	CRQ: 04265303	Elaboração do relatório técnico
Paula Rocha Aguiar	Bióloga	CRBio: 82979/01-D	Análise do fitoplâncton
Thais Vitti	Bióloga. Msc em Ecologia	CRBio: 100498/01-D	Análise do zooplâncton
Cristiane Midori Suga	Bióloga. Msc em Ecologia e Recursos Naturais	CRBio: 89905/01-D	Análise dos invertebrados bentônicos
Leny Célia da Silva Correia	Bióloga. Dra em Ciências - Área de Concentração, Ecologia e Recursos Naturais	CRBio: 86499/01-D	Análise dos invertebrados bentônicos
Maria Estefânia Fernandes Rodrigues	Bióloga. Msc em Ciências Biológicas (Botânica)	CRBio: 082208/01	Análise das macrófitas aquáticas e elaboração do relatório técnico
Camila Regis Segala	Bióloga. Msc em Pesca e Aquicultura.	CRBio: 132306/01-D	Elaboração do relatório técnico

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

No **Quadro 7-1**, apresentado na sequência, consta o cronograma de atividades já realizadas e previstas para o Programa de Monitoramento da Biota Aquática da Barragem Pedreira.

Quadro 7-1. Cronograma de atividades – Barragem Pedreira.

Atividades	CRONOGRAMA																																				
	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21		
Campanha de amostragem preliminar	█																																				
Relatório Preliminar		█																																			
Campanha de amostragem						█				█				█				█				█					█										█
Relatório da Campanha						█					█				█				█				█					█									█
Relatório Consolidado Final																																					

Atividades	CRONOGRAMA									
	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Campanha de amostragem preliminar										
Relatório Preliminar										
Campanha de amostragem			█				█			
Relatório da Campanha				█					█	█
Relatório Consolidado Final										
Atividades já realizadas										
Atividades previstas										

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, M.C.E., BITTRICH, V., FARIA, A.D., ANDERSON, L.O.; AONA, L.Y. **Guia de campo para plantas aquáticas e palustres do Estado de São Paulo**. 1. ed. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2008. v. 1. 452 p.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA. **Standard methods for the examination of water and wastewater - 22^a ed.** Washington: APHA / AWWA / WEF, 2012.

APG III. Angiosperm Phylogeny Group III. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society**. v. 161, p. 105-121, 2009.

BARROSO, G. M. E. A. **Sistemática de angiospermas do Brasil**. Viçosa: UFV, 2 e 3, 1991.

BARROSO, G. M. E. A. **Sistemática de angiospermas do Brasil**. Viçosa: UFV, 1, 2008.

BICUDO, C. E. M.; MENEZES, M. 2006. **Gênero de Algas de águas Continentais do Brasil: chave para identificação e descrição**. 2^a edição. Ed. Rima.

BOVE, C.P. & PAZ, J. 2009. **Guia de campo das plantas aquáticas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba**. Série livros 35. Museu Nacional, Rio de Janeiro. 175p

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA. **Resolução nº 357 de 17 de março de 2005**. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Publicada no Diário Oficial da União nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63. Brasília, 2005.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH. **Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003** - Divisão Hidrográfica Nacional. Brasil, 2003.

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO. **Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025**. Acreditação de Laboratórios. 2005.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/2017**. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais no Brasil**. Brasília: MMA/SBF. 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Portaria nº 445, de 17/12/2014.** Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos. 2014.

BRAUN-BLANQUET, J.; FULLER, G. D.; CONARD, H. S. **Plant sociology; the study of plant communities.** 1st. New York, London, : McGraw-Hill book company, inc., xviii, 439 p. 1932.

BREMER *et al.* APG III. **Angiosperm Phylogeny Group III. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III.** Botanical Journal of the Linnean Society. v. 161, p. 105-121, 2009.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). **Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo – 2019.**

CHAPMAN, P. M. 2001. **Utility and relevance of aquatic oligochaetes in ecological risk assessment.** Hydrobiologia, 463: 149–169. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1013103708250>

CNCFlora. *Hypericum mutilum* in **Lista Vermelha da flora brasileira** versão 2012.2 Centro Nacional de Conservação da Flora. Disponível em <[http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Hypericum mutilum](http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Hypericum_mutilum)>. Acesso em 15 novembro 2022.

COESEL, P.F.M. 1982. Structural characteristics and adaptations of desmid communities. **Journal of Ecology** 70:163-177. Pryer *et al.* 2001

COFFMAN, W. P.; FERRINGTON JR, L. C. Chironomidae. In Meritt, R. W.; K. W. Cummins (eds), **An Introduction to the Aquatic Insects of North America, Third Edition.** Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, IW: 635-643, 1996.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. **Guia Nacional de coleta e preservação de amostras:** água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011.

COOK, C. D. K. 1996. **Aquatic plant book.** The Hague: SPB Academic Publishing.

COOK, C. D. K. 1999. The number and kinds of embryo-bearing plants which have become aquatic: a survey. **Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics**, v. 2, n. 1, p. 79-102.

DORNFELD, C.B.; ALVES, R.G.; LEITE, M.A.; ESPÍNDOLA, E.L.G. Oligochaeta in eutrophic reservoir: the case of Salto Grande reservoir and their main affluent (Americana, São Paulo, Brazil). **Acta Limnol. Bras.**, 18(2):189-197, 2006.

EPLER, J. H. 1992. **Identification manual for the larval Chironomidae (Diptera) of Florida.** Florida Department of Environmental Protection, 427p.

ESTEVES, F.A.; AMADO, A.M. 2011. **Nitrogênio.** In: Fundamentos de limnologia. Esteves F.A. - coordenador, 3ª. Ed, Rio de Janeiro, Interciência, pp. 239-258.

FLORA DO BRASIL. **Jardim Botânico do Rio de Janeiro**. Disponível em: < <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> > 2020.

GOETGHEBEUR, P. CYPERACEAE. IN: KUBITZKI, K. *ET AL.* (ED.) **The families and genera of vascular plants**. Berlin: Spreng-Verlag. p. 141-190, 1998.

GOMAA, F.; TODOROV, M.; HEGER, T. J.; MITCHELL, E. A. D.; LARA, E. 2012. **SSU rRNA Phylogeny of Arcellinida (Amoebozoa) Reveals that the Largest Arcellinid Genus, Diffugia Leclerc 1815, is not Monophyletic**. 163(3), 389–399.

GORNI, G. R. & ALVES, R.G. 2007. **Naididae (Annelida, Oligochaeta) associated with briophytes in Brotas, State of São Paulo, Brazil**. Rev. Bras. Zool. 24(.2): 518-519.

GORNI, G. R. & ALVES, R. G. 2015. **Influência de variáveis ambientais sobre a comunidade de oligoquetos (Annelida: Clitellata) em um córrego neotropical**. Biotemas, 28(1), 59-66.

GUIRY, M.D. **Taxonomy and nomenclature of the Conjugatophyceae (= Zygnematophyceae)**. Algae, 28(1): 1-29. 2013.

HENRY, R. (Ed.). **Ecologia de reservatórios: Estrutura, função e aspectos sociais**. Botucatu: FUNDIBIO; FAPESP, 1999.

HIDROSTUDIO ENGENHARIA; THEMAG ENGENHARIA; DAEE (Departamento De Águas E Energia Elétrica). **Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA das Barragens Pedreira e Duas Pontes**. São Paulo. 2015.

HOEK, C. V. D.; MANN, D. G.; JAHNS, H. M. In: **Algae: An introduction to phycology**. p. 133-152, 1995.

IRGANG, B. E.; GASTAL JR, C. V. D. S. **Macrófitas aquáticas da planície costeira do RS**. 1a. Porto Alegre: [s.n.] (edição dos autores) 260 p. 1996.

IRGANG, B. E.; PEDRALLI, G.; WAECHTER, J. I. **Macrófitas aquáticas da Estação Ecológica do Taim. Roessleria**, v. 6, p. 395-404, 1984.

ISAKSSON, A. 1998. **Phagotrophic phytoflagellates in lakes - a review**. Archives fur Hydrobiologie Special Issues Advances in Limnology 51:63-90.

KISSMANN, K. G. 1997. **Plantas infestantes e nocivas**. 2. São Paulo: BASF, Tomol.

KISSMANN, K. G. 2000. **Plantas infestantes e nocivas**. Tomo III, 2ª ed. São Paulo: Basf, 722p.

KISSMANN, K. G.; GROTH, D. **Plantas infestantes e nocivas**. 2. São Paulo: BASF, Tomo II, 1999. 978p

KLAVENESS, D. 1988. **Ecology of the Cryptomonadida: a first review**. In **Growth and reproductive strategies of freshwater phytoplankton** (C.D. Sandgren, ed.). Cambridge University Press, Cambridge, p.103-133.

KOPP, M. M.; SOUZA, V. Q.; COIMBRA, J. L. M.; LUZ, V. K.; MARINI, N.; OLIVEIRA, A. C. **Melhoria da correlação cofenética pela exclusão de unidades experimentais na construção de dendogramas.** Rev. Fac. Zoo. Vet. e Agr. 14(2):46-53. 2007.

KOSTE, W., 1978. **Rotatoria Die Rodertiere Mitteleuropas begründet von Max Voigt – Monogononta.** 2. Auflage neubearbeitet von Walter Koste. Gebrüder Borntraeger, 1: 238.

LANSAC-TÔHA, F.; BONECKER, C.C.; VELHO, L.F.M.; LIMA, A.F. Composição, distribuição e abundância da comunidade zooplanctônica. In: Vazzoler, A.E.A.M.; Agostinho, A.A.; Hahn, N.S. (eds). **A planície de inundação do Alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos.** Maringá: EDUEM: Nupelia, p. 117-156. 1997.

LANSAC-TÔHA, F.; VELHO, L.F.M.; BONECKER, C.C.; AOYAGUI, A.S.M. **Horizontal distribution of testate amoebae (Rhizopoda, Amoebozoa) in plankton samples of the Corumbá reservoir area, state of Goiás, Brazil.** Acta Scientiarum, v. 22, n. 2, p. 347- 353, 2000.

LORENZI, H. & MATOS, F.J.A. 2008. **Plantas Medicinais no Brasil:** nativas e exóticas. 2ª ed. Nova Odessa, Instituto Plantarum.

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. **Plantas Medicinais no Brasil:** nativas e exóticas cultivadas. Nova Odessa, Instituto Plantarum, 2002.

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. **Plantas Ornamentais no Brasil:** Arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 3.Ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2001.

LUCINDA, I. 2003. **Composição de Rotifera em corpos d'água na bacia do rio Tietê-SP, Brasil.** Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) - Universidade Federal de São Carlos- SP. 182 f.

LUND, J.W.; KIPLING, C.; LE CREN, D. The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimation by counting. **Hydrobiologia**, 11: 143-170p. 1958.

MATSUMURA-TUNDISI, T. 1999. **Diversidade de zooplâncton em represas do Brasil.** In: R. Henry (ed.) Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu: FUNDIBIO, FAPESP. 799p.

MERRITT, R.W.; CUMMINS, K.W. **An introduction to the aquatic insects of North America.** 2ed. Dudaque, Iowa, Kendall/Hunt, 1984. 722p.

MMA. 2018. **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção:** Volume VII, Invertebrados, 1. ed. Brasília, DF. 727p.

MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. **Aims and methods of vegetation ecology.** New York: Wiley, 1974. xx, 547 p.

OLIVEIRA, F. R. **Chironomidae (Diptera) em córregos de baixa ordem em áreas florestadas do Estado de São Paulo, Brasil**. São Carlos, 2005.

OLIVEIRA, M.D. & CALHEIROS, D.F. 2000. Flood pulse influence in phytoplankton communities of the south Pantanal floodplain, Brazil. **Hydrobiologia** 427:101-112.

PAGGI, J. C; JOSE DE PAGGI, S. Zooplâncton de ambientes lóticos e lênticos do rio Paraná médio. Brasil: **Acta Limnol.**, v. 3, p. 685-719.1990.

PARESCHI, D.C. **Macroinvertebrados Bentônicos como Indicadores da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré (SP)**. São Carlos, 2008.

PATRO, R. **Trombeteiro – Brugmansia suaveolens** . Jardineiro.net . 2013.

PENNAK, R. W. 1978. **Fresh water invertebrates of the United States**. New York, Wiley Interscience. 803p.

PEREIRA, A. P. S.; VASCO, A. N.; BRITTO, F. B.; MÉLLO-JÚNIOR, A. V.; NOGUEIRA, E. M. S. 2011. **Biodiversidade e estrutura da comunidade zooplanctônica na Sub bacia Hidrográfica do Rio Poxim, Sergipe, Brasil**. Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, v. 6, n. 2.

POTT, V. J.; POTT, A. **Plantas aquáticas do Pantanal**. 1a. Brasília, DF: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia, 2000. 404 p.

PRYER, K. M., H. SCHNEIDER, A. R. SMITH, R. CRANFILL, P. G. WOLF, J. S. HuNT, AND S. D. SIPEs. 2001a. Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants. **Nature** 409: 618- 622.

REGALI-SELEGHIM M. H.; GODINHO M. J. L.; MATSUMURA-TUNDISI T. 2011. **Checklist dos "protozoários" de água doce do Estado de São Paulo, Brasil**. Biota Neotrop. vol.11, suppl.1, pp. 389-426. ISSN 1676-0603. Disponível em: [Http://www.Biotaneotropica.Org.Br/V11n1a/En/Abstract?l](http://www.Biotaneotropica.Org.Br/V11n1a/En/Abstract?l).

ROBERTSON, A. L.; LANCASTER, J.; HILDREW, A. G. Stream hydraulics and the distribution of microcrustacea: a role for refugia? **Freshwater Biology**, v. 33, p. 469-484, 1995.

ROBERTSON, B. A.; HARDY, E. R. Zooplankton of Amazonian lakes and rivers. In: SIOLI, H. (Ed.). **The Amazon: Limnology and Landscape**. Ecology of a Mighty tropical river and its basin. Monographiae biologicae: Junk Publishers, Bostons, p. 337-352. 1984.

ROHLF, F.J. Adaptive hierarchical clustering schemes. **Systematic Zoology**, v.19, n.1, p.58-82, 1970.

ROLDÁN, G. 1992. **Fundamentos de Limnología Neotropical**. Edit. Universidad de Antioquia. Medellín. 529p.

ROLDÁN-PÉREZ, G. La bioindicacion de la calidad del agua en Colombia..Editorial Universidad del Antioquia, Medellín, 2003. 170p. ROSSARO B. 1991. **Factors that determine Chironomidae species distribution in fresh waters.** B. Zool. 58: 281-286.

ROUND, F. E.; CRAWFORD, R. M.; MANN, D. G. 1990. **The diatoms: biology and morphology of the genera.** Cambridge: Cambridge University. 653p.

RUTISHAUSER, R. 2010. **APG III: Families (and genera) with hydrophytes.** Versão 13. Compiled from Cook 1999, Maberly 2008, APG 2009. Zürich, Switzerland: Universität Zürich: 1 p.

SANT'ANNA, C.L.; TUCCI, A.; AZEVEDO, M.T.P.; MELCHER, S.S.; WERNER, V.R.; MALONE, C.F.S.; ROSSINI, E.F.; JACINAVICIUS, F.R.; HENTSCHEKE, G.S.; OSTI, J.A.S.; SANTOS, K.R.S.; GAMA-JÚNIOR, W.A.; ROSAL, C.; ADAME, G. 2012. **Atlas de cianobactérias e microalgas de águas continentais brasileiras. Publicação eletrônica, Instituto de Botânica, Núcleo de Pesquisa em Ficologia.** Disponível em: www.ibot.sp.gov.br.

SÃO PAULO. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA. **Decreto Estadual nº 63.853**, de 27 de novembro de 2018: declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. São Paulo, 2018.

SCHNEIDER, S. A contribuição da pluriatividade para as políticas públicas de desenvolvimento rural: um olhar a partir do Brasil. In: **ARCE**, Alberto. (forthcoming), Ed. Flacso, 2007.

SCHWIND, L. T. F.; DIAS, J. D.; JOKO, C. Y.; BONECKER, C. C.; LANSAC-TÔHA, F. A. Advances in studies on testate amoebae (Arcellinida and Euglyphida): a scientometric approach. **Acta Scientiarum.** Biological Sciences. Maringá, v. 35, n. 4, p. 549-555, 2013.

SCHWIRKOWSKI, P. **Projeto de pesquisa da vegetação nativa do município de São Bento do Sul** - Santa Catarina. 31p. 2009.

SILVA, L.H.S. Fitoplâncton de um reservatório eutrófico (Lago Monte Alegre). **Revista Brasileira de Biologia** 59: 281-303. 1999.

SMA (Secretaria De Meio Ambiente) 2013. Resolução nº 100, de 17 de outubro de 2013. **Regulamenta as exigências para os resultados analíticos, incluindo-se a amostragem, objeto de apreciação pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA.** Processo CETESB nº 98/2012/310 E. Republicada no DOE de 22-10-2013 seção I pág 41.

SMITH, A. L., *et al.* 2006. **A classification for extant ferns Táxon: International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature.** v. 55, n. 3, p. 705-731.

SMITH, P. D.; KENNEDY, J. H. & DICKSON, L. K. 1991. **An evaluation of a naidid oligochaeteas a toxicity test organism**. Environ. Toxicol. Chem. 10: 1459-1465

SOUZA, L. O. I.; J. M. COSTA & B. B. OLDRINI. 2007. **Odonata. On-line: Identificação de larvas de Insetos Aquáticos do Estado de São Paulo**. Froelich, C.G. (org.).

SOUZA, L. R.; ZACARDI, D. M.; BITTENCOURT, S. C. S.; RAWIETSCH, A. K; BEZERRA, M. F. C. B.; COSTA, S. D.; NAKAYAMA, L. Microfitoplâncton da Plataforma Continental Amazônica Brasileira: Costa do Estado do Amapá- **Brasil. Bol. Téc. Cient. Cepnor, v. 9, p. 115-124, 2009.**

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. **Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II**. Nova Odessa, SP, Brasil: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 3ªed. 2008. 640 p. ISBN 8586714216.

THOMAZ, S. M.; BINI, L. M.; PAGIORO, T. A. **Macrófitas aquáticas em Itaipu: ecologia e perspectivas para o manejo**. In: Thomaz, S. M.; Bini, L. M. (Eds.). **Ecologia e manejo de macrófitas aquáticas**. Maringá: EDUEM, 2003. p. 319-341.

TORRES, V. S. **Amebas testáceas ocorrentes na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. II. Novos registros para a região**. Rev. Bras. Zool., Curitiba, v. 15, no. 2, p. 545-552, 1998.

TORRES-OROZCO, B.R E. & S.A. ZANATTA, 1998. Species composition, abundance and distribution of zooplankton in a tropical eutrophic lake: Lake Catemaco, Mexico. Revista de Biologia Tropical 46: 285–296.

TRIVINHO-STRIXINO, S. A systematic review of Neotropical *Caladomyia* Sæwedal (Diptera: Chironomidae). **Zootaxa**, v. 3495, n. 1, p. 1-41, 2012.

TRIVINHO-STRIXINO, S.; STRIXINO, G. **Larvas de Chironomidae (Diptera) do Estado de São Paulo: guia de identificação de diagnose dos gêneros**. PPG ERN/UFSCar. São Carlos, 1995. 229p.

TUNDISI, J.G., MATSUMURA-TUNDISI, T., HENRY, R., ROCHA, O.; HINO, K. Comparações do estado trófico de 23 reservatórios do estado de São Paulo: eutrofização e manejo. In: Tundisi, J.G. (ed). **Limnologia e Manejo de Represas: Série Monografias em Limnologia, vol1 (Tomo 1) 506p**. 1988.

UTERMÖHL, H. Zur Vervollkommnung der quantitativen phytoplankton-methodic. Mitt. int. **Verein. Limnol.**, v. 9, p. 1-38, 1958.

VALENTIN, J. L. **Ecologia numérica: uma introdução à análise multivariada de dados ecológicos**. Rio de Janeiro: Interciência, 2000.

VÁSQUEZ, E.; REY, J. A longitudinal study of zooplankton along the lower Orinoco River and its Delta (Venezuela). **Annls. Limnol.**, v.28, p.3-18. 1989.

WALL, A.; MAGNY, M.; MITCHELL, E. A. D.; VANNIÈRE, B.; GILBERT, D. 2010. **Response of testate amoeba assemblages to environmental and climatic changes during the Lateglacial–Holocene transition at Lake Lautrey (Jura Mountains, eastern France)**. *J Quat Sci* 25:945–956.

WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.; GIULLIETTI, A. M. 2001. **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. São Paulo: FAPESP/HUCITEC, vol. 1.

WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.; GIULLIETTI, A. M. 2002. **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. São Paulo: FAPESP/HUCITEC, vol. 2.

WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.; MELHEM, T. S.; GIULLIETTI, A. M. 2003. **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. FAPESP/RiMa. São Paulo, vol. 3.

WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.; MELHEM, T. S.; GIULLIETTI, A. M. 2007. **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. Instituto de Botânica. São Paulo, vol. 5.

WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.; MELHEM, T. S.; GIULLIETTI, A. M.; MARTINS, S. E. 2009. **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. Instituto de Botânica. São Paulo, vol. 6.

WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.; GIULLIETTI, A. M. (Coords.) 2005. **Flora fanerogâmica do Estado de São Paulo**. SP: FAPESP-RIMA.

WATSON, L.; DALLWITZ, M. J. 1992. **The grass genera of the World**. C.A.B. Internacional. Wallingford.

WETZEL, R. G. 2001. **Limnology**. Philadelphia, W.B. Sandres, 3° ed. 743 p.

WETZEL, R.G.; LIKENS, G.E. 2000. Composition and Biomass of Phytoplankton. In: Wetzel, R.G. and Likens, G.E., Eds., **Limnological Analyses**, 3rd Edition, Springer, New York, 147-154, 2000.

9. ANEXOS


Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P01	
Código(s) Econsult	6079/22 (qualitativa) e 6086/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 09 h 22 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7476469	Coord. L/O: 305572 Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo		Ensaio Quantitativo	
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Cocconeis</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	0	0	0
Naviculaceae N.I. 1	x	0	0	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Pinnularia</i> sp. 1	x	0	0	0
Conjugatophyceae	-	-	-	-
<i>Closterium</i> sp. 1	x	0	0	0
Coscinodiscophyceae	-	-	-	-
<i>Melosira varians</i>	x	<1	0	0
Cryptophyceae	-	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	x	12	0	0
Cyanophyceae	-	-	-	-
<i>Pseudanabaena</i> sp. 1	x	0	0	0
Dinophyceae	-	-	-	-
<i>Peridinium</i> sp. 1	x	<1	0	0
Euglenophyceae	-	-	-	-
<i>Euglena</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Lepocinclis</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Phacus</i> sp. 1	x	0	0	0

<i>Trachelomonas volvocina</i>	x	0	0
Mediophyceae	-	-	-
<i>Thalassiosira</i> sp. 1	x	<1	0
Trebouxiophyceae	-	-	-
<i>Chlorella</i> sp. 1	x	0	0
Total:	17 táxons	12 org./mL	0 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P02	
Código(s) Econsult	6080/22 (qualitativa) e 6087/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 13 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480588	Coord. L/O: 304659 Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo	
	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	x	<1	0
<i>Cocconeis</i> sp. 1	x	2	0
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	0	0
<i>Gomphonema</i> sp. 1	x	0	0
<i>Gyrosigma</i> sp. 1	x	0	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	2	0
<i>Nitzschia</i> sp. 1	x	1	0
<i>Pinnularia</i> sp. 1	x	0	0
<i>Surirella</i> sp. 1	x	0	0
<i>Ulnaria ulna</i>	x	<1	0
Conjugatophyceae	-	-	-
<i>Closterium</i> sp. 1	x	<1	0
Coscinodiscophyceae	-	-	-
<i>Aulacoseira granulata</i>	x	2	0
<i>Hydrosera whampoensis</i>	x	0	0
<i>Melosira varians</i>	x	1	0
Cryptophyceae	-	-	-
Cryptophyceae N.l. 1	x	10	0
Cyanophyceae	-	-	-
<i>Phormidium</i> sp. 1	x	0	0

<i>Pseudanabaena</i> sp. 1	x	0	0
Mediophyceae	-	-	-
<i>Cyclotella</i> sp. 1	x	0	0
Trebouxiophyceae	-	-	-
<i>Dictyosphaerium</i> sp. 1	x	0	0
Total:	19 táxons	18 org./mL	0 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P03	
Código(s) Econsult	6081/22 (qualitativa) e 6088/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 45 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7481300	Coord. L/O: 304352 Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo		Ensaio Quantitativo	
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Cocconeis</i> sp. 1	x	2	0	0
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Fragilaria</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Gomphonema</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	2	0	0
<i>Nitzschia</i> sp. 1	x	2	0	0
<i>Pinnularia</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Surirella</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Ulnaria ulna</i>	x	0	0	0
Conjugatophyceae	-	-	-	-
<i>Closterium</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Staurastrum rotula</i>	x	0	0	0
Coccinodiscophyceae	-	-	-	-
<i>Aulacoseira granulata</i>	x	<1	0	0
<i>Melosira varians</i>	x	0	0	0
Cryptophyceae	-	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	x	17	0	0
Cyanophyceae	-	-	-	-

<i>Oscillatoria</i> sp. 1	x	0	0
<i>Phormidium</i> sp. 1	x	<1	10
<i>Planktolyngbya</i> sp. 1	x	0	0
Dinophyceae	-	-	-
<i>Peridinium</i> sp. 1	x	0	0
Euglenophyceae	-	-	-
<i>Lepocinclis</i> sp. 1	x	0	0
<i>Phacus</i> sp. 1	x	0	0
Mediophyceae	-	-	-
<i>Terpsinoë musica</i>	x	0	0
Total:	23 táxons	23 org./mL	10 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P04	
Código(s) Econsult	6082/22 (qualitativa) e 6089/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 06 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7478809	Coord. L/O: 304990 Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo	
	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	x	0	0
<i>Amphora</i> sp. 1	x	<1	0
<i>Cocconeis</i> sp. 1	x	3	0
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	0	0
<i>Gomphonema</i> sp. 1	x	0	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	<1	0
<i>Nitzschia</i> sp. 1	x	<1	0
<i>Pinnularia</i> sp. 1	x	0	0
<i>Sellaphora</i> sp. 1	x	0	0
<i>Ulnaria ulna</i>	x	<1	0
Chlorophyceae	-	-	-
<i>Coelastrum microporum</i>	x	0	0
<i>Coelastrum reticulatum</i>	x	0	0
<i>Desmodesmus</i> sp. 1	x	0	0
<i>Monoraphidium arcuatum</i>	x	0	0
<i>Stauridium tetras</i>	x	0	0
Conjugatophyceae	-	-	-
<i>Closterium</i> sp. 1	x	0	0
<i>Cosmarium</i> sp. 1	x	0	0
<i>Cosmarium</i> sp. 2	x	0	0

<i>Hyalotheca dissiliens</i>	x	0	0
<i>Mougeotia</i> sp. 1	x	0	0
<i>Spirogyra</i> sp. 1	x	0	0
<i>Staurastrum</i> sp. 1	x	0	0
<i>Staurodesmus</i> sp. 1	x	0	0
Coccinodiscophyceae	-	-	-
<i>Aulacoseira granulata</i>	x	7	0
<i>Hydrosera whampoensis</i>	x	0	0
<i>Melosira varians</i>	x	0	0
Cryptophyceae	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	x	11	0
Cyanophyceae	-	-	-
<i>Aphanocapsa</i> sp. 1	x	0	0
<i>Komvophoron</i> sp. 1	x	0	0
<i>Merismopedia</i> sp. 1	x	0	0
Dinophyceae	-	-	-
<i>Peridinium</i> sp. 1	x	0	0
Euglenophyceae	-	-	-
<i>Lepocinclis</i> sp. 1	x	0	0
<i>Trachelomonas volvocinopsis</i>	x	0	0
Trebouxiophyceae	-	-	-
<i>Chlorella</i> sp. 1	x	0	0
<i>Dictyosphaerium</i> sp. 1	x	0	0
Total:	35 táxons	21 org./mL	0 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	

Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P05	
Código(s) Econsult	6083/22 (qualitativa) e 6090/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 50 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480084	Coord. L/O: 304897 Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo		Ensaio Quantitativo	
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Amphora</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Cocconeis</i> sp. 1	x	1	0	0
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Eunotia</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Gyrosigma</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Nitzschia</i> sp. 1	x	1	0	0
<i>Pinnularia</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Sellaphora</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Surirella</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Ulnaria ulna</i>	x	0	0	0
Chlorophyceae	-	-	-	-
<i>Chlamydomonas</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Desmodesmus</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Monoraphidium arcuatum</i>	x	0	0	0
<i>Scenedesmus</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Stauridium tetras</i>	x	0	0	0
Conjugatophyceae	-	-	-	-
<i>Closterium closterioides</i>	x	0	0	0

<i>Cosmarium</i> sp. 1	x	0	0
Cocci nodiscophyceae	-	-	-
<i>Aulacoseira granulata</i>	x	3	0
<i>Hydrosera whampoensis</i>	x	0	0
<i>Melosira varians</i>	x	<1	0
Cryptophyceae	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	x	10	0
Cyanophyceae	-	-	-
<i>Komvophoron</i> sp. 1	x	0	0
<i>Merismopedia</i> sp. 1	x	0	0
<i>Phormidium</i> sp. 1	x	<1	5
Dinophyceae	-	-	-
<i>Peridinium</i> sp. 1	x	<1	0
Euglenophyceae	-	-	-
<i>Lepocinclis</i> sp. 1	x	0	0
<i>Phacus longicauda</i> var. <i>tortus</i>	x	0	0
<i>Trachelomonas armata</i>	x	0	0
<i>Trachelomonas similis</i>	x	0	0
Mediophyceae	-	-	-
<i>Terpsinoë musica</i>	x	0	0
Total:	32 táxons	15 org./mL	5 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P06	
Código(s) Econsult	6084/22 (qualitativa) e 6091/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 13 h 30 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7483582	Coord. L/O: 305266 Fuso: 23K


Resultados	Ensaio Qualitativo		Ensaio Quantitativo	
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-	-
<i>Amphipleura</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Cocconeis</i> sp. 1	x	1	0	0
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Gomphonema</i> sp. 1	x	0	0	0
<i>Gyrosigma</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	2	0	0
<i>Nitzschia</i> sp. 1	x	<1	0	0
<i>Surirella linearis</i>	x	0	0	0
<i>Ulnaria ulna</i>	x	0	0	0
Chlorophyceae	-	-	-	-
<i>Chlamydomonas</i> sp. 1	x	0	0	0
Conjugatophyceae	-	-	-	-
<i>Cosmarium</i> sp. 1	x	0	0	0
Coccinodiscophyceae	-	-	-	-
<i>Melosira varians</i>	x	<1	0	0
Cryptophyceae	-	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	x	3	0	0

Cyanophyceae	-	-	-
<i>Geitlerinema</i> sp. 1	x	0	0
<i>Komvophoron</i> sp. 1	x	0	0
<i>Phormidium</i> sp. 1	x	0	0
<i>Pseudanabaena</i> sp. 1	x	0	0
Euglenophyceae	-	-	-
<i>Phacus</i> sp. 1	x	0	0
<i>Trachelomonas volvocina</i>	x	0	0
Mediophyceae	-	-	-
<i>Thalassiosira</i> sp. 1	x	<1	0
<i>Terpsinoë musica</i>	x	0	0
Xanthophyceae	-	-	-
<i>Isthmochloron</i> sp. 1	x	<1	0
Total:	22 táxons	6 org./mL	0 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 09 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra		
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	
Ponto de amostragem	P07	
Código(s) Econsult	6085/22 (qualitativa) e 6092/22 (quantitativa)	
Matriz	Água bruta	
Data da amostragem	28/10/2022 às 10 h 27 min	
Coletor	Econsult Estudos Ambientais	
Data do recebimento	31/10/2022	
Data do ensaio	06/12/2022 e 08/12/2022	
Local dos ensaios	Instalação permanente	
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480084	Coord. L/O: 304897 Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo	
	Riqueza de Táxons	Densidade Numérica	N° de Células de Cianobactérias
Bacillariophyceae	-	-	-
<i>Cymbella</i> sp. 1	x	0	0
<i>Gomphonema</i> sp. 1	x	35	0
<i>Navicula</i> sp. 1	x	35	0
<i>Pinnularia</i> sp. 1	x	0	0
<i>Ulnaria ulna</i>	x	0	0
Chlorophyceae	-	-	-
<i>Coelastrum reticulatum</i>	x	0	0
<i>Desmodesmus</i> sp. 1	x	35	0
<i>Kirchneriella</i> sp. 1	x	0	0
Conjugatophyceae	-	-	-
<i>Cosmarium</i> sp. 1	x	0	0
<i>Staurastrum</i> sp. 1	x	35	0
Cryptophyceae	-	-	-
Cryptophyceae N.I. 1	x	389	0
Cyanophyceae	-	-	-
<i>Phormidium</i> sp. 1	x	0	0
Dinophyceae	-	-	-
<i>Peridinium</i> sp. 1	x	35	0
Euglenophyceae	-	-	-
<i>Euglena</i> sp. 1	x	35	0

<i>Trachelomonas armata</i>	x	0	0
<i>Trachelomonas volvocina</i>	x	106	0
Klebsormidiophyceae	-	-	-
<i>Elakatothrix</i> sp. 1	x	2.084	0
Mediophyceae	-	-	-
<i>Thalassiosira</i> sp. 1	x	3.709	0
Trebouxiophyceae	-	-	-
<i>Chlorella</i> sp. 1	x	0	0
<i>Dictyosphaerium</i> sp. 1	x	0	0
Total:	20 táxons	6.498 org./mL	0 cél./mL

Legenda	Org./mL: organismo por mililitro. Cél./mL: célula por mililitro. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, Método 10200 C, E, F.</i>
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.001 - Ensaio de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 5.2.1. e 5.2.3.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL. 001 – Amostragem de fitoplâncton e cianobactérias, <u>itens</u> 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2 e 7.3. FINT 105 – Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha - 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Paula Rocha Aguiar – CRBio 82979/01-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Anexo I – Relatórios de Ensaio do Fitoplâncton

Anexo II – Relatórios de Ensaio do Zooplâncton

Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P01		
Código(s) Econsult	6093/22 (quanti) e 6100/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 09 h 27 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	05/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7476469	Coord. L/O: 305572	Fuso: 23K


RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo ARTHROPODA		-
Subfilo CRUSTACEA		-
Classe Maxillopoda		-
Subclasse Copepoda		-
Ordem Calanoida		-
Calanoida N.I.		-
Náuplios	x	0
Ordem Cyclopoida		-
Náuplios	x	0
Copepodito	x	0
Ordem Harpacticoida		-
Náuplios	x	0
Classe Ostracoda	x	123
Filo CHORDATA		-
Subfilo VERTEBRATA		-
Larva de peixe	x	0
Filo PROTOZOA		-
Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
Família Arcellidae		-

<i>Arcella</i> sp. 01	x	123
Família Centropxyidae		-
<i>Centropxyis</i> cf. <i>aculeata</i>	x	123
Filo ROTIFERA		-
Classe Monogonta		-
Subclasse Monogononta		-
Ordem Ploima		-
Família Brachionidae		-
<i>Brachionus forficula</i>	x	0
<i>Plationus patulus</i>	x	0
<i>Platyias quadricornis</i>	x	0
Família Lecanidae		-
<i>Lecane bulla</i>	x	0
<i>Lecane</i> sp. 01	x	123
Total:	13 táxons	492 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200C, F, G.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
<u>Procedimento de amostragem e Plano de amostragem</u>	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20ª Campanha - 17/10/2022

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P02		
Código(s) Econsult	6094/22 (quanti) e 6101/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 18 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	08/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480588	Coord. L/O: 304659	Fuso: 23K

RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo ARTHROPODA		-
Subfilo CRUSTACEA		-
Classe Branchiopoda		-
Subclasse Phyllopoda		-
Ordem Diplostraca		-
Subordem Cladocera		-
Infraordem Anomopoda		-
Família Chydoridae		-
Chydoridae N.I.	x	5
Família Macrothricidae		-
<i>Macrothrix</i> sp. 01	x	5
Classe Maxillopoda		-
Subclasse Copepoda		-
Ordem Cyclopoida		-
Náuplios	x	0
Copepodito	x	10
Ordem Harpacticoida		-
Náuplios	x	0
Filo MOLLUSCA		-
Classe Bivalvia		-
Larva	x	70
Filo PROTOZOA		-

Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
<u>Família Arcellidae</u>		-
<i>Arcella dentata</i>	x	5
<i>Arcella</i> sp. 01	x	5
<u>Família Centropyxidae</u>		-
<i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i>	x	125
Filo ROTIFERA		-
Classe Monogonta		-
Subclasse Monogononta		-
Ordem Ploima		-
<u>Família Asplanchnidae</u>		-
<i>Asplanchnopus</i> sp. 01	x	5
Total:	10 táxons	2320 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200C, F, G.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
<u>Procedimento de amostragem e Plano de amostragem</u>	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20ª Campanha - 17/10/2022
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P03		
Código(s) Econsult	6095/22 (quanti) e 6102/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 49 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	08/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7481300	Coord. L/O: 304352	Fuso: 23K


RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo ARTHROPODA		-
Subfilo CRUSTACEA		-
Classe Maxillopoda		-
Subclasse Copepoda		-
Ordem Harpacticoida		-
Náuplios	x	23
Copepodito	x	46
Filo MOLLUSCA		-
Classe Bivalvia		-
Larva	x	23
Filo NEMATODA	x	23
Filo PROTOZOA		-
Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
<u>Família Arcellidae</u>		-
<u>Arcella sp. 01</u>	x	23
<u>Família Centropyxidae</u>		-
<u>Centropyxis cf. aculeata</u>	x	880
<u>Família Lesquereusiidae</u>		-
<u>Lesquereusia sp. 01</u>	x	23

Filo ROTIFERA		-
Classe Monogonta		-
Subclasse Monogononta		-
Ordem Ploima		-
Família Euchlanidae		-
<i>Euchlanis dilatata</i>	x	23
Família Lecanidae		-
<i>Lecane curvicornis</i>	x	23
Total:	9 táxons	1.087 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico. N.I.: Não Identificado.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23 ^a Edição, Método 10200C, F, G.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20 ^a Campanha - 17/10/2022

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P04		
Código(s) Econsult	6096/22 (quanti) e 6103/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 10 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	08/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7478809	Coord. L/O: 304990	Fuso: 23K


RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo ARTHROPODA		-
Subfilo CRUSTACEA		-
Classe Maxillopoda		-
Subclasse Copepoda		-
Ordem Calanoida		-
Calanoida N.I.	x	0
Náuplios	x	105
Copepodito	x	15
Ordem Cyclopoida		-
Cyclopoida N.I.	x	5
Náuplios	x	10
Copepodito	x	30
Ordem Harpacticoida		-
Copepodito	x	5
Classe Ostracoda	x	10
Filo CNIDARIA		-
Classe Hydrozoa	x	0
Filo MOLLUSCA		-
Classe Bivalvia		-
Larva	x	15
Filo NEMATODA	x	15
Filo PROTOZOA		-

Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
<u>Família Arcellidae</u>		-
<i>Arcella dentata</i>	x	5
<i>Arcella</i> sp. 01	x	20
<u>Família Centropyxidae</u>		-
<i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i>	x	70
<u>Família Diffugiidae</u>		-
<i>Diffugia</i> sp. 01	x	5
<u>Família Lesquereusiidae</u>		-
<i>Lesquereusia</i> sp. 01	x	15
Filo ROTIFERA		-
Classe Monogonta		-
Subclasse Monogononta		-
Ordem Ploima		-
<u>Família Brachionidae</u>		-
<i>Keratella americana</i>	x	5
<u>Família Lecanidae</u>		-
<i>Lecane proiecta</i>	x	10
<u>Família Notommatidae</u>		-
<i>Cephalodella</i> sp. 01	x	5
Filo TARDIGRADA	x	5
Total:	20 táxons	350 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200C, F, G.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
<u>Procedimento de amostragem e Plano de amostragem</u>	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20ª Campanha - 17/10/2022

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
Signatário autorizado	

Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P05		
Código(s) Econsult	6097/22 (quanti) e 6104/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 55 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	09/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480084	Coord. L/O: 304897	Fuso: 23K

RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo MOLLUSCA		-
Classe Bivalvia		-
Larva	x	35
Filo PROTOZOA		-
Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
<u>Família Arcellidae</u>		-
<i>Arcella dentata</i>	x	5
<i>Arcella vulgaris</i>	x	15
<i>Arcella</i> sp. 01	x	30
<u>Família Centropyxidae</u>		-
<i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i>	x	10
<i>Centropyxis</i> sp. 01	x	60
Total:	6 táxons	155 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200C, F, G.

Procedimento de ensaio	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20ª Campanha - 17/10/2022
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P06		
Código(s) Econsult	6098/22 (quanti) e 6105/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 13 h 34 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	09/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord.N/S: 7483582	Coord. L/O: 305266	Fuso: 23K


RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo ARTHROPODA		-
Subfilo CRUSTACEA		-
Classe Maxillopoda		-
Subclasse Copepoda		-
Ordem Cyclopoida		-
Cyclopoida N.I.	x	5
Filo CHORDATA		-
Subfilo VERTEBRATA		-
Larva de peixe	x	0
Filo PROTOZOA		-
Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
Família Arcellidae		-
<i>Arcella dentata</i>	x	15
<i>Arcella vulgaris</i>	x	70
<i>Arcella</i> sp. 01	x	5
Família Centropyxidae		-
<i>Centropyxis</i> sp. 01	x	100
Filo ROTIFERA		-
Classe Monogonta		-

Subclasse Monogononta		-
Ordem Ploima		-
Família Lecanidae		-
<i>Lecane bulla</i>	x	5
Total:	7 táxons	200 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200C, F, G.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20ª Campanha - 17/10/2022

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 12 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17° andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075 - 4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P07		
Código(s) Econsult	6099/22 (quanti) e 6106/22 (quali)		
Matriz	Água bruta		
Data da amostragem	28/10/2022 às 10 h 32 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	09/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480018	Coord. L/O: 303806	Fuso: 23K

RESULTADOS	Ensaio Qualitativo	Ensaio Quantitativo
Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxon	Densidade Numérica
Filo ARTHROPODA		-
Subfilo CRUSTACEA		-
Classe Branchiopoda		-
Subclasse Phyllopoda		-
Ordem Diplostraca		-
Subordem Cladocera		-
Infraordem Anomopoda		-
<u>Família Bosminidae</u>		-
<i>Bosmina</i> sp. 01	x	93
<u>Família Chydoridae</u>		-
Chydoridae N.I.	x	309
<u>Família Daphniidae</u>		-
<i>Ceriodaphnia silvestrii</i>	x	557
<i>Simocephalus</i> sp. 01	x	31
<u>Família Macrothricidae</u>		-
<i>Macrothrix</i> sp. 01	x	278
Classe Maxillopoda		-
Subclasse Copepoda		-
Ordem Calanoida		-
Calanoida N.I.	x	31
Náuplios	x	3.649
Copepodito	x	1.113

Ordem Cyclopoida		-
Náuplios	x	278
Copepodito	x	309
Ordem Harpacticoida		-
Náuplios	x	31
Copepodito	x	62
Classe Ostracoda	x	62
Filo PROTOZOA		-
Subfilo SARCODINA		-
Superclasse Rhizopoda		-
Classe Lobosa		-
Ordem Arcellinida		-
<u>Família Arcellidae</u>		-
<i>Arcella vulgaris</i>	x	278
<i>Arcella</i> sp. 01	x	62
<u>Família Centropyxidae</u>		-
<i>Centropyxis</i> cf. <i>aculeata</i>	x	155
<u>Família Diffugiidae</u>		-
<i>Diffugia</i> sp. 01	x	0
Filo ROTIFERA		-
Classe Monogonta		-
Subclasse Monogononta		-
Ordem Ploima		-
<u>Família Lecanidae</u>		-
<i>Lecane cornuta</i>	x	31
Total:	18 táxons	7.329 org./m³

Legenda	Org./m³: organismo por metro cúbico. 0 (zero): organismo observado somente no ensaio qualitativo. N.I.: Não Identificado.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10200C, F, G.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.003 - Ensaio de zooplâncton, <u>item (ns)</u> 5.1; 5.2.1; 5.2.2.
<u>Procedimento de amostragem e Plano de amostragem</u>	POP.COL.002 – Amostragem de Zooplâncton, <u>item (ns)</u> 7.1.1; 7.1.2. FINT 105 - Plano de Amostragem: C1824- 20ª Campanha - 17/10/2022

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica executante	Tainá Alves Ribeiro – CRBio 117596/04-D
--------------------	-----------------------------------------

Signatário autorizado



Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Anexo III – Relatórios de Ensaio de Invertebrados Bentônicos

Guarujá, 30 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P01		
Código(s) Econsult	6107/22 (R1); 6108/22 (R2) e 6109/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 09 h 37 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7476469	Coord. L/O: 305572	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	17/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Hirudinea	-	-	-	
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	
<u>Família Glossiphoniidae</u>	155	-	34	x
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	
Ordem Tubificida	-	-	-	
<u>Família Naididae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Tubificinae</u>	-	-	-	
Tubificinae com queta capilar	138	138	34	x
Tubificinae sem queta capilar	52	34	17	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo CHELICERATA	-	-	-	
Classe Arachnida	-	-	-	
Subclasse Acari	17	-	-	x
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	

Ordem Diptera	-	-	-	
Subordem Nematocera	-	-	-	
<u>Família Chironomidae</u>	-	-	-	
Chironomidae N.I.	34	-	-	X
<u>Subfamília Chironominae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Chironomini</u>	-	-	-	
<i>Endotribelos sp.</i>	517	138	17	X
<i>Polypedilum sp.</i>	121	-	-	X
<i>Stenochironomus sp.</i>	-	-	17	X
<u>Tribo Tanytarsini</u>	103	-	17	X
<u>Subfamília Orthocladiinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Orthocladiini</u>	-	-	-	
<i>Cricotopus sp.</i>	34	17	-	X
<u>Subfamília Tanypodinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Pentaneurini</u>	-	-	-	
<i>Ablabesmyia sp.</i>	34	17	-	X
<i>Labrundinia sp.</i>	34	-	-	X
<i>Larsia sp.</i>	155	86	34	X
<u>Família Tipulidae</u>	-	17	-	X
Ordem Odonata	-	-	-	
Subordem Anisoptera	-	-	-	
<u>Família Libellulidae</u>	-	17	-	X
Total:	1.394	464	170	15 táxons
	org./m²	org./m²	org./m²	

Legenda	Org./m²: organismo por metro quadrado. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23^a Edição, Método 10500C.</i>
Procedimento de ensaio	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20 ^a Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS

Signatário autorizado



Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 30 de dezembro de 2022.


Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P02		
Código(s) Econsult	6110/22 (R1); 6111/22 (R2) e 6112/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 27 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480588	Coord. L/O: 304659	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	17/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	
Ordem Tubificida	-	-	-	
<u>Família Naididae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Tubificinae</u>	-	-	-	
Tubificinae com queta capilar	-	17	-	x
Tubificinae sem queta capilar	-	-	52	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	
Ordem Diptera	-	-	-	
Subordem Nematocera	-	-	-	
<u>Família Chironomidae</u>	-	-	-	
Chironomidae N.I.	34	155	121	x
<u>Subfamília Chironominae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Chironomini</u>	-	-	-	

<i>Chironomus</i> sp.	-	224	-	x
<i>Cryptochironomus</i> sp.	-	-	52	x
<i>Endotribelos</i> sp.	-	-	17	x
<i>Polypedilum</i> sp.	-	86	52	x
Tribo Tanytarsini	259	1.983	655	x
Subfamília Orthocladiinae	-	-	-	
Tribo Corynoneurini	-	-	-	
<i>Corynoneura</i> sp.	103	-	103	x
Tribo Orthoclaadiini	-	-	-	
<i>Nanocladius</i> sp.	207	121	121	x
Subfamília Tanypodinae	-	-	-	
Tribo Pentaneurini	-	-	-	
<i>Ablabesmyia</i> sp.	34	103	52	x
<i>Labrundinia</i> sp.	17	-	34	x
Família Tipulidae	-	-	17	x
Ordem Ephemeroptera	-	-	-	
Família Baetidae	-	-	17	x
Filo MOLLUSCA	-	-	-	
Classe Bivalvia	-	-	-	
Subclasse Heterodonta	-	-	-	
Ordem Venerida	-	-	-	
Família Corbiculidae	-	-	-	
<i>Corbicula fluminea</i>	-	69	17	x
Filo PLATYHELMINTHES	-	-	-	
Classe Turbellaria	17	-	-	x
Total:	671 org./m ²	2.758 org./m ²	1.310 org./m ²	16 táxons

Legenda	Org./m²: organismo por metro quadrado. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23 ^a Edição, Método 10500C.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20 ^a Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 30 de dezembro de 2022.


Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P03		
Código(s) Econsult	6113/22 (R1); 6114/22 (R2) e 6115/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 55 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7481300	Coord. L/O: 304352	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	17/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Hirudinea	-	-	-	
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	
<u>Família Glossiphoniidae</u>	190	52	69	x
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	
Ordem Tubificida	-	-	-	
<u>Família Naididae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Naidinae</u>	52	17	52	x
<u>Subfamília Tubificinae</u>	-	-	-	
Tubificinae com queta capilar	103	52	34	x
Tubificinae sem queta capilar	34	-	-	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo CRUSTACEA	-	-	-	
Classe Ostracoda	52	-	17	x
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	

Ordem Diptera	-	-	-	
Subordem Nematocera	-	-	-	
<u>Família Ceratopogonidae</u>	17	-	-	x
<u>Família Chironomidae</u>	-	-	-	
Chironomidae N.I.	-	17	-	x
<u>Subfamília Chironominae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Chironomini</u>	-	-	-	
<i>Chironomus</i> sp.	-	-	34	x
<i>Polypedilum</i> sp.	-	-	17	x
<u>Subfamília Orthoclaadiinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Orthoclaadiini</u>	-	-	-	
<i>Nanocladius</i> sp.	-	-	34	x
<u>Subfamília Tanypodinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Pentaneurini</u>	-	-	-	
<i>Ablabesmyia</i> sp.	-	17	34	x
<i>Labrundinia</i> sp.	17	-	52	x
Ordem Ephemeroptera	-	-	-	
<u>Família Leptohyphidae</u>	-	17	17	x
Ordem Trichoptera	-	-	-	
<u>Família Polycentropodidae</u>	-	34	-	x
Filo MOLLUSCA	-	-	-	
Classe Bivalvia	-	-	-	
Subclasse Heterodonta	-	-	-	
Ordem Venerida	-	-	-	
<u>Família Corbiculidae</u>	-	-	-	
<i>Corbicula fluminea</i>	34	103	190	x
Classe Gastropoda	-	-	-	
Subclasse Heterobranchia	-	-	-	
Ordem Basommatophora	-	-	-	
<u>Família Physidae</u>	-	17	17	x
<u>Família Planorbidae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Ancyliinae</u>	-	34	34	x
Total:	499 org./m ²	360 org./m ²	601 org./m ²	17 táxons

Legenda	Org./m²: organismo por metro quadrado. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, Método 10500C.</i>
Procedimento de	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.

ensaio	
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 30 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P04		
Código(s) Econsult	6116/22 (R1); 6117/22 (R2) e 6118/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 15 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7478809	Coord. L/O: 304990	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	17/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Hirudinea	-	-	-	
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	
<u>Família Glossiphoniidae</u>	17	-	17	x
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	
Ordem Tubificida	-	-	-	
<u>Família Naididae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Tubificinae</u>	-	-	-	
Tubificinae com queta capilar	-	17	52	x
Tubificinae sem queta capilar	34	34	-	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo CRUSTACEA	-	-	-	
Classe Ostracoda	34	-	17	x
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	
Ordem Diptera	-	-	-	

Subordem Nematocera	-	-	-	
Família Chironomidae	-	-	-	
Chironomidae N.I.	17	-	-	X
Subfamília Chironominae	-	-	-	
Tribo Tanytarsini	52	34	-	X
Subfamília Orthocladiinae	-	-	-	
Tribo Corynoneurini	-	-	-	
<i>Corynoneura</i> sp.	69	-	-	X
Total:	223 org./m ²	85 org./m ²	86 org./m ²	7 táxons

Legenda	Org./m²: organismo por metro quadrado. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10500C.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 30 de dezembro de 2022.


Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P05		
Código(s) Econsult	6119/22 (R1); 6120/22 (R2) e 6121/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 04 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480084	Coord. L/O: 304897	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	17/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Hirudinea	-	-	-	
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	
<u>Família Glossiphoniidae</u>	-	-	17	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	
Ordem Diptera	-	-	-	
Subordem Nematocera	-	-	-	
<u>Família Ceratopogonidae</u>	34	-	34	x
<u>Família Chironomidae</u>	-	-	-	
Chironomidae N.I.	17	17	345	x
<u>Subfamília Chironominae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Chironomini</u>	-	-	-	
<i>Chironomus</i> sp.	-	-	741	x
<i>Endotribelos</i> sp.	-	-	741	x

<i>Fissimentum</i> sp.	86	-	-	x
<i>Polypedilum</i> sp.	172	34	1.483	x
<u>Tribo Tanytarsini</u>	-	-	-	
Tanytarsini N.I.	4.310	-	-	x
<i>Caladomyia</i> sp.	-	1.017	14.828	x
<u>Subfamília Orthoclaadiinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Orthoclaadiini</u>	-	-	-	
<i>Nanocladius</i> sp.	259	34	1.483	x
<u>Subfamília Tanypodinae</u>	-	-	-	
Tanypodinae N.I.	-	17	-	x
<u>Tribo Pentaneurini</u>	-	-	-	
<i>Ablabesmyia</i> sp.	103	155	345	x
<i>Labrundinia</i> sp.	17	-	-	x
<i>Larsia</i> sp.	-	-	741	x
Ordem Ephemeroptera	-	-	-	
<u>Família Leptohiphidae</u>	17	-	-	x
Ordem Odonata	-	-	-	
Subordem Anisoptera	-	-	-	
<u>Família Gomphidae</u>	-	-	17	x
Filo MOLLUSCA	-	-	-	
Classe Bivalvia	-	-	-	
Subclasse Heterodonta	-	-	-	
Ordem Venerida	-	-	-	
<u>Família Corbiculidae</u>	-	-	-	
<i>Corbicula fluminea</i>	121	86	862	x
Classe Gastropoda	-	-	-	
Subclasse Caenogastropoda	-	-	-	
<u>Família Thiaridae</u>	-	-	-	
<i>Melanoides tuberculatus</i>	-	-	52	x
Total:	5.136 org./m ²	1.360 org./m ²	21.689 org./m ²	18 táxons

Legenda	Org./m²: organismo por metro quadrado. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10500C.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.

Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 30 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P06		
Código(s) Econsult	6122/22 (R1); 6123/22 (R2) e 6124/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 13 h 42 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7483582	Coord. L/O: 305266	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	18/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Hirudinea	-	-	-	
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	
<u>Família Glossiphoniidae</u>	34	103	138	x
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	
Ordem Tubificida	-	-	-	
<u>Família Naididae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Naidinae</u>	17	-	17	x
<u>Subfamília Tubificinae</u>	-	-	-	
Tubificinae com queta capilar	172	69	34	x
Tubificinae sem queta capilar	52	121	69	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	
Ordem Diptera	-	-	-	
Subordem Nematocera	-	-	-	

<u>Família Chironomidae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Chironominae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Chironomini</u>	-	-	-	
<i>Polypedilum</i> sp.	17	-	-	x
<u>Subfamília Tanypodinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Pentaneurini</u>	-	-	-	
<i>Larsia</i> sp.	-	17	-	x
Total:	292 org./m ²	310 org./m ²	258 org./m ²	6 táxons

Legenda	Org./m²: organismo por metro quadrado. N.I.: Não Identificado.
Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23 ^a Edição, Método 10500C.
Procedimento de ensaio	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20 ^a Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 30 de dezembro de 2022.


Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001 - 44
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar – sala 1.707 – Água Branca
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P07		
Código(s) Econsult	6125/22 (R1); 6126/22 (R2) e 6127/22 (R3)		
Matriz	Sedimentos		
Data da amostragem	28/10/2022 às 10 h 41 min		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480018	Coord. L/O: 303806	Fuso: 23K
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	31/10/2022		
Data do ensaio	18/12/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		

Resultados	Ensaio Quantitativo			Ensaio Qualitativo
	Densidade Numérica			Riqueza de Táxon
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	
Grupos Taxonômicos				
Filo ANNELIDA	-	-	-	
Classe Clitellata	-	-	-	
Subclasse Hirudinea	-	-	-	
Ordem Rhynchobdellida	-	-	-	
<u>Família Glossiphoniidae</u>	17	86	52	x
Subclasse Oligochaeta	-	-	-	
Ordem Tubificida	-	-	-	
<u>Família Naididae</u>	-	-	-	
<u>Subfamília Tubificinae</u>	-	-	-	
Tubificinae com queta capilar	69	17	52	x
Tubificinae sem queta capilar	17	-	-	x
Filo ARTHROPODA	-	-	-	
Subfilo HEXAPODA	-	-	-	
Classe Insecta	-	-	-	
Ordem Diptera	-	-	-	
Subordem Nematocera	-	-	-	
<u>Família Ceratopogonidae</u>	-	34	-	x

<u>Família Chironomidae</u>	-	-	-	
Chironomidae N.I.	17	52	34	x
<u>Subfamília Chironominae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Chironomini</u>	-	-	-	
<i>Asheum</i> sp.	-	-	17	x
<i>Chironomus</i> sp.	34	69	52	x
<i>Cladopelma</i> sp.	-	-	17	x
<i>Cryptochironomus</i> sp.	17	-	34	x
<i>Dicrotendipes</i> sp.	-	-	34	x
<i>Goeldichironomus</i> sp.	34	121	17	x
<i>Polypedilum</i> sp.	121	52	34	x
<u>Tribo Tanytarsini</u>	-	-	-	
<i>Caladomyia</i> sp.	172	207	293	x
<u>Subfamília Orthocladiinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Orthocladiini</u>	-	-	-	
<i>Cricotopus</i> sp.	17	-	-	x
<i>Nanocladius</i> sp.	-	34	34	x
<u>Subfamília Tanypodinae</u>	-	-	-	
<u>Tribo Pentaneurini</u>	-	-	-	
<i>Ablabesmyia</i> sp.	34	-	-	x
<i>Labrundinia</i> sp.	52	-	-	x
<i>Monopelopia</i> sp.	17	172	52	x
<u>Tribo Tanypodini</u>	-	-	-	
<i>Tanypus</i> sp.	52	17	-	x
Ordem Ephemeroptera	-	-	-	
<u>Família Leptohephidae</u>	17	-	34	x
Ordem Odonata	-	-	-	
Subordem Anisoptera	-	-	-	
<u>Família Libellulidae</u>	-	-	17	x
Filo MOLLUSCA	-	-	-	
Classe Gastropoda	-	-	-	
Subclasse Caenogastropoda	-	-	-	
<u>Família Thiaridae</u>	-	-	-	
<i>Melanoides tuberculatus</i>	34	-	-	x
Filo NEMATODA	17	17	-	x
Total:	738 org./m ²	878 org./m ²	773 org./m ²	23 táxons

Legenda **Org./m²:** organismo por metro quadrado.
N.I.: Não Identificado.

Metodologia de referência	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, Método 10500C.</i>
Procedimento de ensaio	POP.ANL.002 - Ensaio de invertebrados bentônicos, item (ns) 5.
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP.COL.003 – Amostragem de Invertebrados bentônicos, item (ns) 7.1.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Margarida Marques – CRBio 30691-4D-01-RS
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Anexo IV – Relatórios de Ensaio de Macrófitas Aquáticas


Guarujá, 29 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P01		
Código(s) Econsult	6128/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 09 h 20 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7476469	Coord. L/O: 305572	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo		
	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
Monilophytas (Samambaias)			
Salviniaceae			
<i>Salvinia herzogii</i> de la Sota	x	Flutuante Livre	1
Magnoliophytas (Angiospermas)			
Amaranthaceae			
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	x	Emergente	1
Araceae			
<i>Pistia stratiotes</i> L.	x	Flutuante Livre	1
Asteraceae			
<i>Eclipta prostrata</i> L.	x	Anfíbia	R
Commelinaceae			
<i>Commelina erecta</i> L.	x	Anfíbia	R
Convolvulaceae			
<i>Ipomoea alba</i> L.	x	Anfíbia	R
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	x	Anfíbia	R
Cyperaceae			
<i>Cyperus chalaranthus</i> J.Presl & C.Presl	x	Anfíbia	R
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.	x	Emergente	R
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi	x	Emergente	R
Poaceae			
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.)	x	Anfíbia	R

R.D.Webster			
Pontederiaceae			
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	x	Flutuante Livre	1
Total:	12 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita. Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.
<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10400B, D. Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i> . 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 29 de dezembro de 2022.


Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P02		
Código(s) Econsult	6129/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 10 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480588	Coord. L/O: 304659	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo			
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
<u>Monilophytas (Samambaias)</u>				
Blachnaceae				
<i>Blechnum</i> sp.	x	Anfíbia	R	
Salviniaceae				
<i>Salvinia herzogii</i> de la Sota	x	Flutuante Livre	2	
Thelypteridaceae				
Thelypteridaceae sp.	x	Anfíbia	R	
<u>Magnoliophytas (Angiospermas)</u>				
Acanthaceae				
<i>Hygrophila costata</i> Ness	x	Emergente	2	
Amaranthaceae				
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	x	Emergente	2	
Apiaceae				
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	x	Anfíbia	R	
Araceae				
<i>Pistia stratiotes</i> L.	x	Flutuante Livre	R	
Asteraceae				
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	x	Anfíbia	R	
<i>Eclipta prostrata</i> L.	x	Anfíbia	R	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	x	Anfíbia	R	
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	x	Anfíbia	R	

<i>Porophyllum ruderae</i> (Jacq.) Cass.	x	Anfíbia	R
Caryophyllaceae			
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.	x	Emergente	R
Convolvulaceae			
<i>Ipomoea alba</i> L.	x	Anfíbia	R
Cyperaceae			
<i>Cyperus mundtii</i> (Nees) Kunth	x	Emergente	1
<i>Cyperus</i> sp.	x	Anfíbia	R
<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	x	Emergente	R
Fabaceae			
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.	x	Anfíbia	R
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	x	Anfíbia	R
Haloragaceae			
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	x	Flutuante Fixa	3
Lythraceae			
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.	x	Anfíbia	R
Onagraceae			
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	x	Emergente	1
<i>Ludwigia myrtifolia</i> (Cambess.) H.Hara	x	Emergente	R
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven	x	Emergente	R
Poaceae			
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	x	Anfíbia	R
Polygonaceae			
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	x	Emergente	R
Pontederiaceae			
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	x	Flutuante Livre	3
Urticaceae			
<i>Urtica</i> sp.	x	Anfíbia	R
Total:	28 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	<p>Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita.</p> <p>Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.</p>
Metodologia de referência	<p><i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>, 23ª Edição, Método 10400B, D.</p> <p>Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i>. 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.</p>
Procedimento de ensaio	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
Procedimento de amostragem e Plano	POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1.


de amostragem	FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

Guarujá, 29 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P03		
Código(s) Econsult	6130/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 12 h 45 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7481300	Coord. L/O: 304352	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo		
	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
Monilophytas (Samambaias)			
Salviniaceae			
<i>Salvinia herzogii</i> de la Sota	x	Flutuante Livre	R
Magnoliophytas (Angiospermas)			
Araliaceae			
<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	x	Flutuante Fixa	R
Commelinaceae			
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	x	Anfíbia	R
Convolvulaceae			
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	x	Anfíbia	R
Cyperaceae			
<i>Cyperus chalaranthus</i> J.Presl & C.Presl	x	Anfíbia	R
Hypericaceae			
<i>Hypericum mutilum</i> L.	x	Anfíbia	R
Melastomataceae			
Melastomataceae sp.	x	Anfíbia	R
Poaceae			
<i>Urochloa</i> cf. <i>adpersa</i> (Trin.) R.D.Webster	x	Anfíbia	R
Pontederiaceae			
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	x	Flutuante Livre	R
Total:	9 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita. Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.
<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10400B, D. Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i> . 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 29 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P04		
Código(s) Econsult	6131/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 00 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7478809	Coord. L/O: 304990	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo			
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
<u>Magnoliophytas (Angiospermas)</u>				
Asteraceae				
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	x	Anfíbia	R	
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	x	Anfíbia	R	
Commelinaceae				
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	x	Anfíbia	R	
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	x	Anfíbia	R	
Convolvulaceae				
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	x	Anfíbia	R	
Lythraceae				
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schlecht.	x	Anfíbia	R	
Malvaceae				
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	x	Anfíbia	R	
Onagraceae				
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	x	Emergente	R	
Plantaginaceae				
<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	x	Anfíbia	R	
Poaceae				
<i>Ocelochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone	x	Anfíbia	R	
Polygonaceae				
<i>Polygonum diospyrifolium</i> Cham.	x	Emergente	R	

<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	x	Emergente	R
Solanaceae			
<i>Brugmansia</i> cf. <i>suaveolens</i> (Willd.) Sweet	x	Anfíbia	R
Verbenaceae			
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	x	Anfíbia	R
Zingiberiaceae			
<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	x	Emergente	2
Total:	15 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita. Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.
<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10400B, D. Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i> . 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 29 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P05		
Código(s) Econsult	6132/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 11 h 45 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480084	Coord. L/O: 304897	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo			
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
<u>Magnoliophytas (Angiospermas)</u>				
Acanthaceae				
<i>Hygrophila costata</i> Ness	x	Emergente	R	
Amaranthaceae				
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	x	Anfíbia	R	
Apocynaceae				
<i>Asclepias curassavica</i> L.	x	Anfíbia	R	
Asteraceae				
<i>Eclipta prostrata</i> L.	x	Anfíbia	R	
Brassicaceae				
<i>Cardamine bonariensis</i> Pers.	x	Anfíbia	R	
Caryophyllaceae				
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.	x	Emergente	R	
Commelinaceae				
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	x	Anfíbia	R	
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handl.	x	Anfíbia	R	
Convolvulaceae				
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	x	Anfíbia	R	
Cyperaceae				
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	x	Anfíbia	R	
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.	x	Emergente	R	

Fabaceae			
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	x	Anfíbia	R
Lythraceae			
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schlecht.	x	Anfíbia	R
Onagraceae			
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	x	Emergente	R
Plantaginaceae			
<i>Callitriche deflexa</i> A.Braun ex Hegelm.	x	Emergente	R
<i>Micranthemum umbrosum</i> (Walter ex J.F.Gmel.) S.F.Blake	x	Emergente	R
Poaceae			
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	x	Anfíbia	R
Polygonaceae			
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	x	Emergente	R
Pontederiaceae			
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.	x	Flutuante Fixa	R
Solanaceae			
<i>Solanum americanum</i> Mill.	x	Anfíbia	R
Total:	20 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	<p>Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita.</p> <p>Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.</p>
<u>Metodologia de referência</u>	<p><i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>, 23ª Edição, Método 10400B, D.</p> <p>Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i>. 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.</p>
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	<p>Proibida reprodução parcial deste documento.</p> <p>O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada.</p> <p>Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.</p>
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	

Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 29 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P06		
Código(s) Econsult	6133/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 13 h 25 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7483582	Coord. L/O: 305266	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo		
	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
Grupos Taxonômicos			
<u>Magnoliophytas (Angiospermas)</u>			
Acanthaceae			
<i>Ruellia cf. paniculata</i> L.	x	Anfíbia	1
Araceae			
<i>Pistia stratiotes</i> L.	x	Flutuante Livre	R
Asteraceae			
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	x	Anfíbia	1
<i>Thitonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gra	x	Emergente	R
Begoniaceae			
<i>Begonia</i> sp.	x	Anfíbia	R
Caryophyllaceae			
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.	x	Emergente	1
Hydrocharitaceae			
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	x	Flutuante Livre	R
Malvaceae			
<i>Sida rhombifolia</i> L.	x	Anfíbia	R
Onagraceae			
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	x	Emergente	R
Pontederiaceae			
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	x	Flutuante Livre	R

Urticaceae			
<i>Urera caracasa</i> (Jacq.) Griseb.	x	Anfíbia	R
Total:	11 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita. Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.
<u>Metodologia de referência</u>	<i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 23ª Edição, Método 10400B, D. Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i> . 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.
<u>Procedimento de ensaio</u>	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
<u>Procedimento de amostragem e Plano de amostragem</u>	POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1. FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.
Observações	Proibida reprodução parcial deste documento. O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D


Guarujá, 29 de dezembro de 2022.

Dados Referentes ao Cliente	
Solicitante	Consórcio BP OAS – CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Endereço	Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – 17º andar sala 1.707 – Água Branca.
Município/Estado	São Paulo/SP
Telefone	(11) 3075-4777
E-mail	ricardo.prado@cetenco.com.br

Dados Referentes à Amostra			
Projeto	Programa de Monitoramento da Biota Aquática		
Ponto de amostragem	P07		
Código(s) Econsult	6134/22		
Matriz	Macrófitas aquáticas		
Data da amostragem	28/10/2022 às 10 h 25 min		
Coletor	Econsult Estudos Ambientais		
Data do recebimento	28/10/2022		
Data do ensaio	28/10/2022		
Local dos ensaios	Instalação permanente		
Local da amostragem	Coord. N/S: 7480018	Coord. L/O: 303806	Fuso: 23K

Resultados	Ensaio Qualitativo			
	Grupos Taxonômicos	Riqueza de Táxons	Forma Biológica	Índice de Cobertura
<u>Monilophytas (Samambaias)</u>				
Blachnaceae				
<i>Blechnum</i> sp.	x	Anfíbia	R	
Thelypteridaceae				
Thelypteridaceae sp.	x	Anfíbia	R	
<u>Magnoliophytas (Angiospermas)</u>				
Apiaceae				
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	x	Anfíbia	R	
Asteraceae				
<i>Eclipta prostrata</i> L.	x	Anfíbia	R	
<i>Lessingianthus glabratus</i> (Less.) H.Rob.	x	Anfíbia	R	
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	x	Anfíbia	R	
Cyperaceae				
<i>Cyperus mundtii</i> (Nees) Kunth	x	Emergente	2	
<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roem. & Schult.	x	Emergente	R	
<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	x	Emergente	R	
Fabaceae				
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.	x	Anfíbia	R	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC	x	Anfíbia	R	
<i>Mimosa</i> cf. <i>pudica</i> L.	x	Anfíbia	R	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	x	Anfíbia	R	

Iridaceae			
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	x	Anfíbia	R
Lythraceae			
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schlecht.	x	Anfíbia	R
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.	x	Anfíbia	R
Malvaceae			
<i>Sida rhombifolia</i> L.	x	Anfíbia	R
Onagraceae			
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara	x	Emergente	R
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	x	Emergente	R
<i>Ludwigia sericea</i> (Cambess.) H.Hara	x	Anfíbia	R
Poaceae			
<i>Panicum repens</i> L.	x	Emergente	R
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	x	Anfíbia	R
Total:	22 táxons	N.A.	N.A.

Legenda	<p>Forma biológica: FL = Flutuante Livre; FF = Flutuante Fixa; SL = Submersa Livre; SF = Submersa Fixa; E = Emergente; A = Anfíbia; Ep = Epífita.</p> <p>Índice de cobertura: R = pequena e rara; 1 = esporádica e indivíduos de pequeno porte; 2 = rala com poucos indivíduos; 3 = dispersa com numerosos indivíduos; 4 = descontínua e em grande número; 5 = contínua ou quase contínua.</p>
Metodologia de referência	<p><i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>, 23ª Edição, Método 10400B, D.</p> <p>Índice de cobertura: Braun-Blanquet, J.; Fuller, G. D.; Conard, H. S. - <i>Plant sociology: the study of plant communities</i>. 1st. New York, London: McGraw-Hill book company, inc., 1932. XVIII, 439 p.</p>
Procedimento de ensaio	POP.ANL.007 – Ensaio de Macrófitas Aquáticas, itens 5.1.; 5.2
Procedimento de amostragem e Plano de amostragem	<p>POP. COL. 005- Amostragem de Macrófitas Aquáticas, itens 7.1.1; 7.1.2.; 7.2.; 7.2.1.</p> <p>FINT 105- Plano de Amostragem: C1824 – 20ª Campanha – 17/10/2022.</p>
Observações	<p>Proibida reprodução parcial deste documento.</p> <p>O resultado refere-se exclusivamente à amostra analisada.</p> <p>Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.</p>
Técnica executante	Maria Estefânia Fernandes Rodrigues – CRBio 082208/01 - D
Signatário autorizado	 Vilma Maria Cavinatto Rivero – CRBio 06912/01-D

BARRAGEM PEDREIRA



ANEXO XIV - Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário

Fevereiro/2023

Período: Setembro a Dezembro 2022



www.daepedreiraeduaspontes.com.br



PEDREIRA E CAMPINAS – SÃO PAULO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DOS **PROGRAMAS AMBIENTAIS** **BARRAGEM PEDREIRA**

12º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário

0322-01-AS-RQS-0012-R01-PMIIMS

Contrato: N° 2018/11/00032.2

**Setembro a dezembro
2022**

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7
2.	CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	8
3.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
3.1	EQUIPE TÉCNICA.....	9
4.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO	10
4.1	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PROGRAMA.....	10
4.1.1	Atendimento aos Objetivos	10
4.1.2	Atendimento às Metas	10
4.1.3	Indicadores.....	11
4.2	RESUMO DAS ATIVIDADES ANTERIORES – HISTÓRICO	12
4.3	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO.....	15
4.3.1	10º Campanha de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário.....	15
4.4	PLANEJAMENTO DAS PRÓXIMAS ATIVIDADES.....	17
5.	CRONOGRAMA - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO	18
6.	ANEXO	24

ÍNDICE DE QUADRO

Quadro 1 – Equipe técnica.....	9
Quadro 2 – Atendimento aos Objetivos.....	10
Quadro 3 – Atendimento às Metas.....	11
Quadro 4 – Indicadores.....	11
Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.....	14
Quadro 6 – Cronograma – Ano 1.....	19
Quadro 7 – Cronograma – Ano 2.....	20
Quadro 8 – Cronograma – Ano 3.....	21
Quadro 9 – Cronograma – Ano 4.....	22
Quadro 10 – Cronograma – Ano 5.....	23

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 – Atividades de campo (23/09/2022).	15
Foto 2 - Atividades de campo (23/09/2022).	15
Foto 3 - Atividades de campo, instalação de armadilhas (23/09/2022).	15
Foto 4 – Vista geral para a área objeto do monitoramento (23/09/2022).	15

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADA – Área Diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
ANA – Agencia Nacional de Águas
ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica
CA – Certificado de Aprovação
CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONSORCIO BP – Consórcio BP KPE-CETENCO
CTF/APP – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
CR – Certificado de Regularidade
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EPI – Equipamento de Proteção Individual
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia
NR – Norma Regulamentadora
PBA – Plano Básico Ambiental
PGA – Programa de Gestão Ambiental
PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
PSV – Programa de Supressão de Vegetação
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
SMA – Secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

APRESENTAÇÃO

O Consórcio BP KPE-CETENCO apresenta o **12º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ANDAMENTO AMBIENTAL** do Programa de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário referente ao contrato de implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas conforme elementos técnicos do Edital de Concorrência Internacional 005/DAEE/2017/DLC.

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa atender à exigência ambiental do Edital de Concorrência **005/DAEE/2017/DLC**, cujo objetivo é a implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiá – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas com eficácia e qualidade requeridas.

O escopo deste **Relatório Ambiental do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico e Sanitário** está baseado nas atividades realizadas no **período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2022**.

O principal objetivo é monitorar o comportamento da fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário, que venham a ocorrer na área de influência da Barragem Pedreira, durante as etapas de planejamento e implantação do empreendimento.

Também é objetivo do programa coletar espécies de invertebrados de interesse médico-sanitário na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, utilizando as técnicas de coleta específicas de cada grupo taxonômico monitorado; determinar a composição da fauna de invertebrados ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento e identificar espécies potenciais vetores de patógenos para os seres humanos; vigiar a infestação por espécies invasoras, visando alerta os órgãos de saúde municipal e estadual; propor medidas de controle vetorial para a ADA do empreendimento; alertar os órgãos de saúde municipal e estadual sobre o risco eminente da ocorrência de surtos.

2. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A seguir apresenta-se os detalhes da condicionante preconizada na LI nº2557, referente ao programa e acompanhamento ambiental da Barragem Pedreira.

Item 2.2 - Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada, os resultados obtidos, registros fotográficos das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.

Atendido.

Item 2.43 - Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.

Em atendimento, conforme relatório em tela.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.1 Equipe Técnica

Nome	Função Exercida	Formação	Registro
Denis Dorighello Tomás	Responsável de Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Geógrafo	CREA 0601944001
Maria Elena Basilio	Coordenadora dos Programas Ambientais	Engenheira Agrônoma	CREA 5061242441
Luis Alberto de Oliveira	Coordenador do Meio Biótico	Engenheiro Florestal	CREA 5063209653
Noel Eduardo de Oliveira Cintra	Equipe Técnica	Médico Veterinário	CRMV-SP 42786
Amanda S. Oehlmeyer	Equipe Técnica	Bióloga	CRBio 64101/01
Gustavo G. Creton	Equipe Técnica	Médico Veterinário	CRMV-SP 26.916
Welber Senteio Smith	Equipe Técnica	Biólogo	CRBio 23134/01
Julio A. B. Monsalvo	Equipe Técnica	Biólogo	CRBio 106145/01-D
Estéfani N. P. Soares	Equipe Técnica	Bióloga	CRBio 116587/01-D

Quadro 1 – Equipe técnica.

4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO

4.1 Atendimento aos Objetivos, Metas e Indicadores do Programa

O atendimento aos objetivos, metas e indicadores está sintetizado nos **Quadros 2, 3 e 4**, a seguir.

4.1.1 Atendimento aos Objetivos

MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO		
Objetivos	Status	Justificativa
Coletar espécies de invertebrados de interesse médico-sanitário na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, utilizando as técnicas de coleta específicas de cada grupo taxonômico monitorado	Atendido	As técnicas de coleta utilizadas para cada grupo taxonômico são as especificadas no documento de Estudo de Impacto Ambiental elaborado em 2015.
Determinar a composição da fauna de invertebrados ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento e identificar espécies potenciais vetores de patógenos para os seres humanos	Atendido	Está sendo avaliada a composição de espécies de invertebrados, incluindo as com potencial para disseminar patógenos para os seres humanos
Vigiar a infestação por espécies invasoras, visando alerta os órgãos de saúde municipal e estadual	Em andamento	As campanhas quadrimestrais vigiam possíveis infestações.
Propor medidas de controle vetorial para a ADA do empreendimento	*	Medidas de controle vetorial serão propostas na eventual constatação de alteração no monitoramento.
Alertar os órgãos de saúde municipal e estadual sobre o risco eminente da ocorrência de surtos	*	Durante a fase de enchimento do reservatório é possível que ocorram alterações que propiciem surtos. Essas alterações serão monitoradas e, em caso de alteração, os órgãos serão alertados.

* Não se aplica para o período

Quadro 2 – Atendimento aos Objetivos.

4.1.2 Atendimento às Metas

MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO		
Metas	Status	Justificativa
Realizar uma campanha de campo na etapa de planejamento (pesquisa exploratória) e 15 campanhas de campo, nas etapas de implantação e operação da Barragem Pedreira	Em atendimento	A campanha exploratória foi realizada na etapa de planejamento e as campanhas de campo estão sendo realizadas quadrimestralmente.
Elaborar um Plano de Trabalho (após conclusão da pesquisa exploratória), 15 relatórios parciais, cinco anuais e um final	Atendida	Plano de Trabalho entregue em julho/2018

MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO		
Metas	Status	Justificativa
Depositar em coleções de referência específica de cada grupo taxonômico monitorado, um representante de cada espécie identificada nas áreas de influência do empreendimento	Em atendimento	Os representantes de cada grupo são armazenados e oferecidos para deposição.

Quadro 3 – Atendimento às Metas.

4.1.3 Indicadores

PROGRAMA DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO	
Indicador	Status
Medidas de frequência: Número absoluto e percentual de espécies de vetores para cada grupo taxonômico.	103 dípteros
Indicadores entomológicos	Dípteros que compreenderam as famílias Ceratopogonidae, Culicidae, Dixidae, Phlebotominae, Sciaridae e Simuliidae
Indicadores de capacidade e competência vetorial	Culicidae foi que obteve o maior número, representada por 4 espécies, a Phlebotominae por 3 espécies, e as famílias Ceratopogonidae, Dixidae, Sciaridae e Simuliidae apresentaram uma espécie cada.
Índices epidemiológicos de acompanhamento	A Região Metropolitana de Campinas (RMC) encontra-se em estado de alerta com risco de surtos de dengue, zika e chikungunya.
Indicadores Sazonais	As condições climáticas registradas durante o período das coletas de campo variam de acordo com o período da campanha. Na atual campanha foi registrado clima frio e seco, por isso foi registrado uma menor abundância de insetos nessa campanha quando comparado com a anterior.

Quadro 4 – Indicadores.

4.2 Resumo das Atividades Anteriores – Histórico

- Elaboração do Plano de Trabalho – Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário – julho-2018;
- Campanha exploratória (Primeira campanha) realizada em setembro 2018 – A partir da fauna de mosquitos (Diptera: Nematocera) encontrada e da ausência de moluscos planorbídeos, não se espera que ocorram casos de Dengue, Zika, Febre Chikungunya, Febre Amarela, Leishmaniose ou Esquistossomose dentro da área diretamente afetada da Barragem Pedreira neste período;
- Segunda Campanha realizada em janeiro de 2019 – Em acordo com os resultados, atesta-se que a região do empreendimento, possui potencial para proliferação de vetores dos grupos Culicidae, Flebotominae e Mollusca, no período da avaliação;
- Terceira Campanha realizada em maio de 2019 – Durante a campanha foi possível observar a presença *Culex quinquefasciatus*, responsável pela transmissão da filariose linfática. O gênero *Anopheles* apresentou *Anopheles albitarsis* que se destaca como principal transmissor da malária. Foram coletados *Haemagogus leucocelaenus*, espécie de suma importância epidemiológica, pois contribui para a manutenção do vírus da febre amarela e *Sabethes albiprivus*, incriminada como vetores secundários de febre amarela, foram capturadas espécies de flebotomíneos onde os gêneros *Nyssomyia* e *Lutzomyia* merecem destaque devido sua importância epidemiológica;
- Nomenclatura dos relatórios – No primeiro quadrimestral a primeira campanha foi denominada somente de “campanha exploratória” e a segunda campanha denominada como primeira, sendo alterado no segundo relatório quadrimestral em função de uma melhor orientação sequencial;
- Quarta Campanha realizada em setembro de 2019 – Houve a captura de 408 dípteros e nenhum registros de caracóis. Observar a presença de diversas espécies de importância epidemiológica como: do gênero *Culex* responsável pela transmissão de filarioses; *Anopheles albitarsis* principal vetor da malária na região Sudeste e; *Nyssomyia whitmani* responsável pela disseminação de Leishmaniose. Também foram registrados exemplares de *Aedes aegypti* e *Haemagogus leucocelaenus* espécies incriminadas na transmissão de febre amarela urbana e Silvestre.
- Quinta Campanha realizada em fevereiro de 2020 - seus dados foram processados no decorrer do mês de março de 2020, onde foi registrado a coleta de 325 indivíduos,

distribuídos em 22 espécies de 04 famílias de dípteros. Observou-se que não houve registro de alta densidade populacional que necessite de controle dos vetores.

- Sexta Campanha realizada em maio de 2020 - seus dados foram processados no decorrer do mês de junho de 2020, onde foi registrado a coleta de 198 indivíduos de dípteros. Observou-se que não houve registro de alta densidade populacional que necessite de controle dos vetores.
- Sétima Campanha realizada em setembro de 2020 - seus dados foram processados no decorrer do mês de outubro de 2020, onde foi registrado a coleta de 340 indivíduos, distribuídos em 25 espécies e 10 famílias de dípteros.
- Oitava Campanha realizada em janeiro de 2021 - seus dados foram processados no decorrer do mês de fevereiro de 2021, onde foi registrado a coleta de 652 dípteros, 99 flebotomíneos e 3 exemplares de molusco de água doce.
- Nona Campanha realizada em maio de 2021 - seus dados foram processados no decorrer do mês de junho de 2021, onde foi registrado a coleta de 198 dípteros, além de 7 indivíduos do molusco *Corbicula flumínea*.
- Decima Campanha realizada em setembro de 2021 - seus dados foram processados no decorrer do mês de outubro de 2021, onde foi registrado a coleta de 351 dípteros.
- Décima Primeira Campanha realizada em fevereiro de 2022 - seus dados foram processados no decorrer do mês de março de 2022, onde foi registrado a coleta de 428 dípteros, além de uma espécie de molusco Planorbideo.
- Décima Segunda Campanha realizada em maio de 2022 - seus dados foram processados no decorrer do mês de março de 2022, onde foi registrado a coleta de 158 dípteros.
- Décima Segunda Campanha realizada em setembro de 2022 - seus dados foram processados no decorrer do mês de novembro de 2022, onde foi registrado a coleta de 103 dípteros.

O **Quadro 5**, apresenta os relatórios quadrimestrais emitidos até o momento.

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
Julho - 2019	Emissão do 1º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
Setembro - 2019	Emissão do 2º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Março - 2020	Emissão do 3º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Maio - 2020	Emissão do 4º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2020	Emissão do 5º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2021	Emissão do 6º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Maio - 2021	Emissão do 7º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2021	Emissão do 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2022	Emissão do 9º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Maio - 2022	Emissão do 10º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2022	Emissão do 11º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.

4.3 Atividades Desenvolvidas no Período

4.3.1 12º Campanha de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário

As atividades de campo da 13ª campanha foram realizadas entre os dias 23 a 25 de setembro de 2022.



Foto 1 – Atividades de campo (23/09/2022).



Foto 2 - Atividades de campo (23/09/2022).



Foto 3 - Atividades de campo, instalação de armadilhas (23/09/2022).




Foto 4 – Vista geral para a área objeto do monitoramento (23/09/2022).

A décima terceira campanha de monitoramento de invertebrados de interesse médico-sanitário, em atendimento aos programas ambientais da construção da Barragem de Pedreira, apresentou uma composição de espécies similar à que já foi encontrada anteriormente. Houve uma diminuição na abundância e riqueza de formas imaturas, mas deve ser ressaltada a continuidade de intensas mudanças na paisagem devido ao avanço das obras. A ocorrência de espécies com potencial de transmissão de doenças continua constante, sendo necessário o monitoramento na área do empreendimento durante o período de construção e implementação da barragem. Assim como já foi registrado anteriormente, as coletas realizadas no período de outono e inverno têm a tendência de apresentar uma menor abundância, sendo que os meses mais frios sabidamente desfavorecem o desenvolvimento dos vetores.

Os dados levantados para essa campanha de monitoramento mostram que há a presença de vetores com potencial de disseminação de doenças, assim como nas campanhas anteriores. A cidade de Campinas e região apresentaram recentemente alerta sobre a transmissão de doenças por arboviroses, incluindo a Dengue, sendo necessário tomar as devidas precauções e medidas a respeito dessas doenças, mesmo que ainda não tenham sido registrados casos para os trabalhadores do empreendimento.

Esses dados são um alerta à saúde pública, pois as espécies registradas são de interesse médico e sanitário, podendo possivelmente trazer riscos à saúde humana. Algumas recomendações são necessárias para que se evite o contato entre ser humano e vetor, sendo elas: o uso de roupas de cores claras onde os insetos não possam se camuflar e que cubram braços e pernas completamente; não é recomendando o uso de perfumes, pois possivelmente pode atrair os vetores; e nem o uso de repelentes a base de icaridina.

Continua não sendo constatada densidade populacional que necessite de um controle químico. Se seguidas às recomendações acima citadas, diminui-se em sua maioria os riscos aos trabalhadores. Além disso, realizar as recomendações de medidas de prevenção e controle apropriadas através de documentos técnicos e informativos, são de extrema importância para sensibilizar os colaboradores da obra, além de evitar a transmissão por falta de informação a respeito das arboviroses urbanas. O relatório completo é apresentado no **ANEXO 0322-01-RQS-0012-001.PMIMS**.

Após finalização da campanha, foi apresentado o Informe Técnico nas secretarias municipais de saúde (Pedreira e Campinas) conforme **ANEXO 0322-01-RQS-0012-002.PMIMS**.

4.4 Planejamento das Próximas Atividades

A próxima campanha de monitoramento de invertebrados de interesse médico sanitário está prevista para janeiro de 2023.

5. CRONOGRAMA - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO

Os quadros abaixo apresentam o cronograma das atividades previstas do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário para os períodos: Ano 1 a Ano 5.

Atividades	Implantação											
	Ano 1											
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Campanhas de Campo - durante a execução da obra	■				■				■			
Campanhas de Campo - durante o enchimento												
Informe Técnico			■			■				■		
Relatório Mensal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relatório Quadrimestral					■				■			

Quadro 6 – Cronograma – Ano 1.

↑
Início da Obra

↑
Início das atividades de desvio do rio.

Atividades	Implantação											
	Ano 2											
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Campanhas de Campo - durante a execução da obra												
Campanhas de Campo - durante o enchimento												
Informe Técnico												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												

Quadro 7 – Cronograma – Ano 2.

Atividades	Implantação											
	Ano 3											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Campanhas de Campo - durante a execução da obra												
Campanhas de Campo - durante o enchimento												
Informe Técnico												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												

Quadro 8 – Cronograma – Ano 3

Atividades	Implantação											
	Ano 4											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Campanhas de Campo - durante a execução da obra												
Campanhas de Campo - durante o enchimento												
Informe Técnico												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												

Quadro 9 – Cronograma – Ano 4.

Atividades	Implantação											
	Ano 5											
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Campanhas de Campo - durante a execução da obra												
Campanhas de Campo - durante o enchimento												
Informe Técnico												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												

Quadro 10 – Cronograma – Ano 5.

LEGENDA

- PREVISTO
- REALIZADO
- REPROGRAMADO
- FINALIZADO

↑
Início do enchimento do reservatório.

↑
Início do enchimento do reservatório.

↑
Início do enchimento do reservatório.



6. ANEXO

ANEXO 0332-01-AS-RQS-0012.01-PMIIMS

ANEXO 0332-01-AS-RQS-0012.02-PMIIMS

ANEXO 0332-01-AS-RQS-0012.01-PMIIMS

13º RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDREIRA

Novembro/2022



PROJETO	13º RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO		
EMPREENDIMENTO	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDREIRA		
CONTRATANTE	DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA		
ELABORAÇÃO	INSITU SERVIÇOS AMBIENTAIS		
Nº DOCUMENTO	OAC.099-2018		
PROJETO 25/09/2022	ENTREGA FINAL 28/11/2022	Nº FOLHAS 31	REV. 0

EQUIPE TÉCNICA	FORMAÇÃO	CONSELHO DE CLASSE	CTF - IBAMA	FUNÇÃO
Amanda S. Oehlmeyer	Bióloga	CRBio 64101/01-D	3925956	Coordenação Contrato
Gustavo G. Creton	M. Veterinário	CRMV-SP 26.916	5053085	Coordenação Campo
Julio A. B. Monsalvo	Biólogo	CRBio 106145/01-D	5533219	Equipe Técnica
Estéfani N. P. Soares	Bióloga	CRBio 116587/01-D	7374696	Equipe Técnica
Welber S. Smith	Biólogo	CRBio 23134/01	267092	Equipe Técnica

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE VETORES	7
2.1. Procedimentos Metodológicos.....	7
2.1.1. Metodologia para Vetores Alados da Ordem Díptera	7
2.1.2. Metodologia para Coleta de Dípteros na forma imatura	8
2.1.3. Metodologia para Filo Mollusca	9
2.1.4. Metodologia de Análise de Dados.....	9
3. RESULTADOS.....	10
3.1. Vetores da Ordem Diptera.....	10
3.2. Moluscos - Família Planorbidae.....	17
3.3. Comparativo entre Campanhas	18
4. DISCUSSÃO	26
4.1. Arboviroses na região metropolitana de Campinas (RMC)	26
4.2. Outras patologias associadas à entomofauna vetora	27
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
6. BIBLIOGRAFIA.....	30

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais o ser humano tem transformado o ambiente no qual está inserido por meio de intervenções que podem causar diversos tipos de alterações. Toda essa transformação e/ou alteração pode trazer mudanças ecológicas, muitas vezes, imprevisíveis. Quando a inserção do ser humano é parte dessa transformação, as relações de cadeia e nicho também mudam, intensificando a relação ser humano e vetor, sendo de extrema importância nesses casos conhecer os animais propagadores de doenças que habitam áreas antropizadas (NUNES et al., 2008).

Não é difícil compreender a relação existente entre a ação do ser humano e o aumento do número de doenças que estão diretamente associadas à interferência e a modificação dos ecossistemas pela ação humana. Mudanças climáticas, desmatamentos, urbanização desenfreada, inchaço das cidades, ausência de água e saneamento básico, além dos deslocamentos populacionais, aumentam o risco de transporte de patógenos ainda não detectados em outras áreas ou novos sorotipos ou cepas mais resistentes de algum vírus já conhecido no local, causando a emergência ou reemergência de uma doença. Esses fatores definem os caminhos das doenças, influenciados pela pressão da mutação viral e de adaptações genéticas dos vírus a hospedeiros, vetores e novos ambientes (OMS, 2016).

Segundo Almeida et al. (2019), o impacto negativo do ser humano no ambiente tem relação direta com a saúde, uma vez que necessitamos dos componentes do meio ambiente para a nossa sobrevivência. É impossível sobreviver sem acesso à água e ao ar, por exemplo. Se esses elementos estão comprometidos, nossa saúde também ficará. O desmatamento também pode levar ao surgimento de doenças em uma população. Isso ocorre porque, ao desmatar, se destrói o habitat de várias espécies, que passam a procurar abrigo e comida nas áreas habitadas pelo ser humano. Entre esses animais, estão os vetores de doenças por arboviroses, como certos mosquitos. As arboviroses são um crescente problema de saúde pública no Brasil e no mundo, principalmente pelo potencial de dispersão, capacidade de adaptação a novos ambientes e hospedeiros, pela possibilidade de causar epidemias extensas, susceptibilidade universal e pela ocorrência de grande número de casos graves, com acometimento neurológico, articular e hemorrágico (ALMEIDA et al., 2019).

As doenças transmitidas por insetos sempre foram motivo de preocupação, por serem de grande importância epidemiológica. No Brasil, assim como em muitos outros países do mundo, essas doenças podem causar debilidade ou evoluir a óbito, por isso a importância dos estudos relacionados a vetores. No passado, a maioria das doenças vectoriais ocorriam em áreas rurais. Porém, com o passar do tempo e o aumento da população em outras áreas, essas doenças passaram a ser transmitidas também no ambiente urbano (TAUIL, 2006).

Os insetos da ordem díptera são vetores muito comuns, justamente por se encontrarem em contato muito próximo aos humanos e estarem amplamente distribuídos no ambiente (THYSSEN et al., 2004). Os dípteros pertencentes ao gênero *Aedes*, *Anopheles* e *Culex*, todos da família Culicidae, são os principais vetores brasileiros de interesse médico sanitário, isso se dá pelo fato de serem os maiores causadores de doenças e estão muito distribuídos pelo país (CONSOLI & OLIVEIRA, 1998; OMS, 2016). Eles podem ser o veículo de patógenos causadores de doenças ao ser humano e aos animais, e várias dessas espécies possuem potencial de transmissão para arbovírus (vírus transmitidos por artrópodes). Sendo assim, a vigilância entomológica é necessária e permite a coleta e avaliação desses vetores para posterior compreensão de como se relacionam com o ser humano e com o meio em que vivem (CARDOSO et al., 2010).

O presente relatório visa atender à exigência ambiental do Contrato: N° 2018/11/00032.2, cujo objetivo é a implantação da Barragem de Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas, com a eficácia e qualidade requeridas. O principal objetivo é monitorar o comportamento da fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário que venham a ocorrer na área de influência da Barragem Pedreira

durante as etapas de planejamento e implantação do empreendimento.

Outros objetivos do programa são: coletar espécies de invertebrados de interesse médico-sanitário na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, utilizando as técnicas de coleta específicas de cada grupo taxonômico monitorado; determinar a composição da fauna de invertebrados ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento e identificar espécies potenciais vetores de patógenos para os seres humanos; vigiar a infestação por espécies invasoras, visando alerta os órgãos de saúde municipal e estadual; propor medidas de controle vetorial para a ADA do empreendimento; e alertar os órgãos de saúde municipal e estadual sobre o risco eminente da ocorrência de surtos.

A 13ª Campanha do Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário teve início com a coleta de dados em campo, entre os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, sendo assim, realizados as triagens e análises de dados dos indivíduos coletados.

Foram delimitados 27 pontos amostrais, conforme proposto no Plano Básico Ambiental, sendo 20 pontos (P1 a P20) para amostragem de dípteros (formas aladas e larvais), apresentados no **Quadro 1** e para amostragem de moluscos límnicos, 7 pontos (P1 a P7), apresentados no **Quadro 2**.

Quadro 1 - Pontos de amostragem de dípteros (formas aladas e larvais) na área diretamente afetada da Barragem Pedreira.

PONTOS	COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000)	
	E	N
1	305.751	7.476.894
2	305.734	7.477.012
3	305.589	7.477.151
4	305.567	7.477.367
5	305.724	7.477.497
6	305.693	7.477.688
7	305.413	7.477.767
8	305.407	7.477.892
9	305.296	7.478.109
10	305.033	7.478.214
11	304.995	7.478.474
12	304.983	7.478.673
13	304.570	7.478.845
14	304.576	7.479.304
15	304.744	7.479.586
16	304.989	7.479.716
17	304.874	7.480.021
18	304.810	7.480.239
19	304.708	7.480.428
20	304.713	7.480.737

Quadro 2 - Pontos de amostragem de moluscos límnicos na área diretamente afetada da Barragem Pedreira.

PONTOS	COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000)	
	E	N
1	305.589	7.477.151
2	305.413	7.477.767

PONTOS	COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000)	
	E	N
3	305.033	7.478.214
4	304.995	7.478.474
5	304.983	7.478.673
6	304.576	7.479.304
7	304.989	7.479.716

A **Figura 1** apresenta todos os pontos de amostragem realizados nessa campanha de monitoramento na área de influência diretamente afetada pela implantação da Barragem Pedreira, tanto para moluscos límnicos como para Diptera (formas aladas e larvais). Contudo, mediante obras e alterações no ambiente, possivelmente nas próximas campanhas, alguns pontos terão sido suprimidos e deverão ser substituídos por outros.




Figura 1: Pontos de amostragem para as formas aladas, formas larvais e moluscos dentro da área do empreendimento.

2. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE VETORES

Muitas epidemias causadas por arbovírus, que são aquelas transmitidas por artrópodes, principalmente os mosquitos, estão disseminadas no país e são casos de preocupação de saúde pública. Entende-se como doença transmitida por vetor aquela que não passa diretamente de uma pessoa para outra, mas requer a participação de artrópodes, principalmente insetos, responsáveis pela veiculação biológica de parasitos e micro-organismos a outros seres vivos. Temos como exemplos a febre amarela, a dengue, a Chikungunya, a zika, a malária, o tifo, dentre tantas outras que infectam os seres humanos e podem levar a morte. Dois fatores são os principais responsáveis pelos altos índices dos casos dessas doenças, o primeiro está associado ao pouco interesse das autoridades administrativas e o segundo ao desequilíbrio ambiental causado por ações antrópicas desenfreadas que levam à proliferação de artrópodes vetores de doenças.

Os invertebrados, de maneira geral, em condições naturais distribuem-se em comunidades estáveis e completamente equilibradas com as variáveis do ecossistema como um todo. Dessa forma, o surgimento de muitas epidemias estaria diretamente relacionado a problemas de ecologia humana que causam a introdução, acidental ou planejada, do ser humano ou do agente infeccioso em regiões onde os componentes da cadeia epidemiológica ainda são desconhecidos para ciência. Os dípteros possuem um complexo sistema de glândulas salivares e é esse sistema que permite que vírus, protozoários e outras formas de vida se utilizem deles como veículos de transmissão até os hospedeiros vertebrados (REITER, 2001; ALMEIDA et al., 2019).

A construção de uma barragem desloca contingente de mão-de-obra, o que pode levar a migração de pessoas contaminadas de outras regiões do estado e/ou país; a água estagnada é ideal para a proliferação de larvas de insetos; o desmatamento realizado na área de implantação pode provocar a movimentação de animais silvestres, que são reservatórios naturais de várias doenças (PIGNATTI, 2004). Nesses empreendimentos, a preocupação é relevante, tendo em vista suas peculiaridades como fatores determinantes para a transmissão de doenças veiculadas por vetores. A provável migração populacional e as condições sanitárias nos locais onde as obras se implantam, aliadas ao clima tropical e à temperatura quente, constituem um ambiente propício a propagação de enfermidades, criando condições que podem aumentar o risco de doenças transmitidas principalmente por vetores.

Nesse contexto, o monitoramento de vetores é de suma importância, assim como a observação de prováveis alterações nas áreas de intervenções antrópicas. Sendo que, através do monitoramento é possível tomar medidas a respeito de proliferações e possíveis contágios para o ser humano.

2.1. Procedimentos Metodológicos

As metodologias utilizadas na etapa de campo foram realizadas com base no documento de Estudo de Impacto Ambiental elaborado em 2015. A eficácia e eficiência das armadilhas empregadas foram selecionadas de acordo com o grupo taxonômico e sua fase de desenvolvimento, que compreende a forma alada e a forma imatura dos Diptera, além das armadilhas empregadas para o filo molusco.

2.1.1. Metodologia para Vetores Alados da Ordem Díptera

A Ordem Díptera, que inclui moscas e mosquitos, apresenta notoriedade devido ao fato de serem vetores de importantes doenças da espécie humana, como a malária, arbovirose e filaríose linfáticas, responsáveis por elevadas taxas de morbidade e mortalidade. Dentre os dípteros, as famílias Culicidae, Psychodidae (subfamília Phlebotominae), Simuliidae e Ceratopogonidae se destacam por serem potenciais vetores mecânicos de patógenos, pois possuem o comportamento

endofílico (entra na casa para picar) e uma grande capacidade de dispersão. Para a captura de dípteros alados, foi utilizada a técnica de armadilha luminosa do tipo CDC.

O uso das armadilhas CDC permite uma padronização dos dados de coleta. Foram utilizadas 20 armadilhas instaladas em 20 pontos amostrais baseados no Plano Básico Ambiental, onde ficam expostas e posicionadas de forma intercaladas a 1.5 metros do solo e a 30 cm do solo, funcionando durante toda a noite, entre o período das 17h às 22h da manhã do dia seguinte, por duas noites consecutivas (**Fotos 1 e 2**).

Além da utilização de armadilhas luminosas, foram realizadas buscas ativas no período das 09h às 15h, para contemplar espécies de hábitos diurnos, empregando atrativo humano em extradomicílio, peridomicílio e intradomicílio.



Foto 1 - Instalação da armadilha do tipo CDC.
(Data: 23/09/2022).



Foto 2 - Instalação da armadilha do tipo CDC.
(Data: 23/09/2022).

2.1.2. Metodologia para Coleta de Dípteros na forma imatura

Para a captura de imaturos, foram determinados 20 pontos amostrais no Plano Básico Ambiental (PBA0 para o Programa, os mesmos utilizados para a instalação de armadilhas do tipo CDC.

Para a coleta de material, foi utilizada concha entomológica com cabo de 100 cm, com copocoletor medindo 11 cm de diâmetro e volume de 350 ml na cor branca. Essa técnica de coleta se destinou a descrever os principais criadouros das espécies da família Culicidae existentes na área de estudo. O modo de se proceder durante a pesquisa larvária foi a mesma em todos os pontos de pesquisa. Para criadouros pequenos e médios, foram considerados pontos a cada cinco metros. Enquanto, para coleções hídricas, como rios, córregos e represas, os pontos de pesquisa foram distribuídos principalmente onde a vegetação se apresentava mais abundante e relativamente estável.

Em cada ponto de pesquisa foram efetuadas nove “conchadas”, com o pesquisador posicionado de frente e junto à margem do criadouro, sendo três lances à direita, três à frente e outros três à esquerda, respeitando um raio de um metro do ponto fixado pelo pesquisador, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde descritas na Nota Técnica nos 012 - CGPNM/DIGES/SVS/MS, de 04 de junho de 2007.

Após a utilização das técnicas de coleta, as espécies foram separadas e acondicionadas em

recipientes com álcool 70% para o transporte ao laboratório, para posterior identificação.

A seguir, são apresentadas as fotos das atividades realizadas durante a 13ª campanha, entre os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022.

2.1.3. Metodologia para Filo Mollusca

Entre as classes pertencentes ao Filo Mollusca, merece destaque pela sua importância médica a classe Gastropoda, que constitui cerca de $\frac{3}{4}$ do número total de espécies do filo e inclui os transmissores da esquistossomose e de outras helmintoses, como espécies consideradas pragas de diferentes cultivos. No Brasil, as principais doenças às quais os moluscos se relacionam são a esquistossomose, a fasciolose e a angiostrongilose abdominal. As principais famílias de importância médica pertencem à Ordem Basommatophora, a qual engloba: Chiliniidae, Lymnaeidae, Physidae, Ancyliidae e Planorbidae.

A coleta de moluscos límnicos seguiu a metodologia já estabelecida durante o Estudo de Impacto Ambiental de 2015, em que foram selecionados sete pontos amostrais já indicados na **Figura 1**. Além disso, foram priorizados os criadouros de importância epidemiológica, considerando algumas características, como frequência da população humana ao local e a possibilidade de ocorrência de moluscos do Gênero *Biomphalaria* com as formas infectantes de *S. mansoni*.

Nos locais de fácil acesso e boa visibilidade, utilizou-se a coleta por concha (**Foto 3 e 4**). Em cada estação foram realizadas dez “conchadas”, buscando coletar o maior número possível de caramujos em locais com vegetação aquática e/ou marginal (SVS-MS, 2008).

Para os sete pontos de amostragem, foram aferidas temperatura da água e nível do pH através de uma sonda multiparâmetro modelo Oakon PCD160.



Foto 3 - Metodologia aplicada à coleta de moluscos (Data: 23/09/2022).



Foto 4 - Metodologia aplicada à coleta de moluscos (Data: 24/09/2022).

2.1.4. Metodologia de Análise de Dados

As identificações taxonômicas para os dípteros foram realizadas através de chaves dicotômicas de

referência:

- a) Culicidae: foram realizadas através de chave dicotômica de referência CONSOLI & OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2002;
- b) Psychodidae (Subfamília Phlebotominae): a identificação foi realizada com o auxílio de microscópio, os exemplares foram separados em morfoespécies e identificados através de chave ilustrada de referência produzida por SHIMABUKURO et al 2011;
- c) Ceratopogonidae: os exemplares foram identificados com base em literatura especializada BENCHIMOL & SÁ, 2006;
- d) Simuliidae: os exemplares foram identificados através de chave dicotômica especializada de PEPINELLI, 2008;
- e) Já para os Moluscos, a identificação seguiu o guia de Vigilância e Controle de Moluscos de Importância Médica, Brasil, 2009;
- f) Para as demais famílias coletadas, a identificação foi através de chaves de identificação disponíveis na internet, além de especialistas da área.

A análise ecológica dos dados obtidos nesse estudo compreende apenas as métricas de riqueza e abundância, que são de fato aquelas que mais agregam valor. No entanto, para esse grupo em específico, não representam estimável valor interpretativo, uma vez que o foco principal está em relatar as condições que podem favorecer a relação parasita- hospedeiro aliado às possibilidades do surgimento de doenças, dentro de um gradiente que terá por algum motivo suas configurações naturais modificadas. A análise compreende também um comparativo entre campanhas para acompanhar o aumento ou não das espécies amostradas em cada época do ano. Além de uma análise de similaridade, para avaliar se o índice de abundância e de espécies tem mantido um padrão e são similares, ou se variam muito e apresentam divergências conforme a época do ano em que é realizada a campanha de campo.

3. RESULTADOS

3.1. Vetores da Ordem Diptera

Nessa campanha foram coletados ao todo 103 indivíduos (apenas formas aladas), distribuídos em 11 espécies e seis famílias de dípteros. As espécies *Aedes* sp., *Bradysia* sp. e *Brumptomya* sp. foram as que apresentaram o maior número de indivíduos coletados (N=23, N=15 e N=15, respectivamente). Na Tabela 1, está apresentada a lista geral de dípteros vetores, assim como o número de indivíduos capturados durante a 13ª campanha de monitoramento de invertebrados de importância médica.

Das 11 espécies coletadas, todos os indivíduos puderam ser classificados em fêmeas e machos, uma vez que não houve amostras de indivíduos na forma imatura. Para a fase adulta, as espécies *Brumptomya* sp.; *Bradysia* sp. e *Dixella* sp. apresentaram mais de 50% de fêmeas coletadas (89%, 55% e 55%, respectivamente).

Quadro 1: Relação de espécies da entomofauna coletadas na 13ª campanha de monitoramento de invertebrados de interesse médico-sanitário. Relação de táxons e famílias com respectivas fases de desenvolvimento, frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e percentual de fêmeas entre os exemplares capturados.

Espécie	Família	Fase	FA	FR	% de Fêmeas
<i>Aedes</i> sp.	Culicidae	Adulto	23	22,3	25
<i>Anopheles</i> sp.	Culicidae	Adulto	9	8,7	32
<i>Bradysia</i> sp.	Sciaridae	Adulto	15	14,6	55
<i>Brumptomya</i> sp.	Phlebotominae	Adulto	15	14,6	89
<i>Culex declarator</i>	Culicidae	Adulto	7	6,8	45
<i>Culex</i> sp.	Culicidae	Adulto	1	1,0	23
<i>Culicoides albicans</i>	Ceratopogonidae	Adulto	1	1,0	12
<i>Dixella</i> sp.	Dixidae	Adulto	13	12,6	55
<i>Evandromyia lenti</i>	Phlebotominae	Adulto	11	10,7	34
<i>Psathyromyia aragaoui</i>	Phlebotominae	Adulto	6	5,8	23
<i>Simulium</i> sp.	Simuliidae	Adulto	2	1,9	27
Total			103	100,0	

Em relação ao número de espécies, a família Culicidae foi que obteve o maior número, representada por 4 espécies, a Phlebotominae por 3 espécies, e as famílias Ceratopogonidae, Dixidae, Sciaridae e Simuliidae apresentaram uma espécie cada.

Para os dados de abundância, a família Culicidae apresentou o maior índice, com 40 indivíduos, representando 39% de exemplares capturados; seguida das famílias Phlebotominae com 32 indivíduos, representando 31% dos exemplares capturados, Sciaridae com 15 indivíduos, representando 14%, Dixidae com 13 indivíduos, representando 13% dos exemplares capturados, Simuliidae com 2 indivíduos, representando 2% dos exemplares capturados e por fim a família Ceratopogonidae com apenas um indivíduo, representando 1%; exemplares capturados.

Os **Gráficos 1 e 2** apresentam, respectivamente, a distribuição da riqueza e abundância entre as famílias de dípteros vetores (forma alada).




Gráfico 1: Distribuição da riqueza em porcentagem entre as famílias da entomofauna vetora (forma alada).




Gráfico 2: Representação percentual da abundância das famílias da entomofauna vetora (forma alada).

Quanto à eficiência das metodologias empregadas, as armadilhas do tipo CDC foram as que registraram um maior número de espécies e de indivíduos capturados (riqueza=11, abundância 76), capturando com mais eficiência os vetores no estágio adulto.

O **Quadro 2**, a seguir, nos mostra a relação de cada família e o número de indivíduos coletados com o tipo de metodologia empregada.

Quadro 2: Famílias de Diptera identificados na área diretamente afetada da Barragem de Pedreira, com número total de indivíduos e métodos de coleta.

Famílias	Número de indivíduos	Método de Coleta
Ceratopogonidae	1	CDC
Culicidae	40	CDC
Dixidae	13	CDC
Phlebotominae	32	CDC
Sciaridae	15	CDC
Simuliidae	2	CDC

A relação de abundância e riqueza entre as metodologias empregadas está expressa no **Gráfico 3**.




Gráfico 3: Comparativo entre os índices de abundância e riqueza das metodologias de coleta empregadas.

Para a metodologia de armadilhamento do tipo CDC, foram capturados 76 indivíduos distribuídos em 11 espécies e seis famílias. *Dixella* sp., *Aedes* sp., e *Evandromyia lenti* foram as espécies que apresentaram um maior número de capturas (N=13, N=11 e N=11). A espécie *Dixella* sp. foi a que apresentou maior distribuição entre as armadilhas CDC e esteve presente em 7 delas. Nenhuma espécie ocorreu em todos os pontos de captura.

Quando comparados os pontos amostrais por armadilhamento do tipo CDC, P1 foi o que apresentou a maior riqueza, com 5 espécies coletadas. A maior abundância foi registrada nos P1, P15 e P19, com 10, 8 e 8 indivíduos coletados em cada um deles. A abundância para os demais pontos variou de um a 7 indivíduos por ponto amostrado.

O **Gráfico 4** demonstra a distribuição de riqueza e abundância nos 20 pontos amostrais para

armadilha luminosa do tipo CDC.




Gráfico 4: Distribuição de riqueza e abundância nos pontos amostrais com armadilha CDC.

Quanto aos dados de captura armadilha-noite, o 1º dia amostral (23/09/2022) representou o maior número de captura, com 37 indivíduos. Os demais dias apresentaram 21 indivíduos no 2º dia (24/09/2022) e 18 indivíduos para o 3º dia amostrado (25/09/2022). O **Quadro 3** apresenta a relação de capturas por armadilha-noite e o **Quadro 4** apresenta as médias de frequência e indicadores entomológicas por ponto amostral.

Quadro 3: Relação de espécies coletadas por armadilha-noite utilizando CDC.

Espécie	23/set	24/set	25/set	Total	FR
<i>Aedes sp.</i>	8	2	1	11	14,5
<i>Anopheles sp.</i>	4	4	1	9	11,8
<i>Bradysia sp.</i>	1	0	9	10	13,2
<i>Brumptomya sp.</i>	3	1	1	5	6,6
<i>Culex declarator</i>	3	4	0	7	9,2
<i>Culex sp.</i>	1	0	0	1	1,3
<i>Culicoides albicans</i>	0	0	1	1	1,3
<i>Dixella sp.</i>	6	5	2	13	17,1
<i>Evandromyia lenti</i>	7	3	1	11	14,5
<i>Psathyromyia aragaoi</i>	3	2	1	6	7,9
<i>Simulium sp.</i>	1	0	1	2	2,6
TOTAL	37	21	18	76	100,0

+

Quadro 4: Relação de espécies coletadas por ponto amostral utilizando armadilha CDC. Indicadores entomológicos expressos: Cálculo de média horaria (CMH) e índice de picada/hora/homem (IPHH).

Espécie	CDC 1	CDC 2	CDC 3	CDC 4	CDC 5	CDC 6	CDC 7	CDC 8	CDC 9	CDC 10	CDC 11	CDC 12	CDC 13	CDC 14	CDC 15	CDC 16	CDC 17	CDC 18	CDC 19	CDC 20	Total	CMH
<i>Aedes sp.</i>	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	11	0,46
<i>Anopheles sp.</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0,38
<i>Bradysia sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	10	0,42
<i>Brumptomya sp.</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	5	0,21
<i>Culex declarator</i>	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0,29
<i>Culex sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,04
<i>Culicoides albicans</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,04
<i>Dixella sp.</i>	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	1	13	0,54
<i>Evandromyia lenti</i>	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	11	0,46
<i>Psathyromyia aragaoi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	6	0,25
<i>Simulium sp.</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,08
TOTAL	10	4	1	0	6	7	2	4	4	3	0	2	5	3	8	2	1	4	8	2	76	
IPH	0,21	0,08	0,02	0,00	0,1	0,15	0,04	0,08	0,08	0,06	0,00	0,04	0,10	0,06	0,17	0,04	0,02	0,08	0,17	0,04		

A análise de agrupamento mostrou que os pontos P2, P8, P9 e P18 formaram um grupo que apresenta características mais similares entre si quanto à composição taxonômica de riqueza e abundância dos dípteros vetores coletados. Além desse grupo, houve outros agrupamentos com os pontos P7, P12 e P16, P3 e P17 e P4 e P11. Os agrupamentos estão ilustrados **Gráfico 5**.




Gráfico 5: Agrupamentos apresentados através de dendrograma (índice Bray -Curtis/ Cophen. Corr.: 0,982).

Quanto ao esforço amostral, a curva de rarefação de acumulação de espécies apresentou estabilidade no número de espécies para as últimas campanhas, porém o aumento do esforço amostral pode tender ao aumento do número de espécies.




Gráfico 6: Curva de rarefação com intervalos de 95% de confiança.

A temperatura é considerada um dos fatores ambientais mais importantes para a atividade de insetos, além de interferir diretamente no desenvolvimento de sua população. A temperatura ótima para o desenvolvimento de um inseto está próxima de 25 °C e, em geral, corresponde ao desenvolvimento mais rápido e de maior número de descendentes.

O **Quadro 5** apresenta os valores médios obtidos para as variáveis temperatura da água, pH e temperatura do ar, analisados em cada ponto amostrado para moluscos durante a atual campanha, se apresentando dentro do que é esperado pela Resolução CONAMA 357/2005.

Quadro 5: Médias dos dados abióticos mensurados na 13ª campanha, com respectivos desvios padrões, temperatura da água, pH e temperatura do ar.

	°C t. água	pH	°C t. ar
13ª campanha	24,2± 1,3	7	25,1 ± 1,7

3.2. Moluscos - Família Planorbidae

Nesta campanha não foi amostrado nenhum indivíduo de molusco para nenhum dos pontos amostrais, o que reforça a diminuição destes indivíduos desde as últimas campanhas, fator que provavelmente tem relação com o impacto que as obras causaram nos ambientes aquáticos de suas proximidades ao canteiro de obras, onde grande parte da água desses locais estão praticamente inexistentes, com lagos isolados e quase secos por completo.

O **Quadro 6** expressa os dados de abundância e riqueza de moluscos das 13 campanhas de monitoramento e o Gráfico 7 ilustra essas informações.

Quadro 6: Relação de espécies de moluscos coletadas e número de indivíduos por campanha.

Espécie	1ªC	2ªC	3ªC	4ªC	5ªC	6ªC	7ªC	8ªC	9ªC	10ªC	11ªC	12ªC	13ªC
<i>Biomphalaria glabrata</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Biomphalaria occidentalis</i>	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Biomphalaria tenagrophila</i>	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Biomphalaria straminea</i>	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Biomphalaria peregrina</i>	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbicula fluminea</i>	0	0	0	0	0	11	16	3	7	2	3	0	0
<i>Drepanotrema cimex</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Drepanotrema lucidum</i>	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Gráfico 7: Espécies de moluscos registradas ao longo das treze campanhas de monitoramento. As campanhas 1, 4, 5 e 12 não estão presentes no gráfico devido não terem registros de insetos vetores durante o monitoramento.

3.3. Comparativo entre Campanhas

Em relação aos resultados obtidos na campanha anterior, a composição taxonômica foi a mesma já registrada em outras campanhas, porém, com um menor número de espécies. Não foram registrados indivíduos capturados na forma imatura. Vale ressaltar que continua havendo uma significativa alteração da paisagem, que vem se modificando intensamente no canteiro de obras, diminuindo as áreas alagadas e a ocorrência de formas larvais.

Todas as famílias, assim como todas as espécies registradas para essa campanha, já haviam sido registradas em campanhas anteriores. Sendo as famílias com maior interesse médico-sanitário as Culicidae, Phlebotominae e Simuliidae, já que foram registradas anteriormente e continuaram ocorrendo nessa campanha. Das famílias registradas, essas são as que possuem maior incidência

de potencial para doenças.

O **Quadro 7** apresenta os dados de abundância e riqueza das 13 campanhas realizadas.

O **Quadro 8** mostra a relação com a sazonalidade, em quais época do ano as campanhas foram realizadas e o índice de espécies por campanha. Pode-se observar que as espécies coletadas nessa campanha são similares às coletadas na última campanha realizada.

Quadro 7: Índices de abundância e riqueza registrados nas 13 campanhas de campo para as famílias de vetores alado.

Famílias	1º Campanha	2º Campanha	3º Campanha	4º Campanha	5º Campanha	6º Campanha	7º Campanha	8º Campanha	9º Campanha	10º Campanha	11º Campanha	12º Campanha	13º Campanha
Ceratopogonidae	A=0	A=0	A=2	A=72	A=51	A=30	A=12	A=15	A=0	A=33	A=6	A=1	A=1
	R=0	R=0	R=1	R=2	R=2	R=2	R=4	R=1	R=0	R=2	R=1	R=1	R=1
Chaoboridae	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=12	A=19	A=15	A=0	A=0	A=0	A=0
	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=2	R=1	R=1	R=0	R=0	R=0	R=0
Culicidae	A=2	A=2.868	A=46	A=167	A=132	A=91	A=34	A=182	A=38	A=129	A=255	A=85	A=40
	R=1	R=32	R=8	R=19	R=14	R=14	R=10	R=10	R=7	R=9	R=14	R=7	R=4
Dixidae	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=129	A=111	A=0	A=80	A=45	A=25	A=13
	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=1	R=1	R=0	R=1	R=1	R=1	R=1
Phlebotominae	A=0	A=847	A=119	A=78	A=76	A=54	A=72	A=99	A=42	A=40	A=70	A=20	A=32
	R=0	R=15	R=12	R=5	R=4	R=5	R=3	R=3	R=3	R=3	R=5	R=3	R=3
Psychodidae	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=1	A=0	A=11	A=0	A=0	A=0	A=0
	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=1	R=0	R=1	R=0	R=0	R=0	R=0
Sciaridae	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=22	A=216	A=37	A=54	A=47	A=16	A=15
	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=2	R=2	R=2	R=1	R=1	R=1	R=1
Simuliidae	A=0	A=0	A=0	A=80	A=66	A=23	A=6	A=10	A=22	A=10	A=5	A=6	A=2
	R=0	R=0	R=0	R=2	R=2	R=2	R=1	R=1	R=1	R=2	R=1	R=1	R=1
Thripidae	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=0	A=4	A=0	A=14	A=0	A=0	A=0	A=0
	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=0	R=1	R=0	R=1	R=0	R=0	R=0	R=0

Quadro 8: Relação de espécies e sazonalidade da entomofauna vetora coletadas durante as 13 campanhas de monitoramento de invertebrados de importância médico-sanitária.

Táxon	Inverno	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera
	ago/18	jan/19	mai/19	set/19	fev/20	mai/20	set/20	jan/21	mai/21	set/21	fev/22	mai/22	set/22
	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C 10	C 11	C 12	C 13
<i>Aedes aegypti</i>		X	X	X	X	X		X		X	X	X	
<i>Aedes sp.</i>							X	X	X		X	X	X
<i>Aedes albopictus</i>		X	X										
<i>Aedes fluviatilis</i>		X											
<i>Aedes scapularis</i>		X											
<i>Anophele bellator</i>		X											
<i>Anopheles albitarsis</i>		X	X	X		X							
<i>Anopheles aquasalis</i>		X											
<i>Anopheles complexo strodei</i>		X											
<i>Anopheles cruzii</i>		X											
<i>Anopheles darlingi</i>		X											
<i>Anopheles minor</i>				X	X	X		X		X			
<i>Anopheles quadrimaculatus</i>				X		X	X	X	X		X		
<i>Anopheles trianulatus</i>		X		X	X	X							
<i>Anophles oswaldoi s.l</i>		X											
<i>Anopheles sp.</i>							X		X			X	X
<i>Bradysia sp.</i>							X	X	X	X	X	X	X
<i>Brumptomya sp.</i>				X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ceratopogonidae							X						
<i>Chaoborus sp.</i>							X	X	X				
Chironomidae							X		X				
<i>Coquillettidia sp.</i>		X	X	X									
<i>Coquillettidia venezuelensis</i>		X											

Táxon	Inverno	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera
	ago/18	jan/19	mai/19	set/19	fev/20	mai/20	set/20	jan/21	mai/21	set/21	fev/22	mai/22	set/22
	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C 10	C 11	C 12	C 13
<i>Culex</i> sp.	X						X		X		X	X	X
<i>Culex bidens</i>				X	X					X			
<i>Culex chidesteri</i>		X											
<i>Culex coronator</i>				X	X	X	X	X	X	X			
<i>Culex davisii</i>				X									
<i>Culex declarator</i>		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
<i>Culex mausensis</i> <i>cf.</i>		X											
<i>Culex melanoconion</i>		X											
<i>Culex nigripalpus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Culex pilosus</i>		X											
<i>Culex quinquefasciatus</i>		X	X	X	X	X			X				
<i>Culex saltanensis</i>		X											
<i>Culicoides albicans</i>				X	X	X	X	X		X	X	X	X
<i>Culicoides furens</i>				X	X	X	X			X			
<i>Culicoides maruim</i>			X										
<i>Culicoides</i> sp.							X						
<i>Dixella</i> sp.							X	X		X	X	X	X
<i>Echinothrips caribeanus</i>							X						
<i>Evandromyia cortelezii</i>		X											
<i>Evandromyia cortelezii-sallesii</i>			X										
<i>Evandromyia lenti</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Evandromyia termitophila</i>		X											

Táxon	Inverno	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera
	ago/18	jan/19	mai/19	set/19	fev/20	mai/20	set/20	jan/21	mai/21	set/21	fev/22	mai/22	set/22
	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C 10	C 11	C 12	C 13
<i>Expapillata firmatoi</i>			X										
<i>Haemagogus leucocelaenus</i>		X			X	X	X	X			X	X	
<i>Haemagogus albomaculatus</i>				X							X		
<i>Haemagogus janthinomys</i>		X	X	X						X			
<i>Lycoriella</i> sp.							X	X	X				
<i>Limatus durhamii</i>				X	X			X			X		
<i>Lutzomyia longipalpis</i>		X	X	X	X	X				X	X		
<i>Mansoni titillans</i>		X											
<i>Mansonia humeralis</i>		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Migonemyia migonei</i>			X										
<i>Mochlonyx</i> sp.							X						
<i>Nyssomyia neivai</i>		X											
<i>Nyssomyia neivai</i>			X										
<i>Nyssomyia whitmani</i>		X	X	X	X	X			X		X	X	
<i>Ochlerotatus condolecens</i>				X									
<i>Ochlerotatus scapularis</i>				X	X	X			X	X	X		
<i>Pintomyia fischeri</i>		X	X										
<i>Pintomyia mamedei</i>		X											
<i>Pintomyia monticola</i>			X										

Táxon	Inverno	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera
	ago/18	jan/19	mai/19	set/19	fev/20	mai/20	set/20	jan/21	mai/21	set/21	fev/22	mai/22	set/22
	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C 10	C 11	C 12	C 13
<i>Pintomyia pessoai</i>			X										
<i>Psathyromyia abonnenci</i>		X											
<i>Psathyromyia aragaoi</i>				X		X	X	X			X	X	X
<i>Psathyromyia brasiliensis</i>		X											
<i>Psathyromyia pascalei</i>			X										
<i>Psathyromyia shannoni</i>		X											
<i>Psorophora ferox</i>			X	X	X								
<i>Psychoda</i> sp.							X		X				
<i>Psychodopygus ayrozai</i>			X										
<i>Runchomyia reversa</i>		X											
<i>Sabethes albiprivus</i>		X	X										
<i>Sabethes pupureus</i>		X											
<i>Sabethes ridentatus</i>		X											
<i>Shannoniana fluviatilis</i>		X											
<i>Simulium pertinax</i>				X	X	X			X				
<i>Simulium</i> sp.							X	X			X	X	X
<i>Simulium subpallidum</i>				X	X	X							
<i>Uranotaenia geometrica</i>				X	X								
<i>Uranotaenia lowi</i>				X									

Táxon	Inverno	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera	Verão	Outono	Primavera
	ago/18	jan/19	mai/19	set/19	fev/20	mai/20	set/20	jan/21	mai/21	set/21	fev/22	mai/22	set/22
	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C 10	C 11	C 12	C 13
TOTAL = 83	1	42	21	30	22	21	25	19	18	18	23	15	11

4. DISCUSSÃO

A décima terceira campanha de monitoramento de invertebrados de interesse médico-sanitário, em atendimento aos programas ambientais da construção da Barragem de Pedreira, apresentou uma composição de espécies similar à que já foi encontrada anteriormente. Houve uma diminuição na abundância e riqueza de formas imaturas, mas deve ser ressaltada a continuidade de intensas mudanças na paisagem devido ao avanço das obras. A ocorrência de espécies com potencial de transmissão de doenças continua constante, sendo necessário o monitoramento na área do empreendimento durante o período de construção e implementação da barragem. Assim como já foi registrado anteriormente, as coletas realizadas no período de outono e inverno têm a tendência de apresentar uma menor abundância, sendo que os meses mais frios sabidamente desfavorecem o desenvolvimento dos vetores (RIBEIRO et al., 2006; JEZUS et al., 2020).

4.1. Arboviroses na região metropolitana de Campinas (RMC)

As arboviroses estão entre as principais doenças de importância epidemiológica. Arbovírus (Arthropod-borne virus) se trata do vírus em que parte de sua replicação é realizada em determinados insetos que transmitem esse vírus aos homens e a outros animais. Isso ocorre por meio da picada desses insetos, que se tratam de artrópodes hematófagos e são os que transmitem aos humanos por volta de 150 arbovírus que causam doenças, dentre mais de 500 espécies de arbovírus conhecidas (LOPES et al., 2014).

Uma das arboviroses mais importantes é a Dengue, sendo que o vírus (DENV) apresenta quatro sorotipos denominados DENV-1 a DENV-4. A transmissão dessas arboviroses ocorre através do mosquito *Aedes aegypti*. Trata-se de uma das doenças de maior importância no Brasil e atinge pessoas de todas as idades, podendo causar grande debilidade nos pacientes. Segundo Jezus et al. (2020), o mosquito do gênero *Aedes* é um mosquito oportunista que vai acompanhar o homem sempre. Onde, quanto maior o número de criadouros e de pessoas para picar, ali ele estará presente.

Outra doença de importância epidemiológica no Brasil é a causada pelo vírus Zika, desde o ano de 2015 e tendo se alastrado pelo país desde então. É transmitida pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*, que ocorrem em todo o país (JEZUS et al., 2020). Causa uma grave febre, sendo que pode ocorrer óbito pelo agravo da doença. Uma de suas características mais marcantes é a associação aos casos de microcefalia, quando a gestante é acometida pela doença, e demais manifestações neurológicas em pacientes adultos.

Já a Chikungunya, produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), também é transmitida por mosquitos do gênero *Aedes*, que têm aumentado nas Américas devido a constantes mudanças climáticas, desmatamento e aumento das cidades (DONALISIO et al., 2017). Uma característica marcante dessa doença é que ela pode persistir por anos, além disso, raramente e somente em formas mais graves, essa doença leva os pacientes à óbito. O aumento no número dessas arboviroses se deve muito às mudanças climáticas e a intervenções antrópicas, como desmatamentos, construções civis, aumento na concentração de entulhos etc.

Segundo Boletim Epidemiológico-Ministério da Saúde (2021), os casos de Dengue notificados em 2021 para o Estado de São Paulo foram de 60.700 casos para Dengue, 2.200 casos para Chikungunya, 26 casos para Zika e 19 casos registrados para febre amarela, havendo a necessidade de maior cuidado e controle. Esses números podem ser maiores, levando em consideração os casos de Covid-19, que podem acabar atrasando a divulgação dos boletins de arboviroses, assim como as pessoas podem possuir receio em procurar uma unidade de saúde por conta da pandemia.

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) encontra-se em estado de alerta com risco de surtos

de Dengue, Zika e Chikungunya. Segundo boletim do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), por meio do Programa Municipal de Controle de Arboviroses, o município registrou, de 1º de janeiro até 14 de junho de 2021, 1.794 casos confirmados de Dengue. Com o coeficiente de incidência de 147 casos para cada 100 mil habitantes, não há registro de óbitos por Dengue entre os moradores do município. De acordo com a DEvisa, no período abrangido pela pesquisa, a região com maior número de casos é a Sudoeste, com 418; seguida pela Norte, com 412; e em terceiro, a região Sul, com 392 casos. As regiões Leste e Noroeste registraram, respectivamente, 334 e 238 casos confirmados para Dengue. Já para as doenças Chikungunya e Zika nesse período, foram registrados 87 e 9 casos confirmados, respectivamente. Recentemente, a cidade de Campinas divulga um alerta sobre o risco de transmissão de Dengue em 10 bairros da cidade.

Quadro 9: Dados Gerais de doenças causadas por arbovírus no Estado de São Paulo e Região Metropolitana de Campinas (RMC) – para o ano de 2021. Atualizado em janeiro de 2022 (SINAN).

Doença	Estado de São Paulo	RMC	Percentual
Dengue	60.700	1.794	2,95%
Febre Hemorrágica	0	0	0,0%
Chikungunya	2.200	87	3,95%
Zika	26	9	34,61%
Febre amarela	19	0	0,00%

4.2. Outras patologias associadas à entomofauna vetora

Nessa décima terceira campanha de monitoramento, foram registrados, assim como anteriormente, indivíduos das famílias Phlebotominae, Simuliidae e Culicidae, que são consideradas famílias disseminadoras de doenças. Os gêneros considerados de maior importância médica-veterinária no Brasil são: *Aedes*, *Culex*, *Ochlerotatus*, *Anopheles*, *Haemagogus*, *Psorophora*, *Sabethes* e *Limatus*. Sendo que, os cinco primeiros foram registrados nessa campanha de monitoramento, assim como na décima campanha. Os gêneros *Aedes* e *Culex* são mais adaptados à urbanização.

Também foram capturados indivíduos do gênero *Culex*, responsáveis pela disseminação de doenças como a malária. Essa doença ressurgiu no final do século XX e é de grande importância epidemiológica, chegando a causar 445.000 mortes e mais de 200 milhões de casos no mundo durante o ano de 2016 (ASHLEY et al., 2018). É uma doença tropical e a maioria dos casos da América do Sul vêm de áreas da Floresta Amazônica, sendo a maioria causada pelo *Plasmodium vivax* (FERREIRA & CASTRO, 2016). A Leishmaniose trata-se de outro grande problema de saúde pública no Brasil, também sendo transmitida pelos mosquitos do gênero *Culex*, que vêm sendo constantemente capturados nas campanhas de monitoramento. Além disso, o *Culex* transmite, por exemplo, a febre do Nilo Ocidental, a febre de Mayaro e a encefalite de Saint Louis, sendo o maior perigo dessa espécie a transmissão da febre amarela (LORENZ et al., 2020).

As outras transmissões por vetores dependem da circulação das pessoas contaminadas, pois não é o mosquito que faz o vírus se movimentar, mas sim o ser humano, seja através do trabalho, viagens ou pelas rotas de êxodo pelo país. Dessa forma, diversos dos indivíduos coletados compreendem os gêneros *Culex*, *Anopheles*, *Aedes* sp., *Simulium* e os flebotomíneos, que são responsáveis pela transmissão de doenças, mostrando a importância de se continuar o monitoramento a fim de se identificar possíveis riscos para a população presente na área de estudo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados levantados para essa campanha de monitoramento mostram que há a presença de vetores com potencial de disseminação de doenças, assim como nas campanhas anteriores. A cidade de Campinas e região apresentaram recentemente alerta sobre a transmissão de doenças por arboviroses, incluindo a Dengue, sendo necessário tomar as devidas precauções e medidas a respeito dessas doenças, mesmo que ainda não tenham sido registrados casos para os trabalhadores do empreendimento.

Esses dados são um alerta à saúde pública, pois as espécies registradas são de interesse médico e sanitário, podendo possivelmente trazer riscos à saúde humana. Algumas recomendações são necessárias para que se evite o contato entre ser humano e vetor, sendo elas: o uso de roupas de cores claras onde os insetos não possam de camuflar e que cubram braços e pernas completamente; não é recomendando o uso de perfumes, pois possivelmente pode atrair os vetores; e nem o uso de repelentes a base de icaridina.

Continua não sendo constatada densidade populacional que necessite de um controle químico. Se seguidas às recomendações acima citadas, diminui-se em sua maioria os riscos aos trabalhadores. Além disso, realizar as recomendações de medidas de prevenção e controle apropriadas através de documentos técnicos e informativos, como mostra a **Figura 2**, são de extrema importância para sensibilizar os colaboradores da obra, além de evitar a transmissão por falta de informação a respeito das arboviroses urbanas.

Após finalização da campanha, será apresentado o Informe Técnico nas secretarias municipais de saúde (Pedreira e Campinas), contendo o resumo da 13ª Campanha de Invertebrados de Interesse Médico e Sanitários que ocorreu entre os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, conforme a **Figura 2**.

INFORME TÉCNICO

Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesses Médico Sanitário

Foi realizada a 13ª campanha do monitoramento de vetores nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022 na barragem em implantação em Pedreira. O estudo compreendeu a captura de dípteros que compreenderam as famílias Ceratopogonidae, Culicidae, Dixidae, Phlebotominae, Sciaridae e Simuliidae. Os resultados obtidos correspondem a 103 dípteros capturados. Das capturas, pôde-se observar a presença de diversas espécies de importância epidemiológica como: O gênero *Culex*, responsável pela transmissão de filarioses (duas espécies); Flebotomíneos distribuídos entre *Evandromyia lenti* (11 indivíduos), *Psathyromyia aragaoi* (6 indivíduos) e *Brumptomya* sp. (15 indivíduos); 1 exemplar de *Culicoides albicans* e 2 exemplares de *Simulium* sp., transmissor de oncocercose e mansonelose.



Evandromyia lenti



Culex declarator

Com base nos dados obtidos, **recomenda-se:**

- Uso de repelente e de roupas que não exponham partes do corpo;
- Não ingerir ou tomar banhos em cursos d'água, lagoas e locais com água parada.

Figura 2: Informe Técnico da 13ª Campanha de Invertebrados de Interesse Médico e Sanitários

6. BIBLIOGRAFIA

- ABREU, F. V. S. et al. *Haemagogus leucocelaenus* and *Haemagogus janthinomys* are the primary vectors in the major yellow fever outbreak in Brazil, 2016–2018. **Emerging microbes & infections**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 218-231, 2019.
- ALEXANDRE, R. C.; FORTES, M. R. Transformações na paisagem decorrentes da construção da usina de Jirau no distrito de Mutum Paraná, município de Porto Velho/RO. **XIII Enanpege**, São Paulo, 2019.
- ALMEIDA, L. S. et al. Saneamento, Arboviroses e Determinantes Ambientais: Impactos na saúde urbana. **Ciência & Saúde Coletiva**, 2019. Disponível em: <<http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/saneamento-arboviroses-e-determinantes-ambientais-impactos-na-saude-urbana/17113?id=17113>>. Acesso em: 14 jun 2021.
- ASHLEY, E. A.; PHYO, A. P.; WOODROW, C. J. Malaria. **The Lancet**, 2018, v. 391, n. 10130, p. 1608-162.
- BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO. Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas causados por vírus transmitidos pelo mosquito *Aedes* (dengue, chikungunya e zika). Ministério da Saúde. v. 52, n. 16, abril 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/4/boletim_epidemiologico_svs_16-1.pdf>.
- BRITO, Gildene Silva et al. Influence of Moonlight on Male Mating Aggregations of *Nyssomyia whitmani*, a Vector of American Cutaneous Leishmaniasis in Brazil. **Journal of Medical Entomology**. 2020.
- CARDOSO, J. C. et al. Novos registros e potencial epidemiológico de algumas espécies de mosquitos (Diptera, Culicidae), no Estado do Rio Grande do Sul. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, Uberaba, v. 43(5), p. 552-556, 2010.
- CONSOLI, R. A. G. B.; LOURENÇO, Ricardo de Oliveira. **Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994. p. 228.
- DONALISIO, Maria Rita; FREITAS, André Ricardo Ribas; ZUBEN, Andrea Paula Bruno Von. Arboviroses emergentes no Brasil: desafios para a clínica e implicações para a saúde pública. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 51, p. 30, 2017.
- FERREIRA, M.U., CASTRO, M.C. Challenges for malaria elimination in Brazil. **Malaria Journal**, Liverpool, v. 15, n. 284, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12936-016-1335-1>>.
- FORATTINI, O. P. **Culicidologia Médica**. São Paulo: EDUSP, 2002. v. 2.
- FUNASA. **Dengue**: instruções para pessoal de combate ao vetor. Manual de Normas Técnicas. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2001. p. 84.
- INPE. Instituto de Nacional Pesquisas Espaciais. Dados meteorológicos do mês de maio. Disponível em: <www.inpe.br>. Acesso em: jun 2019.
- JEZUZ, S. V. et al. **As estratégias para o controle do *Aedes aegypti* e a prevenção de Arboviroses**. Sinop: Ed. Oiticica, 2020. Disponível em: <<https://cms.ufmt.br/files/galleries/4/arquivosdenoticias/2020/7Julho/livroAedes.pdf>>.
- LEITÃO, E. S. Barragens: um enfoque sobre paisagem cultural e patrimônio. **Revista Geográfica da América Central**. Rio de Janeiro, v. 1, n. 47E, 2011.
- LOPES, Nayara; NOZAWA, Carlos; LINHARES, Rosa Elisa Carvalho. Características gerais e

epidemiologia dos arbovírus emergentes no Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, Ananindeua, v. 5, n. 3, p. 10-10, 2014.

LORENZ, C. et al. **O fantástico mundo dos mosquitos**. Águas de São Pedro: Livro Novo, 2020. Disponível em: <https://publicacoeseducativas.butantan.gov.br/web/mosquito/pages/pdf/89_Livro%20%20FANT%20%20MUNDO%20DOS%20MOSQUITOS_internet.pdf>.

LUTZ, Adolpho. **Sumário-Índices-Suplemento**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, v. 2, 2006.

NUNES, T. C. et al. Vetores de Importância Médica da Área de Influência da Pequena Central Hidrelétrica Mosquitão - Goiás. **Estudos Vida e Saúde**. Goiânia, v. 35, n. 6, p. 1085-1105, 2008.

PEPINELLI, Mateus et al. **Simuliidae (Diptera, Nematocera) do Estado de São Paulo**. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008. Disponível em: <<https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1616?show=full>>.

PIGNATTI, M.G. et al. Leishmaniose tegumentar americana na região nordeste do Estado de São Paulo, Brasil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**. Uberaba, v. 28(3), p. 243-247, 1995.

RIBEIRO, A. F. et al. Associação entre incidência de dengue e variáveis climáticas. **Revista Saúde Pública**. São Paulo, v. 40(4), p. 671-6, 2006.

REITER, P. Climate change and mosquito-borne disease. **Environmental Health Perspectives**. Porto Rico, v. 109, 2001. Disponível em: <<http://www.ehponline.org/members/2001/suppl-1/141161reiter/reiter-full.html>>. Acesso em: 21 out 2020.

SHIMABUKURO P.H.F. & GALATI, E.A.B. Checklist dos Phlebotominae (Diptera, Psychodidae) do Estado de São Paulo, Brasil, com comentários sobre sua distribuição geográfica. **Biota Neotropica**. São Paulo, v. 11, p. 1-20, 2011. Disponível em: <www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/abstract?inventory+bn0361101a2011>.

SINANNET. Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses/CVE/CCD/SES- SP. Dados atualizados em: 27 ago 2019.

TAUIL, P. L. Perspectivas de controle de doenças por vetores no Brasil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**. Uberaba, v. 39(3), p. 275-277, 2006.

THYSSEN, P.J. et al. O papel de insetos (Blattodea, Diptera e Hymenoptera) como possíveis vetores mecânicos de helmintos em ambiente domiciliar e peridomiciliar. **Cadernos de Saúde Pública**. Rio de Janeiro, v. 20, p. 1096-1102, 2004.

ANEXO 0332-01-AS-RQS-0012.02-PMIIMS

Protocolo eletrônico

Nº PMC. 2023.00000977-59



CBP – GC – 300– 2022

Pedreira, 12 de dezembro de 2022.

**A SRA. TESSA ROESLER
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS E DOENÇAS DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA, 200, 11º ANDAR, PAÇO MUNICIPAL**

Assunto: Informe Técnico - 13ª Campanha de Monitoramento de Invertebrados de interesse Médico Sanitário.

Prezada Senhora,

O **CONSÓRCIO BP KPE-CETENCO** (“Consórcio”), com sede na Rua Pais Leme, nº 524, Conj. 123, 12º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05.424-904 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.786.963/0001-44, constituído pelas empresas **KPE Engenharia e Construção S.A.**, e **Cetenco Engenharia S/A**, vêm expor o que segue.

Para o desenvolvimento do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesses Médico Sanitário, parte integrante do Plano Básico Ambiental (PBA) para execução das obras de implantação da Barragem Pedreira, faz-se necessário apresentar os informes técnicos contendo os resultados das campanhas quadrimestrais de desenvolvimento do referido Programa à Coordenadoria de Vigilância de Agravos e Doenças de Campinas.

O Informe Técnico anexo apresenta os resultados da 13ª Campanha de Monitoramento de Vetores realizada nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, nos municípios de Campinas e Pedreira.

Cumprе informar que o monitoramento de vetores na área do empreendimento constatou a presença de espécies com capacidade de veiculação de patógenos. A presença desses vetores não implica na ocorrência ou prevalência de enfermidades, mas, indica um potencial de se instalarem.



CBP – GC – 300– 2022

Isto posto, reiteramos nossa disponibilidade para quaisquer questões, e agradecemos toda a atenção fornecida às equipes e colaboradores desse Consórcio até o presente momento.

Cordialmente,

Marcelo Facochio Coura
Gerente do Contrato
Consórcio BP KPE-Cetenco

REALIZAÇÃO:



INFORME TÉCNICO

Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesses Médico Sanitário

Foi realizada a 13ª campanha do monitoramento de vetores nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022 na barragem em implantação em Pedreira. O estudo compreendeu a captura de dípteros que compreenderam as famílias Ceratopogonidae, Culicidae, Dixidae, Phlebotominae, Sciaridae e Simuliidae. Os resultados obtidos correspondem a 103 dípteros capturados. Das capturas, pôde-se observar a presença de diversas espécies de importância epidemiológica como: O gênero *Culex*, responsável pela transmissão de filariose (duas espécies); Flebotomíneos distribuídos entre *Evandromyia lenti* (11 indivíduos), *Psathyromyia aragoi* (6 indivíduos) e *Brumptomya* sp. (15 indivíduos); 1 exemplar de *Culicoides albicans* e 2 exemplares de *Simulium* sp., transmissor de oncocercose e mansonelose.



Evandromyia lenti



Culex declarator

Com base nos dados obtidos, **recomenda-se:**

- Uso de repelente e de roupas que não exponham partes do corpo;
- Não ingerir ou tomar banhos em cursos d'água, lagoas e locais com água parada.



luis.oliveira@consorciobarragens.com.br

De: SEI <sei.sistema@campinas.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 09:29
Para: luis.oliveira@consorciobarragens.com.br
Assunto: SEI - Confirmação de Peticionamento Eletrônico (Processo nº PMC.2023.00000977-59)

:: Este é um e-mail automático ::

Prezado(a) Luis Alberto de Oliveira,

Este e-mail confirma a realização do Peticionamento Eletrônico do tipo Processo Novo no SEI-PMC, no âmbito do processo nº PMC.2023.00000977-59, conforme disposto no Recibo Eletrônico de Protocolo SEI nº 7160153.

Caso no futuro precise realizar novo peticionamento, sempre acesse a área destinada aos Usuários Externos no SEI-PMC destacada em seu Portal na Internet ou acesse diretamente o link a seguir:
https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

PMC
Prefeitura Municipal de Campinas
www.campinas.sp.gov.br

ATENÇÃO: As informações contidas neste e-mail, incluindo seus anexos, podem ser restritas apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e em seguida apague esta mensagem.



Pedreira, 12 de dezembro de 2022.

A SRA. MARA LOZANO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PEDREIRA
RUA MIGUEL SARKIS, Nº 70 - PARQUE INDUSTRIAL

Assunto: Informe Técnico - 13ª Campanha de Monitoramento de Invertebrados de interesse Médico Sanitário.

Prezada Senhora,

O **CONSÓRCIO BP KPE-CETENCO** ("Consórcio"), com sede na Rua Pais Leme, nº 524, Conj. 123, 12º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05.424-904 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.786.963/0001-44, constituído pelas empresas **KPE Engenharia e Construção S.A.**, e **Cetenco Engenharia S/A**, vêm expor o que segue.

Para o desenvolvimento do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesses Médico Sanitário, parte integrante do Plano Básico Ambiental (PBA), para execução das obras de implantação da Barragem Pedreira, faz-se necessário apresentar os informes técnicos contendo os resultados das campanhas quadrimestrais de desenvolvimento do referido Programa à Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Pedreira.

O Informe Técnico anexo apresenta os resultados da 13ª Campanha de Monitoramento de Vetores realizada nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, nos municípios de Campinas e Pedreira.

Cumprе informar que o monitoramento de vetores na área do empreendimento constatou a presença de espécies com capacidade de veiculação de patógenos. A presença desses vetores não implica na ocorrência ou prevalência de enfermidades, mas, indica um potencial de se instalarem.



CBP – GC – 299– 2022

Isto posto, reiteramos nossa disponibilidade para quaisquer questões, e agradecemos toda a atenção fornecida às equipes e colaboradores desse Consórcio até o presente momento.

Cordialmente,

Marcelo Facochio Coura
Gerente do Contrato
Consórcio BP KPE-Cetenco

INFORME TÉCNICO

Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesses Médico Sanitário

Foi realizada a 13ª campanha do monitoramento de vetores nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022 na barragem em implantação em Pedreira. O estudo compreendeu a captura de dípteros que compreenderam as famílias Ceratopogonidae, Culicidae, Dixidae, Phlebotominae, Sciaridae e Simuliidae. Os resultados obtidos correspondem a 103 dípteros capturados. Das capturas, pôde-se observar a presença de diversas espécies de importância epidemiológica como: O gênero *Culex*, responsável pela transmissão de filariose (duas espécies); Flebotomíneos distribuídos entre *Evandromyia lenti* (11 indivíduos), *Psathyromyia aragai* (6 indivíduos) e *Brumptomya* sp. (15 indivíduos); 1 exemplar de *Culicoides albicans* e 2 exemplares de *Simulium* sp., transmissor de oncocercose e mansonelose.



Evandromyia lenti



Culex declarator

Com base nos dados obtidos, **recomenda-se:**

- Uso de repelente e de roupas que não exponham partes do corpo;
- Não ingerir ou tomar banhos em cursos d'água, lagoas e locais com água parada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PRAÇA EPITACIO PESSOA, Nº 3 - CENTRO

46.410.775/0001-36

2023

RECIBO DE PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **94/2023**

CHAVE WEB: 1P437r141o

DATA: 04/01/2023

HORA: 14:37:14

RESPONSÁVEL: ADRIELY

INTERESSADO: 000086152 CONSORCIO BP OAS-CETENCO

ASSUNTO

Providencias Cabiveis

Para consultar andamento do Protocolo acesse: <http://www.pedreira.sp.gov.br>
ou ligue (19) 3893-3522 - Ramal: 240
E-mail: protocolomp@gmail.com

BARRAGEM PEDREIRA



ANEXO XV - Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna

Fevereiro/2023

Período: Setembro a Dezembro 2022



www.daepedreiraeduaspontes.com.br



PEDREIRA E CAMPINAS – SÃO PAULO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DOS
PROGRAMAS AMBIENTAIS
BARRAGEM PEDREIRA

***12º Relatório Quadrimestral do Programa de
Monitoramento e Conservação da Ictiofauna***

0322-01-AS-RQS-0012-R00-PCI

Contrato: N° 2018/11/00032.2

**Setembro a dezembro
2022**

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	6
2.	CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	7
3.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
3.1	EQUIPE TÉCNICA	9
4.	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA	10
4.1	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	10
4.1.1	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS	10
4.1.2	ATENDIMENTO ÀS METAS.....	11
4.1.3	INDICADORES.....	11
4.2	RESUMO DAS ATIVIDADES ANTERIORES – HISTÓRICO	12
4.3	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO.....	14
4.3.1	SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA.....	14
4.3.2	SUBPROGRAMA PARA O RESGATE DA ICTIOFAUNA NAS ÁREAS DAS ENSECADEIRAS	16
4.4	PROXIMAS ATIVIDADES.....	17
5.	CRONOGRAMA – PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA	18
6.	ANEXOS	24

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Equipe técnica.....	9
Quadro 2 – Atendimento aos Objetivos do Programa.....	10
Quadro 3 – Atendimento aos Metas do Programa.....	11
Quadro 4 – Atendimento aos Indicadores do Programa.....	11
Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.....	13
Quadro 6 – Campanhas de monitoramento de ictiofauna realizadas na Barragem Pedreira.....	13
Quadro 7 – Cronograma – Ano 1.....	19
Quadro 8 – Cronograma – Ano 2.....	20
Quadro 9 – Cronograma – Ano 3.....	21
Quadro 10 – Cronograma – Ano 4.....	22
Quadro 11 – Cronograma – Ano 5.....	23

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADA – Área Diretamente Afetada

AID – Área de Influência Direta

ANA – Agência Nacional de Águas

ANM – Agência Nacional de Mineração

CA – Certificado de Aprovação

CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CBRN – Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica

DEFAU – Departamento de Fauna da Secretaria de Meio Ambiente

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

EPI – Equipamento de Proteção Individual

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo

NR – Norma Regulamentadora

PBA – Plano Básico Ambiental

PGA – Programa de Gestão Ambiental

PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

MMA – Ministério do Meio Ambiente

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental

SMA – Secretaria do Estado de Meio Ambiente

APRESENTAÇÃO

O Consórcio BP KPE-CETENCO apresenta o produto correspondente ao **12º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ANDAMENTO AMBIENTAL** do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna referente ao contrato de implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiá – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas conforme elementos técnicos do Edital de Concorrência Internacional 005/DAEE/2017/DLC.

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa atender à exigência ambiental do Edital de Concorrência **005/DAEE/2017/DLC**, cujo objetivo é a implantação da Barragem Pedreira nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiá – PCJ, nos municípios de Pedreira e Campinas com eficácia e qualidade requeridas.

O escopo deste **Relatório de Andamento Ambiental do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna** está baseado nas atividades realizadas no **período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2022**.

Esse programa tem como objetivos avaliar os padrões de variação na atual assembleia de peixes na AID e ADA do empreendimento, identificar alterações impostas pela implantação do reservatório, assim como nas perdas e modificações de habitats, verificando se os programas ambientais previstos estão mitigando, controlando e minimizando os impactos ambientais inerentes à implantação e operação dos empreendimentos sobre a ictiofauna nativa e, eventualmente, subsidiar outras ações de compensação e/ou mitigação dos impactos negativos.

Sendo assim, resumidamente será realizado o monitoramento de ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira, o resgate de ictiofauna nas áreas de enseada e monitoramento do mecanismo para transposição de peixes localizada no município de Pedreira, apresentando as informações sobre o desenho amostral a ser empregado e análises a serem realizadas; a coleta de espécimes e o método empregados nas atividades.

Este Programa foi subdividido em 3 (três) subprogramas:

- Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna;
- Subprograma para o Resgate da Ictiofauna nas áreas das enseadeiras; e
- Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes (MTPs).

2. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A seguir apresenta-se os detalhamentos das condicionantes preconizadas na LI nº 2557, referente ao programa e acompanhamento ambiental da Barragem Pedreira.

Item 2.1 - Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada (incluindo análise do estágio de maturação gonadal de espécies de maior importância, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos), registro fotográfico das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período.

Atendido.

Item 2.27 - Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descrição das atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotográficos, fotos aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificação dos indivíduos capturados, avaliação crítica dos resultados obtidos, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período. No Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna deverão ser incluídos pontos de monitoramento à montante da PCH Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos.

Em atendimento, conforme relatório em tela.

Item 3.12 - Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna e Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e de Monitoramento da Ictiofauna) no mínimo, o balanço das atividades desenvolvidas, os métodos empregados, as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos, com quantitativos dos procedimentos (resgate, soltura, espécies levantadas) e análise crítica dos resultados.

Será atendido antes da solicitação da LO.

Item 3.14 - Apresentar a Autorização de Manejo in situ a ser emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA) para o manejo da ictiofauna, previsto no Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes. (Exigência 5.26 da LP).

Será atendido antes da solicitação da LO.

Item 4.6 - Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes), contemplando as metodologias empregadas, espécies identificadas, resultados obtidos no monitoramento e nas atividades de translocação, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, análise crítica da efetividade do programa, responsáveis técnicos e respectivas ARTs.

Será atendido após a emissão da LO.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.1 Equipe Técnica

Nome	Função Exercida	Formação	Registro
Denis Dorighello Tomás	Responsável de Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Geógrafo	CREA 0601944001
Maria Elena Basilio	Coordenadora dos Programas Ambientais	Engenheira Agrônoma	CREA 5061242441
Luis Alberto de Oliveira	Coordenador dos Programas do Meio Biótico	Engenheiro Florestal	CREA 5063209653
André Batista Nobile	Resgate de Ictiofauna	Biólogo	CRBio. 94835/01-D
Felipe Pontieri de Lima	Resgate de Ictiofauna	Biólogo	CRBio 097849/01-D
Luiz Henrique Fregadolli Ussami	Resgate de Ictiofauna	Biólogo	CRBio 113652/01-D
Eduardo Meneguzzi Brambilla	Resgate de Ictiofauna	Biólogo	CRBIO106633/01-D
Noel Cintra	Médico Veterinário	Médico Veterinário	CRMV/SP 42786

Quadro 1 – Equipe técnica.

4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA

4.1 Objetivos, Metas e Indicadores

O atendimento aos objetivos, metas e indicadores está sintetizado nos **Quadros 2, 3 e 4**, abaixo.

4.1.1 Atendimento aos Objetivos

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA		
Objetivos	Status	Justificativa
Obtenção da Autorização de Manejo de Fauna <i>In Situ</i> , no DeFau/SMA	Atendido	Autorizações emitidas: Nº21068 - Emissão: 27/03/2020 – substituída pela próxima; Nº70099 - Emissão: 29/08/2019 – substituída pela próxima; Nº80727 - Emissão: 14/09/2018 – substituída pela próxima; Nº 3686776 – Emissão: 30/07/2020 – substituída pela próxima; Nº 46405 – Emissão 25/08/2021 – aguardando retomada da atividade de resgate de ictiofauna para nova solicitação. Nº 4412 – Emissão 28/01/2021 – substituída pela próxima; Nº 58624 – Emissão 24/08/2022 – Válida até 07/02/2022.
Realizar o inventário da ictiofauna	Atendido	Inventário realizado na primeira Campanha de Monitoramento de Ictiofauna, em novembro 2018
Analisar os mecanismos de controle ambiental adotados pelo empreendimento	Em Atendimento	As análises integradas entre os programas ambientais com interface com ecossistemas aquáticos, são realizadas constantemente
Subprograma de Monitoramento de Ictiofauna		
Verificar a presença das diferentes espécies de peixes nos ambientes aquáticos da AID/ADA	Em atendimento	As variações das espécies são verificadas nas campanhas quadrimestrais de monitoramento.
Verificar as variações espaço-temporais da ictiofauna	Em atendimento	As variações espaço-temporais da ictiofauna são verificadas nas campanhas quadrimestrais de monitoramento.
Acompanhar possíveis alterações na abundância e biomassa das espécies de peixes	Em atendimento	As alterações na abundância e biomassa das espécies de peixes (incluindo larvas, ovos, formas jovens) são verificadas nas Campanhas
Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Enseadeiras		
Resgatar os peixes aprisionados em poças durante o lançamento das enseadeiras	*	*
Subprograma de Monitoramento de MTP		
Monitoramento da transposição	*	O monitoramento será realizado na Fase de Operação do Reservatório

* Não se aplica para o período

Quadro 2 – Atendimento aos Objetivos do Programa.

4.1.2 Atendimento às Metas

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA		
Subprograma de Monitoramento de Ictiofauna		
Metas	Status	Justificativa
Realização de campanhas de monitoramento da ictiofauna.	Em atendimento	As campanhas são realizadas conforme diretrizes do PBA
Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Enseadeiras		
Garantir a sobrevivência das espécies de peixes do rio Jaguari.	Em andamento	Atividades são acompanhadas por especialista, para garantir integridade dos espécimes manejados.
Subprograma de Monitoramento de MTP		
Implantação de estações de coleta nas mesmas áreas definidas para os estudos	*	Será implantado na fase de operação do reservatório

* Não previsto para o período.

Quadro 3 – Atendimento aos Metas do Programa.

4.1.3 Indicadores

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA	
Indicador	Status
Subprograma de Monitoramento de Ictiofauna	
Riqueza de Tâxons	19
Distribuição Espacial	Boa distribuição espacial
Eficiência Amostral (%)	Com a utilização dos diferentes apetrechos de pesca (rede de emalhe, peneira, arrasto, tarrafa e covó), foram registrados ao total, 369 indivíduos, na 13ª campanha de monitoramento de ictiofauna. Os indivíduos representavam cinco ordens, dez famílias e 19 <i>tâxons</i> .
Abundância Relativa e Frequência	Ponto P2-BP apresentou os maiores valores de abundância. O ponto P1-BP, os maiores valores de riqueza.
Índices de Riqueza e Equitatividade	O ponto P1-BP, apresentou os maiores valores de riqueza observada. A equitabilidade foi maior no ponto P3-BP.
Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Enseadeiras	
Taxa de sobrevivência das espécies calculada com base nos resultados das Atividades (%)	*

Legenda: * = Os resultados foram apresentados no 6º relatório quadrimestral.

Quadro 4 – Atendimento aos Indicadores do Programa.

4.2 Resumo das atividades Anteriores – Histórico

- Em 15/04/2018 o Plano Básico Ambiental – PBA foi apresentado à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB em atendimento à Licença Ambiental Prévia nº 2513, de 25 de agosto de 2016 – Processo nº 189/2013, e visando à Licença Ambiental de Instalação;
- Na data de 28/12/2018 foi emitida a Licença Ambiental de Instalação nº 2557, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e o Parecer Técnico nº 468/18/IE emitido na data de 26/12/18;

O **Quadro 5**, apresenta os relatórios quadrimestrais emitidos até o momento.

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
Julho - 2019	Emissão do 1º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2019	Emissão do 2º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Março - 2020	Emissão do 3º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2020	Emissão do 4º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2020	Emissão do 5º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2021	Emissão do 6º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Mai - 2021	Emissão do 7º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2021	Emissão do 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Janeiro - 2022	Emissão do 9º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

DATA	RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS
Maio - 2022	Emissão do 10º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento
Setembro - 2022	Emissão do 11º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da Licença de Instalação nº2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento

Quadro 5 – Relatórios Quadrimestrais Emitidos.

As campanhas de monitoramento realizadas até o momento estão descritas no **Quadro 6**.

Campanha	Início	Término
Primeira	03/10/2018	07/10/2018
Segunda	20/02/2019	25/02/2019
Terceira	18/06/2019	21/06/2019
Quarta	02/10/2019	04/10/2019
Quinta	17/02/2020	20/02/2020
Sexta	19/06/2020	21/06/2020
Sétima	26/10/2020	28/10/2020
Oitava	15/02/2021	17/02/2021
Nona	24/06/2021	26/06/2021
Décima	13/10/2021	15/10/2021
Décima primeira	22/02/2022	24/02/2022
Décima segunda	22/06/2022	24/06/2022
Décima terceira	19/10/2022	21/10/2022

Quadro 6 – Campanhas de monitoramento de ictiofauna realizadas na Barragem Pedreira.

4.3 Atividades Desenvolvidas no Período

4.3.1 Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna

Durante o mês de outubro (19 a 21) foi realizado a 13ª campanha de monitoramento da ictiofauna. Salienta-se que as atividades de campo ocorreram de acordo com o Plano de Trabalho apresentado junto ao Defau.

No total, nesta campanha foram registrados 19 táxons, sendo a composição destes táxons similar à de outros ambientes, com predomínio de Siluriformes e Characiformes, podendo haver alteração entre estas ordens. Entre os aparatos de captura houve diferenças na composição, mas essa é esperada, dado a variação no uso e ocupação do habitat entre espécies de pequeno, médio e grande porte.

Nesta campanha, foram registrados dois indivíduos de *P. lineatus*, migrador de longa distância. Além disso, foram registradas 8 espécies classificadas como não migradoras ou migradoras de curta distância, com cuidado parental, 9 espécies classificadas como não migradoras ou migradoras de curta, sem cuidado parental e uma espécie não migradora com fecundidade interna. Tais guildas reprodutivas mostraram-se constantes durante as campanhas, sendo que as espécies costumam realizar migrações reprodutiva durante a piracema, contudo, sem a necessidade de grandes deslocamentos, como os migradores de longa distância. Estes números denotam que o rio Jaguari, pode representar importante papel como rota migratória, sendo responsável pelo recrutamento de novos indivíduos dessas populações. Assim, o monitoramento destas espécies, principalmente, no tocante à efetividade do mecanismo de transposição a ser instalado, deve ser realizado.

Os dados sobre a composição trófica apresentam número considerável de espécies onívoras, um indicador negativo de qualidade ambiental, considerando que tais espécies são normalmente generalistas e com maior capacidade de ajustes perante as transformações ambientais. Entretanto, a classificação foi feita com base em literatura, visto que o parecer não exigiu análise de conteúdo estomocal das espécies registradas. Para uma afirmação sobre esta condição, seria necessária a avaliação direta da dieta das mesmas. Assim, neste ponto, é sugerido que sejam considerados para análise da composição trófica, as espécies mais abundantes, para que assim, se possa conhecer efetivamente as mudanças ecológicas dessas espécies após a formação deste reservatório.

Tendo como base as informações apresentadas neste documento, infere-se que os padrões de composição e estrutura da comunidade de peixes observados para áreas sob

influência direta da Barragem Pedreira (BP), apresenta perfil esperado para o que se tem de conhecimento na literatura científica para rios de menor porte, principalmente aqueles sob grande interferência antrópica, reportando de forma geral, baixa abundância e riqueza de espécies. Contudo, por se tratar de uma amostragem realizada antes da construção da barragem, esta deve servir de base para potenciais impactos nesta comunidade.

Espera-se que após o término das obras, a composição ictiofaunística seja composta pelas espécies mais resilientes e com maior flexibilidade ecológica, sendo essas, as espécies que se manterão no novo ambiente criado, destacando entre as principais estratégias e táticas envolvidas neste processo, as adequações tróficas e reprodutivas.

O relatório com os dados completos é apresentado no **ANEXO 0322-01-RQS-0012.0001-PCI**.

4.3.2 Subprograma para o Resgate da Ictiofauna nas áreas das enseadeiras

Não houve atividades no período.

4.4 Proximas Atividades

Para o próximo quadrimestre será realizada a 14º campanha do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, prevista para fevereiro de 2023.

As próximas atividades de resgate de ictiofauna deverão ocorrer no canal de desvio do rio Jaguari, para a construção do barramento.

5. CRONOGRAMA – PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA

Os quadros abaixo apresentam o cronograma das atividades previstas do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna nos períodos: Ano 1 a Ano 5.

Atividades	Implantação											
	Ano 3											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA												
Campanhas de monitoramento da ictiofauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA NAS ÁREAS DAS ENSECADERAS												
Treinamento da Equipe												
Regates durante as obras de instalação												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (MTP's)												
Monitoramento dos MTP's												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												

Quadro 9 – Cronograma – Ano 3.





Atividades	Implantação											
	Ano 4											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA												
Campanhas de monitoramento da ictiofauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA NAS ÁREAS DAS ENSECADEIRAS												
Treinamento da Equipe												
Regates durante as obras de instalação												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (MTP's)												
Monitoramento dos MTP's												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												


Quadro 10 – Cronograma – Ano 4.

Atividades	Implantação											
	Ano 5											
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA												
Campanhas de monitoramento da ictiofauna												
SUBPROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA NAS ÁREAS DAS ENSECADEIRAS												
Treinamento da Equipe												
Regates durante as obras de instalação												
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (MTP's)												
Monitoramento dos MTP's												
Relatório Mensal												
Relatório Quadrimestral												

Quadro 11 – Cronograma – Ano 5.

LEGENDA

	PREVISTO
	REALIZADO
	REPROGRAMADO
	FINALIZADO



6. ANEXOS

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0012.01-PCI

**Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob
influência direta da Barragem Pedreira (BP).**



**13º Relatório de Atividades
Campanha Outubro/2022**

NÚMERO DO CONTRATO: *BP 087/2020*



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação da Atividade

Contratação sob regime de prestação de serviços para execução do Programa de Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira (BP).

1.2 Identificação do Empreendedor

Razão Social	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE
CNPJ	CNPJ: 46.853.800/0001–56
Endereço	Rua Boa Vista, 170, 11º andar, bloco 5 – Centro
Cidade	São Paulo/SP
CEP	CEP: 01014–001
Representante Legal	Lupercio Zirolto Antonio
Pessoa de Contato	Ligia Christine Fernandes de Oliveira
Telefone	(11) 3293–8200

1.3 Empresa de Consultoria

Razão Social	Consorcio BP OAS/CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001–44
Endereço	Francisco Matarazzo 1350, 7º andar
Cidade	São Paulo SP
CEP	05001–902
Representante Legal	Edson Cruz
Pessoa de Contato	Ricardo Prado Franzote
Telefone	(11) 3101–0063



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



1.4 Dados Gerenciadora

Razão Social	Consórcio CPC
CNPJ	29.081.042/0001-86
Endereço	Av. das Nações Unidas, 13771, 5º andar, bloco L
Cidade	São Paulo
CEP	04.794-000
Representante Legal	Carlos Henrique Costa Jardim
Pessoa de Contato	Flavia Pileggi
Telefone	(11) 3101-0063

1.5 Dados da Consultoria Especialista em Ictiofauna

Razão Social	Ictiológica Consultoria Ambiental
CNPJ	21.243.932/0001-35
Endereço	Rua. Primo Paganini, 990 – Casa C
Cidade	Botucatu – SP
CEP	18.608-190
Representante Legal	André Batista Nobile
Pessoa de Contato	André Batista Nobile/ Felipe Pontieri de Lima
Telefone	(14) 98123-9200 / (16) 98137-0861

1.6 Dados Supervisora/Fiscalizadora:

Razão Social	Consórcio Supereng Barragens
CNPJ	29.013.032/0001-03
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 – Jardim Paulistano
Cidade	São Paulo/SP
CEP	01451-909
Representante Legal	Augusto Tetsuji Matsushita

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Pessoa de Contato	Mariana Bittu
Telefone	(11) 4195-3111

Equipe Técnica

A equipe técnica é formada por profissionais com formação em biologia, medicina veterinária, estagiários e auxiliares técnicos. No **Quadro 01**, a seguir é apresentada a equipe principal contratada do consórcio sendo que outros profissionais entre eles, de empresas prestadoras de serviço de fauna, podem ser inseridos ao longo do projeto. O Currículo Lattes, Cadastros Técnicos Federais - CTFs e os Atestados de Responsabilidade Técnica - ARTs da equipe encontram-se disponíveis no Sistema GEFAU Aba Projeto > Equipe.

Quadro 1 – Equipe Técnica.

Nome	Função Exercida	Formação	Própria/consultoria	Documento
Felipe Pontieri de Lima	Especialista em Ictiofauna	Biólogo	Ictiológica Consultoria	097849/01-D
André Batista Nobile	Especialista em Ictiofauna	Biólogo	Ictiológica Consultoria	094835/01-D
Luis Henrique Fregadolli Ussami	Especialista em Ictiofauna	Biólogo	Ictiológica Consultoria	113652/01-D
Eduardo Meneguzzi Brambilla	Especialista em Ictiofauna	Biólogo	Ictiológica Consultoria	106633/01-D



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



APRESENTAÇÃO

O Consórcio BP e Ictiológica Consultoria Ambiental apresentam o relatório correspondente a campanha de monitoramento de ictiofauna realizado nas áreas sob influência direta da Barragem Pedreira, realizado entre os dias **19/10/2022 a 21/10/2022**. Este produto faz parte do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna, que visa a obtenção de Autorização de Manejo in situ junto ao Departamento de Fauna – DeFau, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA. O presente relatório tem o objetivo de apresentar informações que subsidiem os conhecimentos ictiofaunísticos locais.

2 SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO	1
1.1	Identificação da Atividade	1
1.2	Identificação do Empreendedor	1
1.3	Empresa de Consultoria	1
1.4	Dados Gerenciadora.....	2
1.5	Dados da Consultoria Especialista em Ictiofauna.....	2
1.6	Dados Supervisora/Fiscalizadora:.....	2
	<i>APRESENTAÇÃO</i>	4
2	SUMÁRIO.....	5
3	LISTA DE FIGURAS	7
4	LISTA DE TABELAS	8
5	INTRODUÇÃO.....	9
6	OBJETIVOS.....	11
6.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
7	METODOLOGIA.....	12
7.1	ÁREA DE AMOSTRAGEM.....	12
7.1.1	P1-BP.....	13
7.1.2	P2-BP.....	14
7.1.3	P3-BP.....	15
7.1.4	P4-BP.....	16
7.1.5	P5-BP.....	17
7.2	COLETAS DE ESPÉCIMES.....	18
7.2.1	Periodicidade e Duração das Campanhas de Amostragem	18
7.2.2	Métodos de Amostragem e Esforço Amostral.....	19
7.3	ANÁLISE DE DADOS	21



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



7.3.1	Estrutura de comunidades.....	21
7.3.2	Classificações ecológicas	22
7.3.3	Biologia reprodutiva	22
7.3.4	Coleta e Eutanásia	22
8	RESULTADOS	Erro! Indicador não definido.
8.1	PARÂMETROS ABIÓTICOS	Erro! Indicador não definido.
8.2	ESTRUTURA DE COMUNIDADES	Erro! Indicador não definido.
8.2.1	Composição Ictiofaunística	Erro! Indicador não definido.
8.2.2	Índices ecológicos.....	Erro! Indicador não definido.
8.2.3	Similaridade de composição	Erro! Indicador não definido.
8.2.4	Captura por Unidade de Esforço	Erro! Indicador não definido.
8.2.5	Curva do coletor	Erro! Indicador não definido.
8.3	ESTÁGIO DE MATURAÇÃO GONADAL - EMG .	Erro! Indicador não definido.
8.4	ICTIOPLÂNCTON	Erro! Indicador não definido.
9	CONSIDERAÇÕES PARCIAIS	43
10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	45
11	ANEXO FOTOGRÁFICO	47
12	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.....	52

3 LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Local de monitoramento. Mapa inserido no Sistema GEFAU Aba Projeto> Anexos	13
Figura 2: Ponto amostral P1-BP.....	14
Figura 3: Ponto amostral P2-BP.....	15
Figura 4: Ponto amostral P3-BP.....	16
Figura 5: Ponto amostral P4-BP.....	17
Figura 6: Ponto amostral P5-BP.....	18
Figura 7. Prática de amostragem utilizando diversos apetrechos de pesca durante o monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira.	19
Figura 8: Análise de componentes principais aplicada aos dados abióticos Erro! Indicador não definido.	
Figura 9: Frequência relativa das ordens nos trechos amostrados com rede de emalhar. .. Erro! Indicador não definido.	
Figura 10: Número de espécies de cada ordem nos diferentes trechos e pontos amostrais coletados com rede de emalhar..... Erro! Indicador não definido.	
Figura 11: Frequência relativa das ordens nos trechos amostrados com arrasto e/ou peneira. Erro! Indicador não definido.	
Figura 12: Número de espécie de cada ordem nos diferentes trechos e pontos amostrais coletados com arrasto e/ou peneira..... Erro! Indicador não definido.	
Figura 13: Frequência relativa das famílias nos trechos amostrados com rede de emalhar. Erro! Indicador não definido.	
Figura 14: Frequência relativa das famílias nos trechos amostrados com arrasto e/ou peneira. Erro! Indicador não definido.	
Figura 15: Abundância de indivíduos (N) e riqueza de espécies (N° espécies) nos diferentes pontos e trechos amostrados com rede de emalhar..... Erro! Indicador não definido.	
Figura 16: Abundância de indivíduos (N) e riqueza de espécies (N° espécies) nos diferentes pontos e trechos amostrados arrasto e/ou peneira. Erro! Indicador não definido.	
Figura 17: Dendrograma de similaridade de <i>Bray Curtis</i> dos ambientes amostrados. (todos os dados agrupados). Erro! Indicador não definido.	



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Figura 18. Curva de acumulação de espécies Sobs e Bootstrap. **Erro! Indicador não definido.**

Figura 19: Avaliação do estágio de maturação gonadal de peixes reofílicos ou de importância comercial registrados no monitoramento. M – 3 = macho maduro; M – 2 = macho em maturação; F – 2b = fêmea em maturação final; F – 2a = fêmea em maturação inicial.... **Erro! Indicador não definido.**

4 LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos locais de monitoramento (UTM – 23K).	12
Tabela 2: Delineamento amostral empregado durante o monitoramento da ictiofauna das áreas sob influência da Barragem de Pedreira.	20
Tabela 3: Marcação e coleta de espécimes para o monitoramento da ictiofauna.	23
Tabela 4: Parâmetros físicos e químicos das águas nos diferentes trechos e pontos amostrais.	Erro! Indicador não definido.
Tabela 6: Lista dos táxons registrado Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira. A apresentação de origem foi dada conforme LANGEANI <i>et al.</i> , (2007). Os nomes foram confrontados com o banco de dados CAS (Catalogue of Fishes).	25
Tabela 7: Atributos ecológicos dos táxons registrado na campanha de Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira. MCD: Migrador de curta distância; MLD: Migrador de longa distância. (NA=Não ameaçado).	26
Tabela 7: Abundância e riqueza de espécies por campanha realizada desde o estudo de impacto ambiental das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira	27
Tabela 8: Abundância e as respectivas frequências relativas dos pontos amostrados com rede de emalhar.	Erro! Indicador não definido.
Tabela 9: Abundância absoluta e as respectivas frequências relativas dos pontos amostrados com arrastos e/ou peneira.	Erro! Indicador não definido.
Tabela 10: Índices Ecológicos Número de espécies, Riqueza, Equitabilidade e Diversidade. (todos os dados agrupados).	Erro! Indicador não definido.



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna
(incluindo ictioplâncton) das
áreas sob influência direta da
Barragem Pedreira



Tabela 11 Tabela sumarizada da CPUE (Captura por Unidade de Esforço) para os pontos amostrais e diferentes artes de pesca utilizadas no monitoramento. **Erro! Indicador não definido.**

Tabela 12: Dados referentes a coleta de organismos ictioplânctônico no Monitoramento da ictiofauna. * ponto sem correnteza. **Erro! Indicador não definido.**



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



5 INTRODUÇÃO

Ao longo de milhares de anos os rios de correnteza modulam os ecossistemas aquáticos brasileiros, determinando a distribuição, abundância e diversidade de peixes no espaço e no tempo desses ambientes aquáticos (NILSSON e SVEDMARK, 2002; POFF e ALLAN, 1995; SCHLOSSER, 1982; WARD *et al.*, 1999). A oscilação hídrica natural desses ambientes, juntamente com a diversidade de habitats determinou os comportamentos, como os tipos de reprodução, locais de desova, berçários naturais, áreas de alimentação e ocupação de nichos das populações de peixes.

O conhecimento das relações da ictiofauna com o ambiente, é de fundamental importância quando considerado o simples fato de que as diferentes demandas sociais, habitualmente acarretam em alterações bruscas no ambiente natural de vida dos peixes. Uma das principais alterações está relacionada com as construções de barragens, sejam elas para suprir a necessidade de abastecimento hídrico, atender a demanda de geração de eletricidade, o principal modelo de matriz geradora do país, bem como outras necessidades humanas que de forma direta ou indireta acabam por provocar alterações no ambiente e conseqüentemente no modo de vida deste grupo.

Assim, a grande expansão das barragens, com diversas finalidades, tem alterado de forma drástica e permanente os ambientes aquáticos de todas as bacias hidrográficas brasileiras, criando novos ambientes, as represas de águas lânticas e semi-lânticas com características físicas e químicas totalmente diferentes das pré-existentes (AGOSTINHO *et al.*, 2007).

Alguns fatores ambientais desses reservatórios recém-formados, tais como variação no nível da água, influenciam de forma direta a composição da assembleia de peixes ao longo do gradiente longitudinal (zona lântica, transição e lótica), como transparência, a entrada de



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



matéria orgânica, disponibilidade habitat de refúgio e alimentação. Essas alterações podem favorecer a ocupação de espécies oportunistas e reduzir as populações de espécies exigentes (SANTOS *et al.*, 2010).

Além de todas essas alterações nas condições ambientais, a construção de barragens pode acarretar na interrupção das rotas migratórias dos peixes, sendo que o empreendimento, acaba atuando como uma barreira física para os movimentos de ascensão dos peixes, fator bastante complicador para manutenção de populações de peixes, principalmente das espécies migratórias de grande porte como os Curimatás (*Prochilodus* sp.), Dourados (*Salminus brasiliensis*), Pacu Caranha (*Piaractus mesopotamicus*), etc. (NOBILE *et al.*, 2016).

A área do empreendimento está inserida na região do rio Paraná, formada pelas bacias hidrográficas dos rios Paraná-Paraguai-Uruguai-Prata. Esta região é a segunda maior drenagem e biodiversidade de águas continentais da América do Sul (REIS; KULLANDER; FERRARIS JR., 2003; LANGEANI *et al.*, 2007), ficando atrás apenas da bacia Amazônica.

Mais precisamente, o empreendimento abrange a bacia do Alto Paraná, que em canais principais dos rios, apresenta ictiofauna caracterizada por espécies de médio e grande porte, com ampla distribuição geográfica e importância para pesca comercial, de subsistência e recreativa (AGOSTINHO *et al.*, 1997). Porém, em ambientes de riachos e de menor porte, são encontradas espécies que tendem a ser de pequeno porte (inferiores a 15/20 cm), muitas vezes com distribuição geográfica restrita e até endêmicas (CASTRO *et al.*, 2004).

Normalmente estas espécies apresentam uma relação direta com a vegetação ripária, usando as mesmas como locais onde buscam abrigo, áreas de forrageamento e de reprodução (OYAKAWA *et al.*, 2006; MENEZES *et al.*, 2007).



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Desta forma o presente estudo pretende avaliar a composição e os aspectos da ocupação da ictiofauna nesse sistema, avaliando a estrutura e distribuição da comunidade na área de abrangência do empreendimento, dando ênfase nos padrões de composição e abundância e no ciclo de vida (e. g. dinâmica alimentar e reprodutiva) das espécies, incluindo conhecimento sobre os possíveis sítios reprodutivos e de berçários naturais das populações na região, com coletas e análises do ictioplâncton.

6 OBJETIVOS

Avaliar as características da composição ictiofaunística e traçar possíveis alterações e adaptações da ictiofauna frente à construção de um reservatório.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Amostrar a ictiofauna na área de influência do empreendimento antes de sua construção.
- Avaliar o comportamento reprodutivo das espécies mais abundantes.
- Avaliar o hábito alimentar das espécies mais abundantes.
- Monitorar o ictioplâncton, detectando as áreas de relevância para desova e crescimento.



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



7 METODOLOGIA

7.1 ÁREA DE AMOSTRAGEM

A ictiofauna das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira foi monitorada por meio da amostragem de cinco pontos distribuídos à montante e a jusante da área da futura barragem, bem como em tributários do rio Jaguari. Os pontos a montante da barragem, por sua vez, estão distribuídos de modo a representar os ambientes dentro e fora dos limites do futuro reservatório (Tabela 1 e Figura 1).

Tabela 1: Coordenadas geográficas dos locais de monitoramento (UTM – 23K).

Pontos	Coordenadas Geográficas		Ambiente	Localização
	E	S		
P01	305606.00	7476996.00	Rio Jaguari	Montante reservatório
P02	304692.00	7480727.00	Rio Jaguari	Reservatório
P03	304310.00	7481200.00	Rio Jaguari	Jusante reservatório
P04	304956.00	7478781.00	Ribeirão Entre Montes	Reservatório
P05	305590.00	7478888.00	Ribeirão Entre Montes	Afluentes reservatório



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira




Figura 1: Local de monitoramento. Mapa inserido no Sistema GEFAU Aba Projeto> Anexos

7.1.1 P1-BP

Estação amostral localizada no rio Jaguari, próximo à cidade de Pedreira-SP. Trecho localizado a montante da área de influência do futuro reservatório. Áreas marginais formadas por mata ciliar. O leito é arenoso, com vasta presença de rochas de grande porte, tendo seu leito uma profundidade média de 2,0 m (Figura 2).



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Figura 2: Ponto amostral P1-BP.

7.1.2 P2-BP

Estação amostral localizada no rio Jaguari, próximo ao local de construção do eixo principal da Barragem Pedreira, na área do futuro reservatório. Apresenta áreas marginais compostas majoritariamente por mata ciliar, com alguns pontos de degradação por atividades antrópicas. O leito apresenta formação com pequenas rochas, e alguns poços mais fundos e arenosos. A profundidade média do leito varia de 1,0 m a 2,0 m (Figura 3).



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Figura 3: Ponto amostral P2-BP.

7.1.3 P3-BP

Estação amostral localizada no rio Jaguari, a jusante do futuro reservatório da barragem de Pedreira. Áreas marginais compostas por mata ciliar, algumas vezes com indícios de degradação ocasionado por atividades antrópicas. O leito rochoso com trechos arenosos com profundidade média de 1,5 m (Figura 4).



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Figura 4: Ponto amostral P3-BP.

7.1.4 P4-BP

Estação de amostragem localizado no ribeirão Entre Montes, que ficará sob influência do reservatório a ser formado. Área marginal composta por vegetação ciliar, com leito rochoso e profundidade média de 30 a 50 cm (Figura 5).



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Figura 5: Ponto amostral P4-BP.

7.1.5 P5-BP

Estação de amostragem localizado no ribeirão Entre Montes, acima da influência do futuro reservatório de Pedreira. Áreas marginais degradadas, composta por pastagem e vegetação ripária. Substrato arenoso, com presença de rochas. Profundidade média de 30 e substrato arenoso com pequenas rochas (Figura 6).



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Figura 6: Ponto amostral P5-BP.

7.2 COLETAS DE ESPÉCIMES

7.2.1 Periodicidade e Duração das Campanhas de Amostragem

As campanhas de monitoramento da ictiofauna das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira serão realizadas com **periodicidade quadrimestral**, de modo a representar os dois principais períodos do ciclo hidrológico: cheia e seca.

Ao longo das campanhas, conforme detalhado a seguir, serão amostrados todos os pontos definidos na Tabela 1, de forma homogênea, garantindo assim que ao final de cada campanha (assim como entre campanhas), os pontos tenham sido amostrados de forma equivalente.

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



7.2.2 Métodos de Amostragem e Esforço Amostral

O levantamento de dados em campo foi realizado utilizando os métodos de amostragem e empregando o esforço amostral (por método e por ponto) apresentados na Figura 7 e descritos na Tabela 2.




Figura 7. Prática de amostragem utilizando diversos apetrechos de pesca durante o monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira.




Tabela 2: Delineamento amostral empregado durante o monitoramento da ictiofauna das áreas sob influência da Barragem de Pedreira.

DELINEAMENTO AMOSTRAL EMPREGADO POR CAMPANHA								
Grupo	Petrecho	Dimensão do petrecho	Malha	Quantidade de cada petrecho por área amostral	Período de amostragem	Quantidade de áreas amostrais	Dias efetivos de campo	Esforço amostral/ponto/dia de campo
Ictiofauna	Picaré	10m	5mm	1	Diurno	5	5	10 arrastos
Ictiofauna	Peneira	1,2x0,8m	5mm	1	Diurno	5	5	50 peneiradas
Ictiofauna	Tarrafas	5m	2,4 e 4 cm entre nós	1	Diurno	5	5	10 tarrafadas/malha
Ictiofauna	Covo	1 x 0,5m	5mm	2	Noturno	5	5	24h
Ictiofauna	Redes de espera	30m	1, 2, 3, 5 e 7 com entre nós	1	24h	5	5	24h/malha
Ictiofauna	Rede de plâncton	30cm (diâmetro)	500 micrômetros	1	Noturno	5	5	5 minutos

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



7.3 ANÁLISE DE DADOS

7.3.1 Estrutura de comunidades

A partir dos dados obtidos em campo, foi realizada uma análise de suficiência amostral por ponto, assim como para o total de pontos. A comunidade de peixes (incluindo o ictioplâncton) será descrita em função de estimativas de riqueza, diversidade, abundância e similaridade. As comparações serão realizadas não apenas entre os pontos como também entre períodos de amostragem de modo a avaliar eventuais variações não apenas especiais, como temporais.

A abundância relativa das espécies será estimada através da captura por unidade de esforço (CPUE) em número (GULLAND, 1969), e será estimada por período amostral, ponto de coleta, espécie e método.

A análise de similaridade será realizada para uma matriz de dados baseada na presença e na ausência das espécies para cada ponto amostral e cada período de amostragem. Por este procedimento é avaliada apenas a composição de espécies, pois é dado peso igual para todas elas, independente da abundância de cada uma. Como método de análise será empregado o índice de similaridade de Sorensen (MAGURRAN, 2013).

Para o cálculo da diversidade de espécies será utilizado o índice de diversidade de Shannon (H'), que assume que os indivíduos são amostrados ao acaso a partir de uma população “indefinidamente grande” e que todas as espécies estão representadas na amostra (PIELOU, 1975; MAGURRAN, 2013). Para o cálculo deste índice serão empregados os dados quantitativos obtidos através das capturas (CPUE).

Cabe ressaltar que, devido à impossibilidade de padronização de abundâncias entre métodos de busca passiva (rede de espera e covo) e ativa (Peneira, tarrafa e arrasto) foram



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



realizadas análises de maneira separada para as capturas registradas com redes de espera e outra agregando os demais apetrechos de captura.

7.3.2 Classificações ecológicas

Ressalta-se que as espécies registradas serão classificadas quanto aos seguintes atributos: endemismo, raridade e status de conservação (lista estadual e nacional), assim como em relação ao interesse ecológico e econômico. Para a classificação quanto ao status de conservação, será utilizado o Livro Vermelho de Fauna do Icmbio (MMA, 2018). O comportamento migratório das espécies foi inferido com base em literatura apropriada, sendo consideradas espécies não migradoras ou migradoras de curta distância com cuidado parental (NEP) e sem cuidado parental (NEW), migradoras de longa distância (LME) e não migradoras ou migradoras de curta distância, com fecundação interna (NIF) (VAZZOLER, 1996; VASCONCELOS; ALVES; GOMES, 2014). A classificação em guildas alimentares foi realizada com base em pesquisas de artigos científicos.

7.3.3 Biologia reprodutiva

A fim de atender ao disposto no parecer técnico, quando forem registradas espécies reofilicas ou de importância comercial, será realizada a identificação do sexo e estágio de maturação gonadal. Cabe ressaltar que esta identificação pode ser realizada sem a necessidade de sacrifício dos indivíduos, em casos onde os mesmos já estejam maduros, como no caso das campanhas realizadas na estação chuvosa. Nestes casos, a inferência ocorrerá através da extrusão dos ovócitos e espermatozoides, tendo como objetivo minimizar o sacrifício de exemplares.

7.3.4 Coleta e Eutanásia

Para a adequada identificação das espécies de peixes, bem como para a inferência do sexo e estágio de maturação gonadal, pode ser necessária, não apenas a captura, mas também a eutanásia de espécimes (Tabela 3). Nestes casos, serão coletados até dois indivíduos por morfoespécie, por



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



campanha, sendo a eutanásia realizada Eugenol (óleo de cravo) concentrado. Esse produto é um anestésico eficiente para peixes e tem sido utilizado, de forma concentrada, para a coleta de espécimes. Ressalta-se que alguns animais encontrados já em óbito nas redes de coleta de monitoramento serão encaminhados para a universidade como material para estudo.

Tabela 3: Marcação e coleta de espécimes para o monitoramento da ictiofauna.

Grupo	Marcação	Limite de coleta (Indivíduos por morfoespécie) para identificação taxonômica	Método de eutanásia
Ictiofauna	Não	2 indivíduos por morfoespécie	Eugenol concentrado

8 RESULTADOS

8.1 PARÂMETROS ABIÓTICOS

Foram registrados os parâmetros físicos e químicos da água com uma sonda Multiparâmetro Horiba U-53, nos cinco pontos de amostragem, sendo os resultados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Parâmetros físicos e químicos das águas nos diferentes trechos e pontos amostrais.

Ponto	Temperatura	PH	ORP	Condutividade	NTU	O ₂	OD%	TDS
P1-BP	24,94	8,31	143	0,143	3,4	10,19	125,5	0,093
P2-BP	23,53	8,85	139	0,134	5,3	12,08	145,4	0,091
P3-BP	24,91	10,23	68	0,224	15,2	11,20	137,9	0,150
P4-BP	23,44	9,72	67	0,095	8,81	10,93	131,3	0,064
P5-BP	24,26	8,47	3	0,099	45,6	8,48	103,3	0,065

Os dados abióticos mensurados foram submetidos a uma análise de componentes principais demonstrando não haver uma tendência de agrupamento por tipo de ambiente (Figura 8). Os pontos P1-BP, P2-BP e P4-BP foram os que apresentaram maior correlação.




Figura 8: Análise de componentes principais aplicada aos dados abióticos

8.2 ESTRUTURA DE COMUNIDADES

Os resultados aqui apresentados são referentes ao Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira realizado no período de 19 a 21 de outubro de 2022, nos cinco pontos determinados previamente no Escopo Técnico. Adicionalmente, é apresentado o histórico das campanhas já realizadas.

8.2.1 Composição Ictiofaunística

Com a utilização dos diferentes apetrechos de pesca (rede de emalhar, peneira, arrasto, tarrafa e covo), foram registrados ao total, 369 indivíduos, na 13ª campanha de monitoramento de ictiofauna. Os indivíduos representam quatro ordens, dez famílias e 22 espécies. Entre os espécimes registrados, 19 foram considerados nativos (autóctones) e três foram considerados não



Monitoramento de Ictiofauna
(incluindo ictioplâncton) das
áreas sob influência direta da
Barragem Pedreira



nativos da bacia (*Oreochromis niloticus*, *Coptodon rendalli* e *Poecilia reticulata*) (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

Tabela 5: Lista dos táxons registrado Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira. A apresentação de origem foi dada conforme LANGEANI *et al.*, (2007). Os nomes foram confrontados com o banco de dados CAS (Catalogue of Fishes).

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Origem	
Characiformes	Anostomida e	<i>Leporinus amblyrhynchus</i>	Piau	Nativa	
		<i>Schizodon nasutus</i>	Ximborê	Nativa	
	Characidae	<i>Astyanax bimaculatus</i>	Lambari	Nativa	
		<i>Astyanax lacustris</i>	Lambari-do-rabo-amarelo	Nativa	
		<i>Piabina argentea</i>	Lambari	Nativa	
		<i>Psalidodon fasciatus</i>	Lambari-do-rabo-vermelho	Nativa	
	Curimatida e	<i>Steindachnerina insculpta</i>	Saguiru-do-rabo-amarelo	Nativa	
		Erythrinida e	<i>Hoplias malabaricus</i>	Traíra	Nativa
	Serrasalmid ae		<i>Serrasalmus maculatus</i>	Piranha	Nativa
		Cichliformes	Cichlidae	<i>Crenicichla britskii</i>	Jacundá
<i>Geophagus brasiliensis</i>	Cará			Nativa	
<i>Oreochromis niloticus</i>	Tilápia do Nilo		Não nativa		
<i>Coptodon rendalli</i>	Tilápia		Não nativa		
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia reticulata</i>	Guaru	Nativa	
	Siluriformes	Heptapterid ae	<i>Rhamdia quelen</i>	Jundia	Nativa
<i>Hypostomus albopunctatus</i>			Cascudo	Nativa	
Loricariidae		<i>Hypostomus ancistroides</i>	Cascudo	Nativa	
		<i>Hypostomus iheringi</i>	Cascudo	Nativa	
		<i>Hypostomus nigromaculatus</i>	Cascudo	Nativa	
		<i>Hypostomus regani</i>	Cascudo	Nativa	
		Pimelodidae	<i>Iheringichthys labrosus</i>	Madi-beiçudo	Nativa
			<i>Pimelodus microstoma</i>	Mandi	Nativa



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Os atributos ecológicos das espécies, permitiram identificar oito espécies não migradoras ou migradoras de curta distância com cuidado parental (NEP), treze espécies não migradoras ou migradoras de curta distância sem cuidado parental, e uma espécie não migradora com fecundação interna (NIF) (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

A estruturação trófica das espécies foi avaliada com base na literatura, sendo possível identificar cinco diferentes guildas alimentares: detritívora (S=8), herbívora (S=2), insetívora (S=1), onívora (S=9) e piscívora (S=2) (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

Dentre os 22 táxons identificados, dois constam como menos preocupante (LC) de acordo com o Livro Vermelho de Fauna, sendo que os demais (S=20) não estão sob nenhum grau de ameaça (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

Tabela 6: Atributos ecológicos dos táxons registrado na campanha de Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira. MCD: Migrador de curta distância; MLD: Migrador de longa distância. (NA=Não ameaçado).

Espécie	Reprodução	Alimentação	Conservação	Abundância
<i>Leporinus amblyrhynchus</i>	NEW	Herbívora	Não ameaçada	4
<i>Schizodon nasutus</i>	NEW	Herbívora	Não ameaçada	2
<i>Astyanax bimaculatus</i>	NEW	Onívora	Não ameaçada	1
<i>Astyanax lacustris</i>	NEW	Onívora	Não ameaçada	8
<i>Piabina argentea</i>	NEW	Onívora	Não ameaçada	3
<i>Psalidodon fasciatus</i>	NEW	Onívora	Não ameaçada	11
<i>Steindachnerina insculpta</i>	NEW	Detritívora	Não ameaçada	1
<i>Hoplias malabaricus</i>	NEP	Piscívora	Não ameaçada	6
<i>Serrasalmus maculatus</i>	NEP	Piscívora	Não ameaçada	9
<i>Crenicichla britskii</i>	NEP	Onívora	LC	5
<i>Geophagus brasiliensis</i>	NEP	Onívora	Não ameaçada	3
<i>Oreochromis niloticus</i>	NEP	Detritívora	Não ameaçada	1
<i>Coptodon rendalli</i>	NEP	Onívora	Não ameaçada	1
<i>Poecilia reticulata</i>	NIF	Detritívora	Não ameaçada	10
<i>Rhamdia quelen</i>	NEW	Onívora	Não ameaçada	4
<i>Hypostomus albopunctatus</i>	NEP	Detritívora	Não ameaçada	20
<i>Hypostomus ancistroides</i>	NEW	Detritívora	Não ameaçada	1
<i>Hypostomus iheringi</i>	NEP	Detritívora	Não ameaçada	197



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Espécie	Reprodução	Alimentação	Conservação	Abundância
<i>Hypostomus nigromaculatus</i>	NEW	Detritívora	Não ameaçada	60
<i>Hypostomus regani</i>	NEW	Detritívora	Não ameaçada	18
<i>Iheringichthys labrosus</i>	NEW	Insetívora	Não ameaçada	3
<i>Pimelodus microstoma</i>	NEW	Onívora	LC	1

De maneira comparativa, durante o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento, foram capturados 613 indivíduos pertencentes à 31 espécies. Na primeira campanha do monitoramento foram coletados 1.060 indivíduos de 49 espécies; na segunda, 548 indivíduos de 38 espécies; na terceira, 646 indivíduos de 34 espécies; na quarta 715 espécimes de 37 espécies; na quinta 138 espécimes de 27 espécies; sexta campanha 357 espécimes de 28 espécies; sétima campanha 399 espécimes de 24 espécies; oitava campanha 361 espécimes de 30 espécies; nona campanha 245 espécimes de 20 espécies; décima campanha 309 espécimes de 28 espécies; décima primeira campanha 248 espécimes de 25 espécies, décima segunda campanha 106 espécimes de 19 espécies e décima terceira campanha 369 espécimes de 22 espécies (Tabela 7). É possível observar oscilação na abundância e riqueza entre campanhas, a qual pode ser motivada pelo ciclo sazonal, que apresenta maior tendência de captura na estação chuvosa, bem como ao avanço das obras, que provocação perturbação no ambiente, contribuindo para o deslocamento das espécies para áreas mais tranquilas.

Tabela 7: Abundância e riqueza de espécies por campanha realizada desde o estudo de impacto ambiental das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira

Campanha	Data	Abundância	Riqueza
EIA	-	613	31
1 ^a	nov/18	1060	49
2 ^a	mar/19	548	38
3 ^a	jul/19	646	34
4 ^a	out/19	715	37
5 ^a	mar/20	138	27



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Campanha	Data	Abundância	Riqueza
6 ^a	jun/20	357	28
7 ^a	out/20	399	24
8 ^a	fev/21	361	30
9 ^a	jun/21	245	20
10 ^a	out/21	309	28
11 ^a	fev/22	248	25
12 ^a	jun/22	106	19
13 ^a	out/22	369	22

8.2.1.1 Abundância absoluta, relativa e número de espécies

Devido as características locais dos pontos de amostragem no rio Jaguari e tributários, a arte de pesca rede de espera, foi utilizada em apenas em três pontos, todos no rio Jaguari, não sendo utilizada nos tributários devido a profundidade não comportar tal tipo de amostragem. Dentre as artes de pesca de busca passiva, o covo e a tarrafa não apresentaram registros de espécies.

A amostragem com rede de emalhar, registrou três ordens, Characiformes, Cichliformes e Siluriformes, tendo domínio dos Siluriformes, seguido pelos Characiformes (Figura 9). O número de espécies por ordem apresentou maior riqueza de espécies para a ordem Characiformes, seguida por Siluriformes (Figura 10). O padrão de distribuição de indivíduos e espécies observado para os pontos do rio Jaguari segue o observado para a região Neotropical, com predomínio de Siluriformes e Characiformes, com alterações entre essas ordens, como visto entre algumas campanhas (LOWE-MCCONNELL, 1987; LANGEANI et al., 2007).

As Ordens Characiformes e Siluriformes reuniram o maior número de espécies coletadas em todas as campanhas de monitoramento. Em conjunto, essas duas ordens totalizaram 41 espécies na primeira campanha, 33 na segunda, 28 na terceira, 30 na quarta, 23 na quinta, 22 na sexta, 21 na sétima campanha, 20 na oitava, 17 na nona campanha, 21 na décima campanha, 20 na décima primeira campanha e 17 na décima segunda campanha. Esses organismos apresentam variadas

estratégias de vida, e ocupam uma grande variedade de micro habitats nos rios, como por exemplo, corredeiras e cachoeiras, assim como trechos de menor energia e oxigenação dos cursos d'água (OYAKAWA et al., 2006).

A Ordem Characiformes compreende espécies de hábitos predominantemente diurnos, que exploram a superfície ou a coluna da água em busca de alimentos (OYAKAWA et al., 2006). Há várias espécies oportunistas neste grupo, como a maioria dos lambaris/piabas (espécies dos gêneros *Astyanax* e *Bryconamericus*) e piaus (*Leporinus* spp.). Essa última foi coletada nas campanhas anteriores. Já a traíra (*Hoplias malabaricus*), que é uma espécie predadora de emboscada, prefere ficar escondida em pedras e vegetação marginal (OYAKAWA et al., 2006).

Os Siluriformes, são peixes de hábitos geralmente noturno e bentônicos. A Família Loricariidae possui espécies, como por exemplo aquelas do gênero *Hypostomus* que possuem boca suctória, capaz de se alimentar de plantas e animais minúsculos que cobrem os fundos de lama, areia, rochas e troncos apodrecidos (MENEZES et al., 2007).




Figura 9: Frequência relativa das ordens nos trechos amostrados com rede de emalhar.



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira




Figura 10: Número de espécies de cada ordem nos diferentes trechos e pontos amostrais coletados com rede de emalhar.

Para os pontos amostrados com apetrechos de busca ativa (arrasto e/ou peneira), foi observado predomínio de Characiformes e Cyprinodontiformes, com abundâncias maior de Cyprinodontiformes. Quanto à riqueza, os Siluriformes apresentaram maior número de espécies e as demais ordens apresentaram apenas uma espécie cada uma (Figura 11; Figura 12).




Figura 11: Frequência relativa das ordens nos trechos amostrados com arrasto e/ou peneira.




Figura 12: Número de espécie de cada ordem nos diferentes trechos e pontos amostrais coletados com arrasto e/ou peneira.

Na ocupação das famílias nos diferentes pontos amostrais, observou-se a ocorrência de nove famílias capturadas com redes de espera (




Figura 13). Destas, Anostomidae, Characidae e Cichlidae foram as predominantes nos pontos P1-BP, P2-BP e P3-BP. As demais famílias apresentaram baixa contribuição. Esta famílias estão entre as mais especiosas na região Neotropical, assim como observado para a captura por ordens (REIS; KULLANDER; FERRARIS JR., 2003).




Figura 13: Frequência relativa das famílias nos trechos amostrados com rede de emalhar.

Já nos trechos amostrados com arrasto e/ou peneira, foi observada maior frequência de indivíduos das famílias Characidae e Poeciliidae (Figura 14). Como discutido acima, os métodos de captura podem ter influenciado este resultado.




Figura 14: Frequência relativa das famílias nos trechos amostrados com arrasto e/ou peneira.



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Em termos de espécies, para captura com redes de espera, as espécies mais abundantes pertencem à família Loricariidae. As demais famílias foram pouco expressivas nesta campanha quando comparadas a esta. No ponto P1-BP, a espécie mais abundante foi *P. fasciatus*; no P2-BP, predominou Loricariidae, com destaque para *Hypostonus iheringi* e *Hypostomus nigromaculatus* já no P3-BP, *H. nigromaculatus* e no ponto P3-BP, a espécie mais abundante foi *Serrasalmus maculatus*. Nesta campanha, não foi observado nenhum indivíduo migrador de longa distância. Mesmo assim, os resultados anteriores denotam que o rio Jaguari constitui rota migratória para estas espécies, tendo em vista que já foram observadas capturas anteriores realizadas próximo à piracema. Desta forma, uma atenção especial deve ser dada a estas espécies ao longo do monitoramento de ictiofauna, bem como, futuramente, no monitoramento do mecanismo de transposição de Peixes (MTP) a ser instalado. As abundâncias totais e suas respectivas frequências absolutas estão dispostas por espécie e por ponto amostral

Tabela 8).

Tabela 8: Abundância e as respectivas frequências relativas dos pontos amostrados com rede de emalhar.

Espécie	BP-P1		BP-P2		BP-P3	
	n	%	n	%	n	%
<i>Astyanax bimaculatus</i>	1	4,8	0	0	0	0
<i>Astyanax lacustris</i>	2	9,5	1	0,3	5	17
<i>Crenicichla britskii</i>	0	0	3	1	2	6,7
<i>Geophagus brasiliensis</i>	1	4,8	1	0,3	1	3,3
<i>Hoplias malabaricus</i>	0	0	0	0	6	20
<i>Hypostomus albopunctatus</i>	2	9,5	18	5,9	0	0
<i>Hypostomus iheringi</i>	0	0	197	65	0	0
<i>Hypostomus nigromaculatus</i>	3	14	57	19	0	0
<i>Hypostomus regani</i>	1	4,8	17	5,6	0	0
<i>Iheringichthys labrosus</i>	3	14	0	0	0	0
<i>Leporinus amblyrhynchus</i>	1	4,8	3	1	0	0
<i>Oreochromis niloticus</i>	0	0	0	0	1	3,3
<i>Pimelodus microstoma</i>	0	0	1	0,3	0	0



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Espécie	BP-P1		BP-P2		BP-P3	
	n	%	n	%	n	%
<i>Psalidodon fasciatus</i>	7	33	1	0,3	3	10
<i>Rhamdia quelen</i>	0	0	3	1	0	0
<i>Schizodon nasutus</i>	0	0	0	0	2	6,7
<i>Serrasalmus maculatus</i>	0	0	0	0	9	30
<i>Steindachnerina insculpta</i>	0	0	1	0,3	0	0
<i>Coptodon rendalli</i>	0	0	0	0	1	3,3
Total	21		303		30	

Entre as espécies capturadas com métodos de busca ativa, a espécie da família Poeciliidae (*Poecilia reticulata*) foi a mais abundante (Tabela 9).

Tabela 9: Abundância absoluta e as respectivas frequências relativas dos pontos amostrados com arrastos e/ou peneira.

Espécie	BP-P4		BP-P5	
	n	%	n	%
<i>Hypostomus ancistroides</i>	0	0	1	50
<i>Piabina argentea</i>	3	23	0	0
<i>Poecilia reticulata</i>	10	77	0	0
<i>Rhamdia quelen</i>	0	0	1	50
Total	13		2	

Numa análise mais ampla e sem pontuar espécies, observamos que o ponto P2-BP apresentou os maiores valores de abundância e de riqueza e o ponto P1-BP apresentou os menores valores de abundância e riqueza (Figura 15).



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira




Figura 15: Abundância de indivíduos (N) e riqueza de espécies (N° espécies) nos diferentes pontos e trechos amostrados com rede de emalhar.

Nos ambientes amostrados com arrasto e peneira, o maior valor de abundância foi registrado no ponto P4-BP e os valores de riqueza se mantiveram iguais em ambos os pontos (P4-BP e P5-BP) (Figura 16). A riqueza de espécies foi baixa nas capturas com peneira e/ou arrasto. Tal fato pode estar associado ao tipo de ambiente e seletividade do aparato de captura. Embora quase todos apresentem vegetação ripária, poucos apresentaram vegetação nos corpos d'água, como macrófitas aquáticas, que são áreas de refúgio para espécies de pequeno porte ou juvenis de espécies de grande porte.




Figura 16: Abundância de indivíduos (N) e riqueza de espécies (N° espécies) nos diferentes pontos e trechos amostrados arrasto e/ou peneira.

8.2.2 Índices ecológicos

No intuito de avaliar o equilíbrio das comunidades entre os diferentes pontos amostrais, foram calculados os índices ecológicos Diversidade (Shannon), Equitabilidade (Pielou) e Riqueza (Margalef), além de apresentar novamente o número de espécies e abundância. Assim como presente no parecer que subsidiou este estudo (468/18/IE, 26/12/2018), para este resultado, foram utilizados os dados obtidos com todos os aparatos de captura.

Neste sentido, o ponto P1-BP, apresentou os maiores valores de riqueza observada, seguido pelos pontos P3-BP e P2-BP, respectivamente. Em relação à abundância, o ponto P2-BP apresentou os maiores valores, seguido pelo ponto P3-BP (Tabela 10). A maior riqueza calculada também foi observada no ponto P1-BP, seguido pelos pontos P3-BP e P2-BP. A equitabilidade foi maior no ponto P1-BP, seguido pelo ponto P3-BP. A diversidade também apresentou maior valor no ponto P1-BP, seguido pelo ponto P3-BP.

De modo geral, os resultados de riqueza na décima segunda campanha, foram menores quando comparados às campanhas anteriores: C1 (IC01: 29, IC02: 31, IC03: 31, IC04: 10 e IC05:

7 espécies), C2 (IC01: 17, IC02: 21, IC03: 22, IC04: 11 e IC05: 7 espécies), C3 (IC01: 15, IC02: 18, IC03: 23, IC04: 3 e IC05: 9 espécies), C4 (IC01: 16, IC02: 26, IC03: 23, IC04: 9 e IC05: 6 espécies) e C5 (IC01: 9, IC02: 11, IC03: 15, IC04: 5, IC05: 6 espécies) e similar ao encontrado na sexta campanha (IC01: 4, IC02: 16, IC03: 16, IC04: 2, IC05: 7 espécies), sétima campanha (P1-BP: 12; P2-BP: 16; P3-BP: 19; P4-BP: 3; P5-BP: 4), oitava campanha (P1-BP: 12; P2-BP: 18; P3-BP: 22; P4-BP: 4; P5-BP: 5), nona campanha (P1-BP: 10; P2-BP: 11; P3-BP: 8; P4-BP: 2; P5-BP: 4), décima campanha (P1-BP: 4; P2-BP: 14; P3-BP: 19; P4-BP: 2; P5-BP: 5), décima primeira campanha (P1-BP: 10; P2-BP: 15; P3-BP: 9; P4-BP: 2; P5-BP: 5) e décima segunda campanha (P1-BP: 9; P2-BP: 7; P3-BP: 4; P4-BP: 1; P5-BP: 3)

Tabela 10: Índices Ecológicos Número de espécies, Riqueza, Equitabilidade e Diversidade. (todos os dados agrupados).

Índices geral					
Índices	P1-BP	P2-BP	P3-BP	P4-BP	P5-BP
Nº espécies (S)	9	7	4	1	3
Abundância (n)	29	54	7	3	13
Riqueza (d)	2,376	1,504	1,542	0	0,7797
Equitabilidade (J)	0,6425	0,826	0,9212	****	0,7817
Diversidade (H')	1,412	1,607	1,277	0	0,8587

8.2.3 Similaridade de composição

A análise de similaridade realizada com base em todos os dados agrupados, denotou que os pontos apresetaram baixa similaridade. Os pontos de riacho, dada a baixa captura, apresentaram similaridade próxima a 0%. Já os pontos de rio, apresentaram baixa similaridade, entre 20% e 30% (Figura 17). De maneira geral, a maior similaridade foi observada entre pontos situado em ambientes similares, como os pontos na calha do rio e os pontos situados em riacho.



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira




Figura 17: Dendrograma de similaridade de *Bray Curtis* dos ambientes amostrados. (todos os dados agrupados).

8.2.4 Captura por Unidade de Esforço

A captura por unidade de esforço foi dividida entre os aparatos de captura que apresentaram alguma eficiência amostral, sendo rede de espera e peneira. Tarrafas e arrasto não foram eficazes, devido ao substrato rochoso, que impediu a aplicação destas técnicas. Da mesma forma, o covão não foi eficaz. Visto que o esforço amostral foi igual entre os pontos amostrais, para todos os aparatos de captura, o padrão manteve-se o mesmo, com maiores abundâncias registradas no ponto P2-BP, seguido pelos pontos P1-BP e P3-BP, para rede-de-espera. Com este aparato de captura, a espécie *Hypostomus iheringi* foi a mais abundante, seguida pela espécie *I. labrosus* (Tabela 11). Para as capturas com peneira, as maiores capturas foram observadas no ponto P5-BP. De forma geral, nestes ambientes, a espécie com maior abundância foi *Poecilia reticulata*, seguida por *Astyanax lacustris* (Tabela 11).

Tabela 11 Tabela sumarizada da CPUE (Captura por Unidade de Esforço) para os pontos amostrais e diferentes artes de pesca utilizadas no monitoramento.

Arte de pesca	Espécie	P1-BP	P2-BP	P3-BP	P4-BP	P5-BP
	<i>Astyanax lacustris</i>	4,44	0,00	0,00	-	-



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Rede de espera	<i>Geophagus brasiliensis</i>	4,44	0,00	0,00	-	-
	<i>Hoplias malabaricus</i>	0,00	0,00	4,44	-	-
	<i>Hypostomus albopunctatus</i>	0,00	4,44	0,00	-	-
	<i>Hypostomus ancistroides</i>	0,00	26,67	0,00	-	-
	<i>Hypostomus iheringi</i>	0,00	84,44	4,44	-	-
	<i>Hypostomus nigromaculatus</i>	4,44	4,44	8,89	-	-
	<i>Hypostomus paulinus</i>	0,00	57,78	0,00	-	-
	<i>Hypostomus regani</i>	13,33	44,44	0,00	-	-
	<i>Hypostomus strigaticeps</i>	0,00	17,78	0,00	-	-
	<i>Iheringichthys labrosus</i>	80,00	0,00	0,00	-	-
	<i>Leporinus amblyrhynchus</i>	4,44	0,00	0,00	-	-
	<i>Leporinus octofasciatus</i>	4,44	0,00	0,00	-	-
	<i>Prochilodus lineatus</i>	8,89	0,00	0,00	-	-
	<i>Schizodon nasutus</i>	4,44	0,00	0,00	-	-
<i>Serrasalmus maculatus</i>	0,00	0,00	13,33	-	-	
Peneira	<i>Astyanax lacustris</i>	-	-	-	0,00	833,33
	<i>Piabarchus stramineus</i>	-	-	-	625,00	0,00
	<i>Poecilia reticulata</i>	-	-	-	0,00	1666,67
	<i>Gymnotus carapo australis</i>	-	-	-	0,00	208,33

8.2.5 Curva do coletor

A análise de rarefação de espécies foi realizada, considerando todas as campanhas e artes de pesca, usando a riqueza observada (Sobs) e o estimador de riqueza Bootstrap. Mesmo que nessa campanha não tenham sido registradas novas espécies, a curva ainda apresenta tendência de crescimento. Até o momento foram registradas 52 espécies, enquanto o estimador considerou a presença de 58,3 (Figura 18). Neste sentido, o esperado é que, com a realização de mais campanhas, esta curva tenda a atingir o platô amostral, ainda mais considerando o fato de que serão realizadas amostragens na estação chuvosa, onde as capturas são favorecidas pela migração de espécies, bem como pela maior atividade, propiciada pelo aumento na temperatura. Além destes fatores, comunidades tropicais tendem a ser formadas por muitos indivíduos de poucas espécies (espécies comuns) e poucos indivíduos de muitas espécies (espécies raras). Portanto, a probabilidade de se capturar espécies raras tende a aumentar com maior esforço amostral.



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Adicionalmente, o rio Jaguari apresenta grande diversidade de espécies da família Loricariidae. Com a revisão das espécies capturadas, o número de espécies desta família tem aumentado, o que influencia na não estabilização da curva do coletor. Considerando todas as campanhas de monitoramento, até o momento, 13 espécies dessa família foram registradas.




Figura 18: Curva de acumulação de espécies Sobs e Bootstrap.

8.3 ESTÁGIO DE MATURAÇÃO GONADAL - EMG

A campanha foi realizada em outubro, época onde a maioria das espécies está finalizando a maturação para o ciclo reprodutivo. Visto que não foram registradas espécies migradoras, não foram eutanasiados indivíduos. Em alguns exemplares foi feita a determinação do sexo e estágio de maturação gonadal a partir da extrusão dos gametas. A maior parte destes indivíduos foi classificada como fêmeas em maturação final e machos maduros (Figura 19).

Nas campanhas anteriores, mediante extrusão de gametas, na campanha 7 foi possível identificar um indivíduo de *Prochilodus lineatus* capturado era uma fêmea apta à desova (madura). O indivíduo de *Megaleporinus obtusidens* foi classificado como macho maduro. Também foram

registrados indivíduos de *Pimelodus microstoma* classificados como maduros, tanto fêmeas, quanto machos. Já na oitava campanha, os exemplares avaliados estavam todos em estágio 4 (desovado), sendo identificadas três fêmeas (*Prochilodus lineatus*, *Leporinus octofasciatus* e *Salminus brasiliensis*) e um macho (*L. octofasciatus*). Na campanha 9, houve o registro de dois indivíduos fêmeas de *Leporinus octofasciatus* em estágio de maturação inicial e cinco fêmeas de *Schizodon nasutus* sendo duas em estágio de maturação inicial. Cabe ressaltar que, a simples maturação das gônadas, não garante sucesso reprodutivo e recrutamento. Os peixes, principalmente os migradores acima citados, necessitam de uma série de fatores ambientais, como chuva e pulsos de inundação, para realizar a desova. Desta forma, mesmo que se preparem, sem as condições adequadas, os gametas podem ser reabsorvidos, sem que ocorra a liberação dos mesmos.




Figura 19: Avaliação do estágio de maturação gonadal de peixes reofílicos ou de importância comercial registrados no monitoramento. M – 3 = macho maduro; M – 2 = macho em maturação; F – 2b = fêmea em maturação final; F – 2a = fêmea em maturação inicial.

8.4 ICTIOPLÂNCTON

Como salientado anteriormente, mesmo que a comunidade se prepare para o ciclo reprodutivo, sem as condições adequadas, a liberação de gametas pode não ocorrer. Entretanto, durante a presente campanha, foram registrados dois organismos ictioplânctônicos, um ovo e uma larva (Tabela 12). Mesmo que a campanha tenha sido realizada no início da estação reprodutiva,



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



algumas espécies possuem reprodução mais longa e/ou desovam nas primeiras chuvas. Mesmo com registro dos organismos, a periodicidade amostral é uma limitação nos estudos do ictioplâncton. O ideal seria a realização de amostragens quinzenais durante o período reprodutivo, visto que, mesmo no período de chuvas, o evento reprodutivo é muito rápido e pode ocorrer no intervalo de uma semana, onde as precipitação sejam altas e ocorra a elevação do nível do rio.

Tabela 12: Dados referentes a coleta de organismos ictioplanctônico no Monitoramento da ictiofauna. * ponto sem correnteza.

Local	Profundidade	Organismo	Inicial	Final	Giros	Volume
P1-BP	Sub-superfície	Nada	393826	395672	1846	9,75
P2-BP	Sub-superfície	Nada	379211	387673	8462	44,68
P3-BP	Sub-superfície	Larva	371966	379211	7245	38,26
P3-BP	Sub-superfície	Ovo	371966	379211	7245	38,26
P4-BP	Sub-superfície	Sem captura	387673	392038	4365	23,05
P5-BP	Sub-superfície	Sem captura	392038	393826	1788	9,44

Na primeira campanha de monitoramento, realizada no início do período chuvoso de 2018, foram registrados 14 ovos e 20 larvas e juvenis durante a amostragem do ictioplâncton. Durante a segunda campanha, realizada no final do período chuvoso, foram registrados quatro ovos e 18 indivíduos juvenis ou na fase larval. Na terceira campanha de amostragem, que representou o período de seca, não foram registrados ovos e larvas de ictioplâncton em nenhum dos pontos de amostragem. Na quarta campanha, realizada no início da estação chuvosa, foram registrados 1 ovo, 2 larvas e 13 juvenis. Na quinta campanha, realizada no fim da estação chuvosa, foram registrados uma larva e 13 juvenis. Já na sexta campanha, realizada no período de estiagem, apenas uma larva e por fim, nas cinco últimas não foram capturados organismos ictioplanctônicos. Esses resultados, evidenciam a sazonalidade na ocorrência dessas fases de desenvolvimento da fauna íctica.



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



9 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

No total, nesta campanha foram registrados 19 *táxons*, sendo a composição destes táxons similar à de outros ambientes, com predomínio de Siluriformes e Characiformes, podendo haver alteração entre estas ordens. Entre os aparatos de captura houve diferenças na composição, mas essa é esperada, dado a variação no uso e ocupação do habitat entre espécies de pequeno, médio e grande porte.

Nesta campanha, foram registrados dois indivíduos de *P. lineatus*, migrador de longa distância. Além disso, foram registradas 8 espécies classificadas como não migradoras ou migradoras de curta distância, com cuidado parental, 9 espécies classificadas como não migradoras ou migradoras de curta, sem cuidado parental e uma espécie não migradora com fecundidade interna. Tais guildas reprodutivas mostraram-se constantes durante as campanhas, sendo que as espécies costumam realizar migrações reprodutiva durante a piracema, contudo, sem a necessidade de grandes deslocamentos, como os migradores de longa distância. Estes números denotam que o rio Jaguari, pode representar importante papel como rota migratória, sendo responsável pelo recrutamento de novos indivíduos dessas populações. Assim, o monitoramento destas espécies, principalmente, no tocante à efetividade do mecanismo de transposição a ser instalado, deve ser realizado.

Os dados sobre a composição trófica apresentam número considerável de espécies onívoras, um indicador negativo de qualidade ambiental, considerando que tais espécies são normalmente generalistas e com maior capacidade de ajustes perante as transformações ambientais. Entretanto, a classificação foi feita com base em literatura, visto que o parecer não exigiu análise de conteúdo estomocal das espécies registradas. Para uma afirmação sobre esta condição, seria necessária a avaliação direta da dieta das mesmas. Assim, neste ponto, é sugerido



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



que sejam considerados para análise da composição trófica, as espécies mais abundantes, para que assim, se possa conhecer efetivamente as mudanças ecológicas dessas espécies após a formação deste reservatório.

Tendo como base as informações apresentadas neste documento, infere-se que os padrões de composição e estrutura da comunidade de peixes observados para áreas sob influência direta da Barragem Pedreira (BP), apresenta perfil esperado para o que se tem de conhecimento na literatura científica para rios de menor porte, principalmente aqueles sob grande interferência antrópica, reportando de forma geral, baixa abundância e riqueza de espécies. Contudo, por se tratar de uma amostragem realizada antes da construção da barragem, esta deve servir de base para potenciais impactos nesta comunidade.

Espera-se que após o término das obras, a composição ictiofaunística seja composta pelas espécies mais resilientes e com maior flexibilidade ecológica, sendo essas, as espécies que se manterão no novo ambiente criado, destacando entre as principais estratégias e táticas envolvidas neste processo, as adequações tróficas e reprodutivas.



Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO, A. A. et al. Composição, abundância e distribuição espaço-temporal da ictiofauna. In: VAZZOLER, ANNA EMÍLIA AMATO DE MORAES; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. (Ed.). **A Planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos**. Maringá: EDUEM, 1997. p. 179–208.

AGOSTINHO, A. A.; PELICICE, F. M.; GOMES, L. C. **Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil**. EDUEM ed. [s.l.: s.n.]

CASTRO, R. M. C. et al. Estrutura e composição da ictiofauna de riachos da bacia do Rio Grande no estado de São Paulo, sudeste do Brasil. **Biota Neotropica**, v. 4, n. 1, p. 01–39, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032004000100006&lng=pt&tlng=pt>.

GULLAND, J. A. **Manual of methods for fish stock assessment. Part 1. Fish population analysis**. Rome: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1969.

LANGANI, F. et al. Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná: composição atual e perspectivas futuras. **Biota Neotropica**, v. 7, n. 3, p. 181–197, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032007000300020&lng=pt&tlng=pt>.

LOWE-MCCONNELL, R. H. **Ecological studies in tropical fish communities**. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

MAGURRAN, A. E. **Measuring Biological Diversity**. [s.l.] Wiley, 2013.

MENEZES, N. A. et al. **Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce neotropicais (2007)**. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2007.

MMA. ICMBio/MMA, 2018. In: **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume VI – Peixes**. [s.l.: s.n.]p. 1235.

NILSSON, C.; SVEDMARK, M. Basic Principles and Ecological Consequences of Changing Water Regimes: Riparian Plant Communities. **Environmental Management**, v. 30, n. 4, p. 468–480, 1 out. 2002. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/s00267-002-2735-2>>.

NOBILE, A. B. et al. Caracterização dos padrões reprodutivos da ictiofauna. In: SILVA, R. J. (Ed.). **Integridade ambiental da represa de Jurumirim: Ictiofauna e relações ecológicas**. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2016. p. 79–94.

OYAKAWA, O. T. et al. **Peixes de Riachos da Mata Atlântica**. São Paulo: Neotropica, 2006.

PIELOU, E. C. **Ecological diversity**. [s.l.: s.n.]

POFF, N. L.; ALLAN, J. D. Functional Organization of Stream Fish Assemblages in Relation to Hydrological Variability. **Ecology**, v. 76, n. 2, p. 606–627, mar. 1995. Disponível em: <<http://doi.wiley.com/10.2307/1941217>>.

REIS, R. E.; KULLANDER, S. O.; FERRARIS JR., C. J. **Check list of the freshwater fishes of South and Central America**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



SANTOS, A. B. I.; TERRA, B. de F.; ARAÚJO, F. G. Influence of the river flow on the structure of fish assemblage along the longitudinal gradient from river to reservoir. **Zoologia (Curitiba)**, v. 27, n. 5, p. 732–740, out. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-46702010000500010&lng=en&nrm=iso&tlng=en>.

SCHLOSSER, I. J. Fish Community Structure and Function along Two Habitat Gradients in a Headwater Stream. **Ecological Monographs**, v. 52, n. 4, p. 395–414, fev. 1982. Disponível em: <<http://doi.wiley.com/10.2307/2937352>>.

VASCONCELOS, L. P.; ALVES, D. C.; GOMES, L. C. Fish reproductive guilds downstream of dams. **Journal of Fish Biology**, v. 85, n. 5, p. 1489–1506, nov. 2014. Disponível em: <<http://doi.wiley.com/10.1111/jfb.12501>>.

VAZZOLER, A. E. A. M. **Biologia da Reprodução de peixes Teleósteos: Teoria e Prática**. Maringá: EDUEM, 1996.

WARD, J. V.; TOCKNER, K.; SCHIEMER, F. Biodiversity of floodplain river ecosystems: ecotones and connectivity1. **Regulated Rivers: Research & Management**, v. 15, n. 1–3, p. 125–139, jan. 1999. Disponível em: <<http://doi.wiley.com/10.1002/%28SICI%291099-1646%28199901/06%2915%3A1/3%3C125%3A%3AAID-RRR523%3E3.0.CO%3B2-E>>.



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



11 ANEXO FOTOGRÁFICO CAMPANHA



Itheringichthys labrosus



Astyanax lacustris



Hypostomus regani



Hypostomus nigromaculatus



Leporinus amblyrhynchus



Prochilodus lineatus



Schizodon nasutus



Geophagus brasiliensis

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna
(incluindo ictioplâncton) das
áreas sob influência direta da
Barragem Pedreira



Leporinus octofasciatus



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



12 ANEXO FOTOGRÁFICO GERAL



Psalidodon fasciatus



Astyanax lacustris



Hypostomus regani



Hypostomus albopunctatus



Crenicichla britskii



Geophagus brasiliensis

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna
(incluindo ictioplâncton) das
áreas sob influência direta da
Barragem Pedreira



Hoplias malabaricus



Itheringichthys labrosus



Piabina argentea



Leporinus amblyrhynchus



Leporinus octofasciatus



Megaleporinus obtusidens



Pimelodus microstoma



Pimelodus paranaensis

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



ICTIOLÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



Poecilia reticulata



Prochilodus lineatus



Rhamdia quelen



Serrapinnus notomelas



Steindachnerina insculpta



Hypostomus iheringi



Hoplias malabaricus



Schizodon nasutus

ICTIOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br



ICTIOLOGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL

Monitoramento de Ictiofauna (incluindo ictioplâncton) das áreas sob influência direta da Barragem Pedreira



13 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

27/01/2020

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

Serviço Público Federal CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA			
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART			1-ART Nº: 2020/00616
CONTRATADO			
2.Nome: ANDRE BATISTA NOBILE		3.Registro no CRBio: 094835/01-D	
4.CPF: 305.751.978-46	5.E-mail: andrenobile@hotmail.com		6.Tel: (14)98123-9200
7.End.: DOUTOR JOSE BARBOSA DE BARROS 1630		8.Compl.: BL 7, APTO. 307	
9.Bairro: JARDIM PARAISO	10.Cidade: BOTUCATU	11.UF: SP	12.CEP: 18610-307
CONTRATANTE			
13.Nome: ICTIOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME			
14.Registro Profissional: 001070		15.CPF / CGC / CNPJ: 21.243.932/0001-35	
16.End.: RUA PRIMO PAGANINI 990			
17.Compl.: CASA C		18.Bairro: JARDIM PANORAMA	19.Cidade: BOTUCATU
20.UF: SP	21.CEP: 18608-190	22.E-mail/Site: contato@ictiologica.com.br / www.ictiologica.com.br	
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL			
23.Natureza : 1. Prestação de serviço Atividade(s) Realizada(s) : Proposição de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; Realização de consultorias/assessorias técnicas; Coordenação/orientação de estudos/projetos de pesquisa e/ou outros;			
24.Identificação : COORDENADOR DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA E SUBPROGRAMAS DE MONITORAMENTO DE ICTIOFAUNA, RESGATE DE ICTIOFAUNA EM ENSECADERAS E MONITORAMENTO DE MECANISMOS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (MTP'S) ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PEDREIRA-SP			
25.Município de Realização do Trabalho: PEDREIRA			26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE		28.Perfil da equipe: BIÓLOGOS E ICTIÓLOGOS	
29.Área do Conhecimento: Ciências morfológicas; Ecologia; Zoologia;		30.Campo de Atuação: Meio Ambiente	
31.Descrição sumária : O PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA COMPREENDE O ACOMPANHAMENTO DA FAUNA ICTÍCIA PRESENTE NOS CORPOS D'ÁGUA NA AJUDA DO EMPREENDIMENTO QUE SERÁ CONSTITUÍDO PELO RESERVATÓRIO DE PEDREIRA, VERIFICANDO SUA RIQUEZA, COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E DINÂMICA AO LONGO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DESTA BARRAGEM.			
32.Valor: R\$ 1.000,00	33.Total de horas: 960	34.Início: JAN/2020	35.Término: JAN/2024
36. ASSINATURAS			37. LOGO DO CRBio
Declaro serem verdadeiras as informações acima			
Data: 29/01/2020		Data:	
Assinatura do Profissional 	Assinatura e Carimbo do Contratante		
38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO		39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO	
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.			
Data: / /	Assinatura do Profissional	Data: / /	Assinatura do Profissional
Data: / /	Assinatura e Carimbo do Contratante	Data: / /	Assinatura e Carimbo do Contratante

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS
NÚMERO DE CONTROLE: 1071.3268.4209.5464

OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br

<https://portal.crbio01.gov.br/scripts/art.dll/login>

1/5

ICTIOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

Rua Primo Paganini, 990-Casa C – Bairro Jardim Panorama Botucatu – SP Cep. 18.608-190

Email: contato@ictiologica.com.br

www.ictiologica.com.br